




Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/s3id13295360>

COMMENTARII
DE REBVS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.





VOLVMINIS XIX. PARS I.

LIPSIAE MDCCLXXIII.
APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Venetiis apud I. B. Pascali, Patauii apud Io. Manfrè,
Holmiae apud L. Saluium.







I.

Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, etc.
par Mr. A. ROUX, Docteur Régent de la
Faculté de Médecine de Paris etc. Tome
XXIX, à Paris 1768, chez Vincent, 8. Alph. I.
pl. 13. tab. aen. 1. Tom. XXX. 1769;
Alph. I, pl. 13.

i. e.

Diarium ad artem salutarem, chirurgiam, phar-
maciam, cet. pertinens. Auctore Cl. A. ROUX.
Tomus XXIX et XXX.

Mense iulio 1768 haec inprimis notatu digna Tom.
continentur. XXIX.

2) Cl. DE CAZELES *observatio de verme soli-* p. 26.
tario suae taenia perforata.

Obs. I. Femina 70 annorum, temperamento
cholericum et corpore gracili praedita, per tres an-
nos colica stomachica, cordis palpitatio et post
quietem ponderis alicuius gravitate, cui nausea erat
adiuncta, quotidie pulsu irregulari febrili obstructio-
neque alvina vexabatur: quae cum, frustra adhibitis
a Cl. Auctore, qui marasimum adesse putabat, me-
dicamentis stomachicis, humectantibus dulcibusque,
de pondere in ventriculo, nausea et vomitu quoti-
die conqueri pergeret, indicationem euacuatoriam,
additis aliquot guttulis syrupi GLAUBERI eo cum

eventu usurpavit, ut, post vomitus aliquot et deiectiones per os et per anum, taenia, quae longitudinem circiter quinque pedum aequabat, eiecta, aegra convalesceret. Obs. 2. Femina sexaginta novem annorum, plethorica, per aliquot iam annos colica ventriculi et intestinorum periodica irregulari, maxime post quietem laborabat: quae colica, antequam aegram inuaderet, nausea et vomitu cum excretionem materiae copiosae, nec non explosione flatuum annunciabatur, et, ut plurimum horis 24 elapsis, emissis sursum deorsumque flatibus copiosis finiebatur. Quem morbum, cum Cl. Auctor a digestionem depravata pendere putaret, antispasmodicis remediis iunctis amaris corrigere studuit: quibus id effecit, ut colica minus frequens et vehemens rediret. Post menses vero aliquot deglutitione laesa, hypochondriorum inflatio cum dolore vehementi, vomitus et defectus somni insequiebantur: in hoc statu Noster, cum medicamentum purgans sine symptomatum remissione vomituque subinde adeo ingrauescente adhibuisset, per clysmata tantum anum liberam servavit; interim vomitu quotidie aucto, per quem materiam aquosam, viridem, viscidam et simul innatantem lumbricum reiciebat, Cl. Auctor, cum a vermibus haec omnia proficisci cognosceret, decoctum foliorum menthae, anodynis iunctis, ob vomitum per aliquot tempus adhibuit, et tandem ope pulpaе cassiae et mannae, solutae in decocto foliorum menthae, aegram eo cum successu purgavit, ut pars taeniae expelleretur, quae eam figuram, quam aeri incisam exhibuit Cl. Auctor, referret: quae quidem quinque lineas in una, in altera vero extremitate duas tantum lata, fere catenam simularet, cuius articulus quivis lateralis lineis transversis profundis notatus esset; oppositus vero seminum cucurbitae, quorum unum ad alterum esset appositum, speciem

speciem mentiretur: praeterea quilibet articulus foramine nec non papilla praeditus erat, quam speciem Cl. Auctor putat nouam esse. Aegra ea, quam supra descripsimus, ratione multas partes tae-
niae, sed vulgaris speciei eiecit, donec conuale-
sceret.

Mense augusto.

2) Cl. DUFAY *observatio de morbo hysterico p. 120.*
verminoso. Puella nouem annorum viuuda et ha-
ctenus sanitatis optimae, anno 1763, mense maio,
lipothymia, iuncta respiratione laboriosa et interce-
pta, stridore dentium nec non pandiculationibus
afficiebatur. Exhibitis iis remediis, quae in eius-
modi morbo solent exhiberi, aegra post horam vnam
fere restituta fuit. Tertio die morbus non minori
vehementia eam denuo inuasit, nec non quinto die
morbus rediit; sed loco quietis, quae alias solet inse-
qui, paroxysmo superato, motibus conuulsivis
membrorumque contorsionibus rigiditateque adeo
vehementi correpta est, vt potius frangerentur, quam
flecterentur membra; aegra vero modo ridebat, mo-
do plorabat et suspiria mouebat: quo paroxysmo
superato, alius 24 horarum spatio, nullo seruato or-
dine, semper maiori cum vehementia rediit. Lipo-
thymia durante, aegra sensuum usu gaudebat, et ad
omnes quaestiones respondebat, sed de dolore pe-
dum vehementi conquerebatur; praecipue vero per-
cipiebat motum in abdomine sphaerae magnae, quae
vsque ad pharyngem ascendebat: hinc aegra etiam
maxime suffocationem metuebat. Posteaquam vero
descenderat hic globus, quem aegra appellare sole-
bat, in ventriculum, conuulsui motus denuo redie-
runt, tum omnia, a nobis enarrata, variari, nullo serua-
to ordine, repetique solebant; paroxysmo vero finito,
aegra omnibus negotiis, vti sana, praesse poterat.

Parentes solliciti de sanitate filiae medicum veteranum de hoc morbo confulebant, qui eius causam a vermibus, in primis viis hospitantibus, ortum ducere recte suspicatus, sanguine in pede emisso, emeticis catharticisque usus est; sed, cum morbum in pejus ruere videret, naturae omnia relinquere consultius duxit. Exeunte septembri, omnia per se remittebantur symptomata, et per duos menses fere aegram vim redeuntis mali non sensit; ineunte vero mense decembri, accedente febre intermittente, denuo symptomatibus supra enarratis aegra usque ad tempus vernale vexata fuit, eademque remedia omnia iterum sine fructu sunt tentata. Auctor itaque mense augusto in consilium vocatus, examinatis omnibus causis, ex eo etiam, quod aegra aliquoties iam vermes excreuerat, halitumque foetidum, nec non pruritus narium habebat, causam proximam morbi hysterici vermes esse coniecit. Praescripsit itaque Cl. Auctor emeticum, et sequente die purgans, cuius basis extractum rhabarbari erat, adeo bono cum successu, ut, reiecta magna copia lumbricorum ascaridumque, aegra restitueretur, et per tres annos iam optima sanitate frueretur.

p. 129. 3) Cl. FEUILLERADE de *efficacia aquae frigidae, in motibus convulsivis usurpatae, observatio*. Cl. Auctor mense octobri ad aegrum, de quo medicus iam desperauerat, quique remedium ultimum potum caffee praescripserat, in consilium vocatus, eum vidit eiusmodi symptomatibus, in extremitatibus superioribus motibus vehementissimis convulsivis spasmusque cynico, nec non rigiditate totius corporis, cum pulsu tamen naturali laborare. Reiecto usu caffee exhibuit ius pullorum, et, abradis capillis, telas linneas, aqua frigida imbutas, capiti applicuit: quod cum ter esset factum, motibus convulsivis cessantibus aeger est restitutus.

Cl.

5) Cl. RICHARD *epistola de spina bifida et hy-* p. 140.
drope, per remedia varia sanatis. Femina quaedam cum
 anno 1755, die 30 ianuarii filiam peperisset, quae
 tumorem magnitudine oui gallinacei, ad tertiam
 vertebam dorsi et secundam lumborum situm, ha-
 bebat, Cl. Auctor quarto post partum die in con-
 silium vocatus, tumorem hunc partim carnosum,
 partim similem bullae inuenit, fluctuationemque
 per totum tumorem sensit, extremitatesque inferio-
 res paralyticas, colore plumbeo et pustulis gangrae-
 nosis obsessas perspexit. Quodque mirum erat, tem-
 pore inspirationis tumorem intumuisse, et in exspi-
 ratione detumuisse, vt tandem infans die octauo exspi-
 raret. Sectione tumoris instituta, effluebat lymphā
 flaua, eoque vltius disquisito, sanguinis nigri ma-
 gnā copiam, in qua filamenta neruea natabant,
 emisit; vertebrae vero, quae ad tumorem respicie-
 bant, numero quatuor sine apophysibus, easque par-
 te corporis media destitutas inueniebat. Filamen-
 ta neruea, quae in tumore dissecto reperit, caudam
 equinam esse coniecit: de qua re Cl. Auctor certior
 esse potuisset, si dissectio columnae spinalis vltior
 concessa fuisset. *Obs. 2.* Anno praeterito iuuenis,
 14 annos circiter natus, ictero affectus hepar per-
 magnum induratumque habebat; qui, adhibitis re-
 mediis contra obstructionem huius visceris per lon-
 gum temporis spatium, sine vllō effectu, indies de-
 bilior factus leucophlegmatia afficiebatur: contra
 quem morbum cum etiam remedia vsitata inutiliter
 adhibuisset, reiectis a Nostro omnibus remediis ha-
 stenus adhibitis, praescripsit aegro quotidie drach-
 mam vnam nitri, in aquae mensura vna solutam: hoc
 remedio per duos dies usurpato, aeger hydrocele
 magna laborare coepit; vsu vero huius remedii con-
 tinuato, hydrocele quoque disparuit aegerque die
 decimo quinto prorsus conualuit. *Obs. 3.* Rusti-

eum, ascite laborantem, ante decem annos remedio sanauit, vbi ei ad morbum tantum mitigandum, non vero ad sanandum suasit ptisanam, ex herba taraxaci et clauis ferreis aerugine tectis compositam. Post menses sex Cl. Auctor ad alium aegrum eiusdem domus vocatus, rusticum hunc sanatum hoc remedio inuenit.

p. 162. 7) *Observatio Cl. MARTIN de noxa luxationum repositionis neglectae.* Obs. 1. Anno 1764, die 30 augusti hominis cuiusdam brachium est luxatum. Auctoritate nonnullorum curae se tradidit sacerdotis, qui luxationes fracturasque sanare dicebatur: ille extensione, hominis robusti ope, instituta, moxque fascia suo more applicata, aegrum per mensem integrum motum suscipere vetuit, quod quidem ab aegro obseruatum fuit exactissime: mense praeterlapso, aegro denuo fasciam applicauit promissitque, die decimo quinto eum sanum fore: quo finito tempore cum nondum aeger brachium mouere posset, ad Cl. Auctorem accessit, qui, instituta disquisitione, brachium nondum repositum perspexit: adhibitis itaque antea purgantibus et venaesectione inunctioneque per vnguenta in loco affecto, praesentibus aliis chirurgis Cl. Auctor repositionem membri tentauit, sed frustra, nec ille sanatus est. Obs. 2. Sexagenarius, cum eius brachium sinistrum die primo octobris anno 1767 luxatum esset, quoque, vti prior, agyrtae se tradidit curae, nec recuperavit sanitatem. Venit itaque die 5 nouembris in ptochotropheum, nec, quanquam adhibita a Nostris cura omni, membrum vlllo modo restitui potuit.

p. 171. 9) *Observatio Cl. DUMAS de vulnere capitis.* Initio mensis octobris anno 1766 infans nouem annorum, cadendo partem anteriorem capitis vehementer lapidi impegit, ita, vt sensu omni destitueretur,

retur; tamen paullo post sine adiumento vilius surrexit, atque ad parentes domum peruenit. Versus vesperam vero, ob dolorem vehementem capitis, parentibus, quid sibi accidisset, enarrauit. Examinato itaque diligenter capite, nulla contusio inueniebatur; dolor tamen capitis augebatur, vomitusque nec non diarrhoea noctu puerum inuaserunt, qui et mane in soporem incidit cum sensuum defectu. In quo statu parentes venam incidi ob debilitatem infantis nolebant prius concedere, quam die tertio; quo facto infans statim ad se rediit vomitusque cessauit. Post duos menses Cl. Auctor in consilium vocatus, dolorem capitis vehementem, alternantem cum febrilibus motibus vagis extremitatumque inferiorum paralyti in aegro inuenit. Ex quibus omnibus Noster collegit, abscessum cerebri adesse; interim infantem medicamento purgante, cui anthelmintica iuncta erant, euacuauit, quo adhibito, infans glebam magnam vermium reiecit paullulumque melius se habuit: praeterea aluum per clysmata liberam seruauit, nec non pediluua ex plantis aromaticis, cum vino decoctis, adhibuit. Emaciatione tamen corporis debilitasque summa aliaque signa febris lentae, quibus aeger adficiebatur, cum indies augerentur, consilio Cl. Auctoris mense augusto anno 1767 ad thermas Aluerniae aeger missus est, vt ibi embroche institueretur; sed et hoc auxilium frustra tentatum est. Post aliquot dies vero ad angulum posteriorem et inferiorem ossis parietalis tumor castaneae magnitudinis se monstravit, qui, postquam in suppurationem abierat, paruaque puris copia effluxerat, abscessus denuo est consolidatus, dolore capitis deinde remisso, extremitatum inferiorum paralyti quoque sanata est.

10) Cl. SOYEUX *observatio de exstirpatione polypi uterini.* Anno 1723 die 23 iunii Cl. Auctoris
A 5 p. 175.
confi-

consilio vfa est femina aetatis quadraginta circiter annorum, infantum aliquot mater, quae per 4 annos iam haemorrhagia fere habituali laborabat, quam e prolapsu vteri pendere putabat: quâ de re, suadente obstetrice, quam consulebat, pessarium applicuit, quo auxilio adhibito, haemorrhagia non liberata quidem, sed adeo est emaciata, vt marasmo videtur confici. Hinc coacta fuit ob debilitatem asino vehi, ex quo cum aliquando decideret, accidit, vt pessarium et prolapsus, qui adesse videbatur, prociderent, moxque ipsa lipothymica in terram caderet: arcessitus Noster ad aegram, inuenit polypum, capitis fetus maturi magnitudine, colore subflauo, atque figura, caput alembici referentem, et ante labia vaginae vsque egressum, radiceque crassa instructum, firmiter adhaerentem; locum vero adhaesionis, ob magnitudinem, et quia totam vaginam replebat, inuenire non potuit. Protracto, quantum eius conditio patiebatur, polypo, in locum magis eleuatum ligaturam ex filo forti cerato iniecit, fortiterque sine aegrae incommodo constrinxit, eumque praescindere decreuit: incisione prima facta, magna copia sanguinis profluxit; resecto tamen toto polypo sanguinem ex eo egredi animaduertebat, et, peracta amputatione, ligatura sursum retracta, sanguinis fluxus quoque sistebatur. Polypus quinque librarum et vnciarum duarum pondus habebat. Ceterum aegra nec febrem suppuratoriam, nec dolorem vllum sentiebat, factisque quotidie quater iniectionibus, aegra paullatim restituta negotiis suis per 15 annos adhuc praeesse potuit.

Mense septembri.

p. 251. 3) *Descriptio morbi epidemici in urbe Ville, in Piccardia sita, grassati, exhibita a Cl. DUFOUR.* Mense octobri anni 1767 morbus grassari coeperat, qui
vsque

vsque ad diem 10 ianuarii anni 1768 duravit, et quo quinquaginta circiter homines diuersi sexus perierunt. Frigus summum in fine mensis decembris et initio ianuarii symptomata huius morbi adeo augebat, vt spatium quindecim dierum viginti homines morirentur. Ceterum morbus hic febris catarrhalis maligna erat, excitata per aerem impurum, humidum, per alimenta cruda, miseriam et laboris intemperantiam. Symptomata huc redibant, vt maxima pars aegrorum tertio quartoue die laboraret summa prostratione virium, torpore, quo totum corpus occupabatur: horrore, oppressione summa, dolore capitis vehementissimo, intumescencia glandularum colli, sublingualium et maxillarium cet. Praeterea facies rubra, oculi micantes, lingua viscido obfessa, cutis sicca, tussis violenta et quasi convulsiva, pulsus debilis, intermittens obseruabantur, cet. Post viginti quatuor vel triginta sex horas lingua media nigra fiebat et aeger sopore afficiebatur. Hoc tempore percipiebantur vt plurimum subsultus tendinum irregulares, vrina erat aquosa, aegri nonnunquam sudabant deiectionesque habebant, cum biliosas, tum dysentericas, quibus tandem morbus iudicabatur. p. 257. Diagnosys huius morbi facilis, sed prognosys valde fuit difficilis, praesertim curatione peruersa, in initio ab imperitis suscepta: hinc factum est, vt quamplurimi morte eriperentur. Aegros, a quibus Cl. Auctor in consilium vocatus fuit, hoc modo tractauit: ineunte morbo, tantum leuia remedia adhibuit; cum vero omnes fere aegri nausea lassitudineque in morbi initio affecti essent, vomitoria purgantiaque dedit; primisque viis depuratis, morbus optime cessit. Screatus difficilis sine incommodo processit et oppressio cessauit, pituita in pectore soluta, huic medicamentis bechicis, transpirationeque leui excitata, succurrit. Potus quotidiani

diani loco aquam hordeaceam et oryzae, infusum croci et flor. chamomill. hederæ terrestris æt. adiecto pauxillo melle et nitro praecepit; nec non apozemata ex decocto prunorum tamarindorumque commendauit. Oxymel etiam simplex, aqua copiosa dilutum, adhibuit: loco iusculi carniū decoctum panis dedit, indicationemque euacuatoriam per totum morbum eo vsque profectus est; donec omnia symptomata cessarent. Ad primarum viarum tandem laxitatem debellandam, morbo exeunte, praescripsit potum compositum ex cortice Peruiano, diascordio et syrupo absinthii, quem quotidie mane auellanae magnitudine exhibebat cum infuso theiformi, ex herba centaurii minoris et chamaedryos. Quae ratio medendi ad aegros recreandos optimo cum euentu adhibita fuit.

P. 260. 4) EIVS D. *Obseruatio de noxa fungorum esculentorum.* Cl. Auctor saepe sine noxa fungos, quos valde appetebat, comedit; semel tamen iis comestis, praeterlapso quinque horarum spatio, sensit pondus in regione epigastrica; quod per ambulationem in aere liberiori dissipare cogitauit: inter ambulandum Cl. Auctor nonnulla folia hyoscyami decerpfit, quorum, digitis tritorum, odorem virosū naribus attraxit, vnde dolore capitis est affectus; interim, cum Noster ambulationem continuaret, ei grex vaccarum obuiam venit, ex quo vna ad Nostrum iter direxit, quam cum baculo percutere vellet, in dumetum introrupit, ibi horam vnā amplius sine motu sensuque iacuit: deinde, cum ad se rediisset, sudorem frigidum et respirationem difficilem sensit, simulque copiam magnam sanguinis reiecit, faciesque, cohibito sanguinis per venas reditu, et caput tumefacta erant, oculique prominebant: hac conditione Cl. Auctor ad aegrorum, quorum curam agebat, aliquem intrauit, ibique frictionibus

nibus per totum corpus institutis, sensit cardial-
giam anxietatemque vehementem, vomituque ma-
gnam copiam muci, fungis mixtam, reddidit: deinde
dolorem capitis intolerabilem percepit, adhibitis
nonnullis clysmatibus cum aceto vini mixtis, do-
lores colici vehementes sunt orti sudoresque frigi-
di, nec non deiectiones mucosae, sanguine tinctae,
per aluum euacuabantur. Vsurpato vero oxymelle
simplici, aqua diluto, sanguinisque missione, pedilu-
viis et balneis, ex aqua frigida et aceto compositis,
capiti applicatis, sanitatem pristinam recuperavit.
Ex quibus omnibus Cl. Auctor concludit, omnium
fungorum esum perniciosissimum esse.

7) Cl. MARTINI *observatio de corpore peregrino*, p. 275.
(*spina piscis molua dicti*). Mercator quidam
cum *moluam* siccam, quam super armarium im-
posuerat, decidentem retinere manibus vellet, im-
pegit spinam huius piscis volae manus dextrae: qua
laesione ab initio non adeo magno dolore afficiebatur,
post aliquot vero dies nihil sine dolore comprehendere
potuit, tumore in loco laeso exorto. Tum
amicis auctoribus emplastrum ad corpus peregrini-
um extrahendum per quatuor menses sine effectu
applicuit, sed tumor et dolor indies sunt aucti.
Cl. Auctor itaque aduocatus, cum perspexisset cor-
pus peregrinum suppuratione non posse educi, ex-
stirpationem totius tumoris aegro suavit: quae etiam
hoc modo est peracta, vt, per incisiones laterales
duas huius tumoris, corpus illud, circiter tres lineas
longum, educeret aegrumque spatium quindecim die-
rum sanaret.

Mense nouembri haec habentur.

3) Cl. COSTE *observationes de usu extracti ci-* p. 420.
cutae. Obs. I. Cl. Auctor die 21 ianuarii anni
1766, a femina, aetate 55 annorum in consilium
voca-

vocatus est, quae per tres dies dolore punctorio in pectore adeo vehementi excruciatum erat, ut nulla quiete uti posset: ceterum dolore capitis maximo, respirationeque difficili laborabat, ex quibus symptomatibus colligebat, aegram pleuritide affectam esse, pulsus tamen mollis, debilis absentiaque febris et linguae habitus, aliam causam huius morbi fuisse Nostro indicare videbantur. Instituto itaque examine, laborabat aegra veris doloribus osteocopis, qui a morbo venereo, ante 40 annos male curato, nunc oriebantur, et in brachio dextro, capite, collo, pectore, scapulis, dorso et femoribus, maculae, magnitudinem duplicis grossi aequantes, colore purpureo liuidoque distinctae, reperiiebantur. Interim prae doloris vehementia nullum membrum mouere poterat. Quae cum ita essent, Noster rationem usitatam in eiusmodi morbis, veritus, ne aegra succumberet, noluit adhibere: quae de re usum cicutae, quam Cl. STÖERCK in eiusmodi morbis bono cum eventu adhibuit, experiri constituit. Praemisso itaque purgante, mane et vespere duas pilulas, granorum trium pondere, ex extracto cicutae compositas, exhibuit, simulque infusi scolopendrii vasculum, in quo grana octo nitri soluti erant, superbibendum dedit. Die sequente, cum dolor aliquo modo mitigatus esset, tres doses assumere iussit. Die 27 ianuarii in pede sinistro cum dolore maculae eiusmodi, uti in aliis partibus, efflorescebant: hinc quaevis dosis pilula una aucta est. Die proximo aegra melius paululum se habuit, et quiete uti, et membra denuo mouere potuit: usu itaque harum pilularum, nec non infusi scolopendrii cum nitro continuato, maculae non solum evanuerunt, sed aegra quoque die 16 martii restituta, tantum de edendi appetitu deprauato quæstata est, qui et ipse per usum granorum decem rhabbari et tan-

tantundem corticis Peruuiani restitutus dicitur. p. 429.

Obs. 2. Die 19 ianuarii 1767 quidam per duos iam menses tumore in latere sinistro laryngis super cartilagine thyroideam, pisi magnitudinem aequante, qui vehementer dolebat, et qui, post aliquot dies sponte ruptus, ichorem foetidum effundebat, affectus erat, cuius labia callosa vasis varicosis, sanguine nigro repletis, praedita erant, doloremque summum, qui propagabatur ad musculum vsque orbicularem et oculum ipsum eiusdem lateris, percipiebat. Sanato quotidie vlcere, aqua cicutae et saponis, adhibitoque emplastro basiliconis et venaesectio-
ne, ad plethoram imminuendam ophthalmiamque auertendam, quotidie granum dimidium extracti cicutae eo cum successu dedit, vt initio martii, vlcere consolidato, aeger sanitate pristina gauderet. Hi sunt morbi, in quibus Noster cum fructu cicutam adhibuit; quam frustra dedit, 1) in obstructione lienis, iussu alius medici, per plures annos obstructione permanente; 2) in podagra; 3) in vlceribus narium nec non 4) in femina, vlceribus scrophulosis laborante.

6) Cl. NOLLESON *observatio de aneurysmate* p. 464.
vero arteriae popliteae cum tumore complicato, tandem suppurante. Mense octobri anni 1757 miles tormentarius, tumorem in genu flexura pedis dextri, magnitudine parui fructus melonis, habuit, in quo cum nec rubor, calor, pulsatioque reperirentur, is, ortus à lymphâ stagnante, ab alio chirurgo perito ad suppurationem per cataplasmata emollientia est perductus: die octauo fluctuatione in locis duobus percepta, die sequenti tumore aperto, pus sanguinolentum foetidum est effusum: adhibita, quae in eiusmodi casu requiritur, deligatione conueniente per tres dies, postea denuo emollientia ad suppurationem vtilem excitandam sunt
vsur-

vsurpata; sed die sexto haemorrhagia magna est oborta, quae nec ab aegro ipso, nec ab adstantibus prius percepta fuit, quam aeger convulsionibus correptus moriretur. Sectione in loco morbofo instituta, Cl. Auctor inuenit arteriam popliteam distentam ad magnitudinem oui gallinacei, tunicasque valde tenues et ruptas, nec non inter musculos puris copiam etiam tum reperit.

Mense decembri.

p. 503. 3) *Epistola* Cl. LABROUSSE ad Cl. RENARD *de virtute hyoscyami*. Puellam, per tres iam annos doloribus vagis rheumaticis vexatam, contra quos multa remedia sine fructu adhibita fuerunt, cataplasmate ex foliis hyoscyami et mica panis albi et lacte composito partique dolenti saepius imposito, sanauit. Eodem modo feminam restituit, quae tremore per totum corpus conatuque vomendi ac sudore faciei afficiebatur: quae symptomata dolorem vehementem paralyfinque in femoribus reliquerant. Multis quoque adhibitis remediis frustra, tandem Cl. Auctor aegram, applicato hoc cataplasmate, per tres dies, sanauit.

p. 551. 10) *Quaestio medico-chirurgica de ascite* Auctore Cl. RENARD. Puella, circiter trigesimum annum agens, constitutione corporis debili per plures annos tempore vernali balneis tepidis vsa est. Interea maior edendi cupiditate sanitateque meliore frui videbatur. Initio vero autumnii cum fluxus menstruus, nullum ordinem seruans, cum abdominis inflatione et induratione insequerentur, medicus, quem consulebat, morbum hunc a plethora ortum esse arbitratus, venaesectionem suasit, quam adhibere noluerunt; symptomatibus vero auctis febreque per interualla accedente, tandem secta est vena; sed sine aegri leuamine. Medicus itaque,
cum

cum sanguis crustam inflammatoriam ostenderet, sanguinis missionem repetere suavit; sed hac recusatata, purgantia sunt adhibita, morbusque quotidie peior est redditus, vomitusque adeo vehemens ortus, ut omnia, et aqua ipsa, reiicerentur, urinaeque parua copia fecerneretur, ac in abdomine, quod in immensam magnitudinem increuerat, fluctuatio perciperetur. Adhibitis medicamentis resoluentibus internis et externis, diaphoreticis diureticisque, vomitu cessante, euacuationes quoque bene processerunt, febreque remissa et abdomine ab aqua liberato, iam sanata videbatur; tumore tamen in regione hypogastrica persistente, quo quotidie aucto, post aliquot septimanas abdomen denuo aqua quam maxime repletum erat, quae nullis diureticis educi poterat: hinc punctione suscepta, circiter octodecim librae aquae turbidae, ac salsae, sunt euocatae; abdomen tamen adhuc multam aquam, quae per cannulam non educi poterat, retinuit. Itaque denuo diuretica purgantia et resoluentia, sed frustra sunt adhibita: hinc, conditione morbi quotidie in peius ruente, aegra tandem succubuit. Quaeritur itaque, an venaesectio in initio administrata hydropem ascitem produxerit?

In tom. XXX. haec notatu digna deprehenduntur. Tom. XXX.

Mense ianuario 1769.

2) Cl. ROUX *observatio de hydrocephalo inter-* p. 20.
no. Frater Cl. Auctoris, viginti annos natus, temperamento melancholico instructus, de dolore capitis, cum febre coniuncto, conquestus, venaesectio-
ne mox in initio bis in brachio instituta, dolorem aliquo modo leniri sensit; sed torpore manuum affectus est, vomitorio autem altero die ex tartaro
Tom. XIX. P. I. B eme.

emetico cum aqua cinnamomi ei dato, magnam aquae copiam, bile tinctam, euomit. Aeger per duos dies bene se habuit, tertio vero accedebant motus conuulsiui, qui fere totum corpus corripere-
rent, et excretio spumae sanguinolentae ex ore: quibus motibus summum animi deliquium, a quo valde irritatus, tanquam perterrefactus, per breue tempus, excitabatur. Respiratione difficili subsequente, praecipiente altero medico, qui in consilium altero die vocabatur, administrata fuit venaesectio in pede, exhibito simul per vices, cum aeger os firmiter clauderet, vomitorio ex tribus granis tartari emetici et drachmis duabus salis Ebshamensis in aqua soluti, per quod semel tantum vomitum passus est, sed sine conuulsione, quae per diem aliquoties aegrum vexabant, idque animi deliquio non remisso. Hinc versus vesperam incisa vena iugularis, emeticumque denuo, sed sine effectu et cum motuum conuulsiuorum exacerbatione, adhibitum est, vesicatoria furis et nuchae applicata sunt, nec non clysmata immissa. Nec aliam tamen morbi mutationem reperit medicus, nisi, quod motus conuulsiui non adeo crebro, usurpatis his remediis aegrum inuaderent; sed die septimo accesserunt motus conuulsiui, qui totum corpus occuparent, adeo vehementes, vt aeger iis succumberet. Sectione cadaueris suscepta, viscera in thorace atque infimo ventre omnia sana reperiiebantur, nisi, quod hepar, colore fusco inductum, et bilis vesiculae felleae subnigra a conditione naturali quodammodo aberrarent. Vasa vero cerebri sanguine distenta erant, et ventriculi cerebri aqua turgidi, nec non inter cerebellum eleuatum et duram matrem canalemque spinalem aquae turbidae sanguinolentae magna copia inuenta est: in qua etiam Cl. Auctor causam omnium symptomatum mortisque ponit. Noster praeterea
monet

mōnet, Cl. WHYTT *) in hoc morbo non adnotaſſe, torporem manuum doloremque cutis faciei, eumque etiam hoc neglexiſſe, quod aqua, quae et colore diuerſa, non ventriculis cerebri tantum contineatur, ſed etiam in canali ſpinae dorſi effuſa reperiatur.

4) Cl. DE ROUGERES *obſervationes de mor-* p. 44.
bis quibusdam cum vermibus coniunctis. *Obſ. I.* Vnus ex fratribus Cl. Auctoris in infantia prima, quinque annos natus, paralyſi cum immobilitate omnium membrorum doloreque vehementi, cum tangere-
tur, laborabat; ceterum ſanus erat. Adhibitis, cum vermes aſſe viderentur, tam intrinſecus, quam extrinſecus anthelminticis, poſtquam magnam eorum copiam reiecit, conualuit. *Obſ. 2.* p. 46.
Cum puer quatuordecim annorum, de dolore vehementi lateris vnius punctorio conquereretur, venaeſectio in brachio eiusdem lateris inſtituta dolorem non diſſipauit, ſed aeger delirare incepit, abdomineque, quod tenſum et obſtructum erat, laxato, poſtquam foeces copioſas foetidas excreuerat, dolor punctorius in latere remiſit; abdomen vero vehementer doluit: hinc etiam euacuatio aluina per remedia conuenientia adiuuabatur; malum tamen augebatur et poſtquam haemorrhagia narium copioſa afficiebatur, quae per ſuccum vrticae a parentibus cohibita fuit, mox in ſoporem adeo profundum incidit, vt nullum vitae ſignum, niſi, cum tangeretur, vel in vnum aut alterum locum moueretur, exhiberet: in qua conditione per tres dies manſit, et tertio, poſtquam ſudor copioſus, qui per 24 horas durabat, acceſſit, cum per alium,
B 2 quae

*) *Obſ. on the dropſy in the brain, by ROBERT WHYTT cetr. vid. commenatr. noſtr. Vol. XVII. p. 225.*

p. 47. quae tunc soluebatur, quadraginta vermes amplius excreuisset, conualuit. *Obs.* 3. Homo quidam die 28 octobris 1766, lapsus in latus dextrum dolorem vehementem, inter vltimam veram et primam spuriam costam percepit, qui per se paululum mitigatus per duos menses leuior fuit; hoc tempore vero praeterlapso subito, adeo vehemens denuo dolor lancinans eum inuasit, vt in lecto manere cogeretur. Post purgationem vero factam, ope agarici trochiscati melius se habuit, sed paullo post febre tertiana, tussi sicca, nec non vomitu affectus est, per quem quotidie, praecipue si latus dextrum, in quo causa doloris, premeretur, circiter tres libras materiae viscidae, sanguine tinctae, excreuit. Ita mansit vsque ad diem 20 ianuarii 1767; quo dolor per vomitum, ab infuso scordii excitatum, aliquot lumbricis eiectionis, cessare videbatur. Die vero 8 februarii et 19 martii omnia peiora reddebantur; nam tussi conuulsiva, per quam materiam foetidam, sanguine tinctam, cum difficultate expuebat, nec non dolore vehementer in hypochondrio dextro aucto valde, cruciabatur. Exhibita portione purgante ex semiuncia agarici trochiscati, taeniam decem vlnarum excreuit, et paullo post sanitas ei est reddita. *Obs.* 4. Vir viginti septem annorum de dolore summo capitis et punctorio lateris conquerebatur. Sanguine satis copiose misso ex brachio, dolor quodammodo sopiebatur; post viginti quatuor horas vero maiori cum vehementia dolor capitis rediit, coniuncta cum nausea haemorrhagia narium, pulsu intermittente; nec non aluus, haecenus clausa, aperiebatur, quae etiam aperta, per emulsiones sale mirabili GLAUBERI addito seruabatur; sed aeger, etsi per aliquot dies melius se haberet, denuo, pulsu frequente spasmodico accedente, delirare incepit, cum subsultu tendinum et sopore pro-

profundo, abdomen tensum dolebat, vrina parca flammea excernebatur, oculi prominentes in gyrum agebantur: quae omnia durauerant, donec aliquot vermes mortuos, fere exsiccatos, reiiceret. Continuatis itaque anthelminticis, sexaginta vermes amplius expellebantur, et aeger, etsi tarde, pristinam tamen sanitatem recuperavit. *Obs. 5. Puella p. 51.* quatuordecim annorum, saepius motibus epilepticis, abdomine tenso, doloreque summo ad scrobiculum afficiebatur; sed cum, adhibitis per aliquot dies anthelminticis, multos vermes excreuisset, motus epileptici, quibus quinquies et sexies per diem vexabatur, sedati, usu anthelminticorum, per totum mensem continuato, prorsus deseruerunt. *Obs. 6.* Femina sexaginta octo annorum, per plures annos ex improviso quotannis bis vel ter functionibus omnibus destituta, pulsu celeri et spasmodico, debilitate summa, obstructioneque aluina afficiebatur: vermes, quos eo tempore sursum et deorsum reddere solebat, usum anthelminticorum indicabant continuum, quibus prospero cum euentu adhibitis, nonnunquam vna vice centum sexaginta amplius vermes sunt excreti.

7) Cl. GOSSE *epistola de usu olei lini in haemoptysi.* p. 83. Cl. Auctor secundum rationem, a Cl. MICHAL *) praescriptam, oleum lini cum syrupo, ex althaea et papauere albo composito, exhibendi in haemoptoicis optimo cum effectu. adhibuit in femina quinquaginta sex annos nata, quae per tres dies sanguinis spumosi vncias circiter quatuor reiecit, cui quotidie cochlearia duo huius olei exhibuit, atque sic eam sanauit.

B 3

Mense

*) Vid. Journal de Med. Tom. XVII. et commentar. nostr. Vol. XIII. p. 235.

Mense februario.

P. 127. 3) Cl. PLANCHON *observatio de immersione in aquam frigidam syncho simplici utili.* Anno 1760 aestate, cum calor magnus saeuiret, vidit Cl. Auctor iuuenem vegetum octodecim annorum febre hac laborantem, cui etsi per venaesectiones nonnullas ex brachio satis magna sanguinis copia educta, et purgantia, clysmata et nitrosa applicata essent, ille tamen delirio adeo vehementi correptus est, ut die septimo morbi ex improviso e lecto profili-
ret et furibundus praeceptorem suum, terrore per-
motum ac fugientem, cultrum manu tenens, in
hortum insequeretur. Praeceptor, cum paululum
ad se rediisset, aegrum fortiter allocutus in fugam
denuo coniecit, qui vehementer inde perterrefactus,
ne verberibus affligeretur, se in puteum praecipi-
tauit, in quo paululum commoratus ob frigus aquae
ad se rediit, et, ut extraheretur, vehementer petiit:
quo facto in lectum denuo repositus, statim sudore
copioso prorumpente a febre sanatus est.

P. 134. 4) Cl. COSTA *observatio de seminibus hyoscyami nigri, intrinsecus assumtis, nocentibus.* Homo qui-
dam doloribus vehementibus, profectis a tumori-
bus haemorrhoidalibus, laborans, suasu cuiusdam
ad eos sanandos, tanquam remedium specificum,
tres uncias seminum hyoscyami in vino albo gallico
assumere constituit; sed vnam eorum, simul tantum
assumptam, mox haec symptomata insecuta sunt: ni-
mirum calorem summum per totum corpus, gra-
vedinem capitis cum nausea summa, visusque ob-
nubilationem sensit, et paullo post furibundi ritu
maximo cum clamore de dolore capitis et abdomi-
nis conquestus est: facies apparuit liuida, oculi
rubri, torui, splendentes, venae iugulares et extre-
mitatum, nec non totius faciei sanguine maxime
turgebant: deinde motibus convulsivis et deliriis
adeo

adeo vehementibus affectus est, ut a nemine in lecto superari posset; tempore vero, quo hi motus remittebant, muscas captabat et flocculos legebat, prurituque adeo vehementi cruciabatur, ut cutem perfricare cogeretur, ceterum omnia potulenta, quam maxime abhorrebat. Pulsus celer et debilis interdum impediabatur. respiratio vero naturalis erat. Ad aegrum sic affectum Cl. Auctor duas horas post assumptionem huius specifici accersitus, nesciens causam horum symptomatum, donec instituta disquisitione longa inueniret residuum infusi ex feminibus parati et cognosceret, haec esse semina hyoscyami nigri: exhibitis itaque mox emeticis clysmatibusque, aeger omnia semina assumpta sursum et deorsum excreuit, symptomataque paululum remittebant, ac, cum sudor sequente die tempore matutino prorumperet, copioso praecipue in extremitatibus inferioribus, qui per duos dies continuo sine virium debilitate durabat, relictaque per aliquot dies visus obnubilatione, pristinam sanitatem recuperavit.

5) *Observatio Cl. BAILLAY, de morte hominis, p. 147. ex fulmine non procul ab Aurelia subito inducta.* Anno 1768, die 1 septembris cum per totam noctem fulgurasset, tempore matutino circa horam septimam, ictu fulminis vehementi observato, renunciatum est, feminam eo in via publica esse interfectam, quae ad vendenda legumina, quae in corbe capiti imposito portabat, oppidum tendebat. Instituta post horas duodecim cum Cl. MONNIER sectione cadaueris, haec inuenta sunt: capillorum capitis ne vnus quidem combustus erat, his remotis, in integumentis in parte laterali superiori dextra capitis vulnus leuiter contusum magnitudine semioboli repertum est, ex quo parua sanguinis coagulati copia effusa, caput ad modum laquei, sex trans-

versos digitos longi, et duas lineas lati circumdabat: facta incisione in integumentis capitis ad examinandum locum contusum, odor fortis sulphureus, qui sequente die adhuc versus vesperam in conclavi aderat, perceptus est; vulnus vero, sub quo aliquot unciae sanguinis fluidi inter integumenta et musculos repertae sunt, non penetrabat usque ad ossa: ceterum vasa pericranii et faciei omnia sanguine fluido, qualis in homine viuo esse solet, maxime distenta et repleta erant. Dissecto et remoto cranio sub hoc et dura matre, nec non in opposita parte contusionis mensura fere dimidia sanguinis rarefacti reperta est, omnia quoque vasa cerebri, cerebelli, durae et piaae matris sinusque sanguine eiusmodi maxime distenta erant, nec non ex ore, naribus, auribusque sanguis effluebat: ceterum ossa caluae, nec non pericranium, uti et viscera thoracis abdominisque sana reperta sunt. His expositis, duas quaestiones Cl. Auctor proposuit, quarum prima est haec: Quomodo tanta sanguinis ex vasis effusi copia in cerebro nata sit, cum ictus fulminis nullam aperturam, nec fracturam in cranio fecerit? altera, cur duodecim post mortem horis sanguis fluidus adhuc fuerit?

p. 152. 6) Cl. SAULQUIN *observatio de efficacia mercurii contra hydrophobiam*. Inter permulta remedia, quae contra morsum animalium rabidorum laudantur, Cl. Auctor mercurium cum Cl. DESAULT *) omnibus praefert. Qua de re observationes nonnullae, de hominibus, ab animali eiusmodi laesis, mercurioque sanatis recensentur: nimirum

*) vid. PIERRE DESAULT dissertations sur les maladies vénériennes; avec deux dissertations, une de la rage, l'autre sur la Phthisie, Tom. II. à Bourdeaux, 1733. 8.

mirum ante aliquot annos, cum homines nonnulli a lupo rabido laesi essent, vnus ex iis in facie, brachio et manibus vulneratus, mox a chirurgo perito, vulnere loto et depurato, drachma vna et dimidia vnguenti mercurialis camphorati inunctus est: quam inunctionem tertio quouis die repetitam, sex septimanas amplius continuauit, adhibitisque, vt saluatio praecaueretur, purgantibus, venaesectione cet. restitutus est. Alter vero ab eodem lupo laesus, cum alia remedia inutilia adhiberet, rabidus periit. Tres rustici quoque, laesi a cane rabido, quorum vnus specifico communicato vsus, periit; reliqui duo vero, inunctione mercuriali conseruati sunt. Ceterum contendit Cl. Auctor, mercurium eiusque praeparata, et intrinsecus adhibita certissimum in hoc morbo esse auxilium, sed vsum eius diuturnum requiri.

Mense martio.

4) Cl. DURAND *observatio de morbo singulari.* p. 258.

Femina triginta sex annorum, die 9 aprilis 1761, partum naturalem edidit, fluxumque lochiorum copiosum habuit, vsque ad diem 26 eiusdem mensis, quo subito, sine causa manifesta, cessarunt, atque ipsa die sequente colica vehemente affecta, nec non febre, qua per tres menses fere laborabat. Die 28 chirurgus quidam in consilium vocabatur, qui duobus prioribus mensibus duas venaesectiones suasit, decies aluum purgauit, quadraginta clysmata amplius adhibuit, ac per mensem integrum emollientia fomentationesque abdomini applicuit. Qua ratione vsque ad mensem maium continuata, mense iunio clysmata tantum nonnulla, ex iusculo confecta, nec non medicamenta, febrem propellentia, vsque ad mensem iulium, quo aegra omnia remedia recusabat, exhibuit. Quo tempore aegra re-

B 5

stituta,

stituta, menstruaque denuo per decem menses iustum ordinem seruare visa sunt; sed circa hoc tempus loco fluxus menstrui fluor albus, nec non dolor infimi ventris, qui quotidie vehementior fieret, apparuit cum tumore, qui oui magnitudinem referebat, in hypochondrio sinistro, et ex vno latere in alterum, aegra se vertente, mouebatur. Mense februario 1767, abdomen adeo tumere incepit, vt aegra se grauidam esse crederet: absente chirurgo, quo per alias occasiones vti solebat, alterum aduocauit, vt conditionem ipsius examinaret, qui dicebat, aegram scirrho vterino laborare; quod cum aegra nollet credere, alius chirurgus vocatus, affirmavit, illam grauidam esse tempusque partum edendi accurate definiuit; sed hoc praeterlapso, potius abdomen magis tumere incepit, tussisque adeo violenta mense ianuarii 1768. eam inuasit, vt nulla quiete vti posset. Tandem cum Cl. Auctoris auxilium mense februario implorasset, ille inuenit pulsum debilem, frequentem, abdomenque magnitudine admirabili maximeque durum, et in eo passim partes induratae apparebant; praeterea vero nullam fluctuationem percepit. Corpus macie, quam maxime confectum faciesque cadauerosa, nec non pedes oedematosi erant, ac circa vmbilicum dolor lancinans, et inflammatio conspicua ineunte mense martio, integumentorum eleuatio ad pugni magnitudinem, omphalocelum referens, quae digitis pressa recedebat, obseruabatur: ceterum maculis nigricantibus, vehementer dolentibus, tumor obsessus erat, reductionemque chirurgus frustra tentabat: hinc Cl. Auctor ad gangraenam, quam timebat, praecauendam, fomentationes crebro repetitas ex cortice adhibuit. Medio martio, excoriatione in parte inferiori tumoris orta, humor limpidus copiosus exsudabat, sed sine imminutione tumoris abdo-

abdominisque. Respiratio tunc oriebatur quam difficillima, nec non syncope, ita, ut aegra, morti proxima videretur: quibus symptomatibus paullulum mitigatis, ineunte mense aprili, ex tumore circa umbilicum rupto, massa carnosae ex ulceribus parvis, ichorem fere rodentem fundentibus, quam late patet pollex unus prorumperebat, ac sequente die a chirurgo leuiter trahendo ad longitudinem pedis unius et dimidii extracta fuit: quae massa in initio mollis erat; post horam vero dimidiam, quam maxime dura volumineque maior fiebat, et tacta adeo doluit, ut aegra prae doloris vehementia extractionem ulteriolem non ferre posset. Gangraenam huius massae Cl. Auctor metuens continuo eam decocto corticis fouendam curauit. Cum vero corruptio eius quotidie augeretur, atque ea gangraena iam afficeretur, metuens, ne viscera infimi ventris ea inficerentur, amputationem eius die 16 aprilis, injecta prius ligatura, non procul a ligatura suscepit, quam haemorrhagia non adeo magna secuta est, vulnerisque deligatio tantum sicca instituta est in initio; sequentibus diebus vero et postquam reliqua massa denuo in cavum abdominis recessisset, injectiones ex cortice factae, ac vulnus digestiuis est obtectum, infecutaque suppuratione bona, tumor non solum est imminutus, sed cicatrix quoque post tres dies formari incepit. Accedente vero initio mensis maii diarrhoea magna, respirationeque quam maxime difficili, cui adiuncti erant syncoptici insultus frequentes, quae symptomata omnia per octo menses continuos durauerant, aegra miserrime est excruciat; sed circa hoc tempus denuo, quod mirum videbatur, omnia in melius mutabantur; aegraque omnibus doloribus liberata, viribus novis acquisitis, incedere poterat; tumore tamen abdominis venis varicosis

ricos copiosissimis in superficie instructo, laborans viuebat. Historiam vltiorem exitumque huius morbi proxime Cl. Auctor tradere promisit.

Mense aprili.

P. 355. 7) Cl. LAUGIER *observatio de duabus operationibus tumoris cancrofi in scroto.* *Obs. 1.* Mense iunio anni 1762, vir 56 annorum, cadendo scrotum testiculumque compressit. Dolor non adeo magnus mox euauit; testiculus vero sensim tumere incipiebat, et adeo increuit, vt aeger ob ponderis magnitudinem anno 1766, mense maio, lecto se continere cogeretur. Quem tumorem artem veterinariam exercens discutere promisit; ideoque cataplasmata applicuit, ex helleboro parata, vnde in tumore dolor perterebrans suppuratioque oriebantur. Die 17 iulii Cl. Auctor aegrum inuenit febre lenta laborantem, et quam maxime extenuatum debilitatumque, ac scrotum magnopere intumefactum, quod in parte inferiori exulceratum fungosumque erat, et continuo sanies foetidissima effluebat, aegerque Nostrum, vt operationem institueret, vehementer implorauit. Applicatis tumori foliis nonnullis belladonnae per aliquot dies, nec non analeptics exhibitis, die 21 operatio suscepta est: in regione perinaei incisione facta sursum duarum linearum interuallo, a glandula prostatica vrethraque directa: tumorem extirpauit, et applicatis compressis siccis ex telis linteis, quae per decem horas apprimebantur a homine ope disci lignei: aegro, qui debilitate summa pulsuque, qui vix sentiebatur, laborabat, intrinsecus potiones analepticae exhibebantur, atque, cum sequente die melius se paululum haberet, vulneris deligatio cum digestivis suscepta est. Suppuratione vero finita, mense octobris aeger pristinam sanitatem recuperauit.

Obs.

Obs. 2. Mense iunio anni 1767 homini natus p. 359. est in testiculo dextro tumor paruus, nulla caussa externa violenta, vti aeger dicebat, excitatus, qui quidem quotidie sine dolore augebatur. Mense decembri vero, cum ligna scinderet, accidit, vt ad mal-leolum pedis sinistri dolabra laederetur, ex qua lae-sione dolor vehemens ortus, vsque ad testiculum tumefactum, qui et ipse maxime dolebat, propaga-batur. Itaque die 9 februarii Noster in consilium adhibitus, aegro suasit operationem, quam ipse, vti in hernia fieri solet, instituebat, ligatis nimirum vasis spermaticis, testiculum separauit vulnusque lin-teis secundum artem curauit, ita, vt spatio mensis vnus aeger sanaretur.

9) Cl. TILLOSOY *observatio de reductione* p. 370. *colli ossis femoris fracti.* Puella aetatem 5 annorum assecuta, collum ossis femoris sinistrum, rota currus traiecta, oblique fregit: quae fractura cum vulne-re in regione inguinali complicata erat. Repositis ossibus Cl. Auctor vsus est apparatu, a Cl. MAR-TIN *) ad fracturam huius ossis sanandam inuen-to, eo quidem cum successu, vt intra duos menses puella prorsus conualesceret.

Mense maio haec habentur.

3) Cl. PLANCHON *observatio de marasmo sin-* p. 422. *gulari (éthisie abdominale) infantis quinquennis.* Men-se maio anni 1767, Cl. Auctor curam infantis quin-quennis suscepit, qui inde a mense nouembri ma-rasmo valde extenuatus erat, abdomine vehementer tumido, ac febre lenta tussique vehementi labora-bat. Regio hypochondriaca dextra omnium maxi-me eleuata erat. Praescripsit Cl. Auctor syrupum rhabar-

*) vid. Journal de Méd. 1768. mens. febr. et comm. nostr. Vol. XVII. p. 255.

rhabarbari, medicamenta, vermibus expellendis apta, et leniter aperientia, quae omnia aeger recubabat: hinc falem Deppensem (*Dieppe*) quotidie ad drachmam dimidiam, quam aeger sine incommodo assumebat, exhibuit, huiusque usu per septem septimanas continuato, sanatus est.

p. 440. 6) Cl. BOUEIX *observatio de epilepsia, a suppressione menstruorum orta.* Puella, aetatis annum vicesimum primum agens, plethorica, sanitate plena praedita videbatur, donec motibus epilepticis, quos per sex septimanas iam experta erat, laborare inciperet. Instituto examine, Cl. Auctor reperit, menstrua iam per aliquot menses non fluxisse, aegramque, ac eo tempore doloribus capitis vehementibus, haemorrhagia narium, vertigine, colica cetr. laborasse. Veruntamen post aliquot septimanas dolor capitis, cum visus debilitate adeo auctus est, ut aegra, post haemorrhagiam narium magnam, sensibus omnibus destituta, per horae quadrantem iaceret; postea vero, cum ad se rediisset, quid passa esset, nesciebat. Qui paroxysmus quotidie semel interdum, et bis, nullo servato ordine, eam aggressus est. Cum Cl. Auctor causam huius morbi a plethora nimia, menstruisque suppressis oriri, motusque epilepticos a dilatatione nimia vasorum cerebri, substantiam eius comprimentium, proficisci perspiceret, mox instituit duas venaesectiões in brachio, potionemque purgantem cum amaris iunctam exhibuit: ac decoctum, potus quotidiani loco, ex herbis aperientibus paratum dedit, nec non ad menstrua denuo prouocanda balnea et pediluvia tepida, ad vasa abdominalia vterinaque relaxanda, quotidie usurpari iussit. Quibus omnibus adhibitis, paroxysmos epilepticos intra octo dies, aliquoties experta est. Instituta itaque denuo venaesectiōne in pede, ac quotidie propinatis tribus cyathis aquae

aquae mineralis artificialis sequentis modo compositae; nimirum ex limaturae martis vnciiis tribus, cremoris tartari vnciiis sex, quae 4 mensuris aquae affusis per quatuor horas in aheni ferreo coquendae et colandae sunt, curam peragebat. Huius aquae tribus quatuorue cyathis quotidie cum vsa esset, per aliquot septimanas, insultibus epilepticis imminutis menstrua iusto ordine, et satis magna copia accesserunt aegraque sanitatem pristinam recuperavit.

5) Cl. MARTIN *observatio de morbis nonnullis aurium.* *Obs. 1.* Vir triginta septem annorum, cacochymicus die 27 octobris 1764, qui ob suppurationem auris dextrae, qua laborabat, intermissam, et ob pondus nimium, quod in capite percipiebat, vix progredi poterat, Cl. Auctorem consuluit. Quae symptomata Noster cum a suppressione vel resorptione puris orta esse crederet, vesicatoria applicare iussit, per quae quidem aeger levamen percepit, suppuratio vero hoc auxilio non restituta, sed accedente febre, aeger mortuus est die 25 nouembris. Sectione cadaueris instituta, cerebrum eiusque membranas sanas vidit, praeter quod dura mater paullulum eleuata superficiei posteriori ossis petrosi adhaerebat. Separata itaque dura matre, totum os carie inuenit ita exesum, vt stylus vbique ad aurem vsque immitti posset, ceterum materia gypsea repletum erat. Causam vero huius morbi Cl. Auctor expiscari non potuit. *Obs. 2.* P. 455. Feminae aetatis triginta sex annorum, post febrem putridam superatam, parotide dextra exulcerata, pus ex aure, cartilagine conchae exesa, effluxit. Parotide adeo sanata, pus quotidie ex aure profluere non destitit, aegraque quotidie magis magisque per febrem lentam debilitata moriebatur. Sectione cadaueris suscepta, totam cauitatem meatus auditorii, nec non cellulas ossis mastoidei pure repletas

p. 456. pletas, ac carie paullulum exefas inuenit. *Obf. 3.*
 Praefectus nauis, natus circiter feptuaginta annos, cacochymicus, qui per quatuor iam annos mari derelicto dolore auris, non adeo magno per duos annos vexabatur. Menfe aprili vero Cl. Auctorem confuluit, qui aegro, vitae fedentariae dedito, fuafit motum corporis, parcum cibi vsum, atque alui interdum purgationem. Quae omnia cum aeger neglexiffet die 8 augufti ex aure, quae antea tantum dolebat, magna copia materiae purulentae quotidie effluxit, atque aeger ita debilitatus eft, vt non, nifi adiuumento aliorum hominum, incedere poffet: Cl. Auctor, qui iam de aegro desperabat, alios confulere medicos voluit; fed ille Noftri tantum auxilio fe acquiefcere velle contendit. Applicatis itaque veficatoriis intra fcapulas factisque iniectionibus in aure ex decocto radicis althaeae, purgantibusque lenioribus adhibitis, nihil effecit, fed aeger, accedente febre mortuus eft die 29 feptembris. Cadauere fefto, partem petrofam, tubam ac os fphenoideum pure repleta, carieque adefa inuenit.


Menfe iunio.

p. 552. 6) Cl. DE ROUGERES *obferuatio de abufu futurarum.* Puella aetate triginta annorum, in labio inferiori, quod cancro exulceratum erat, laborabat, qui partem finiftram mediam labii plane occupaue-
 rat. Cl. Auctor antequam operationem inftitueret, alia remedia ad eum fanandum per tres menses fine fructu adhibuit. Qua de re aegra ipfa Noftrum rogabat, vt operationem fufciperet: quam quoque fequente die peregit, atque fascia peculiari modo applicata intra 8 dies nulla adhibita futura, vulnus coalefcere vidit, aegramque reftituit. Ita quoque Cl. Auctor fascia tantum adhibita, tendines digitorum manus finiftrae diffectos, fpacio trium fepti-

septimanarum sanauit. Nec non alius laesi musculum cubitalem externum, maxima parte dissectum, fascia applicata, spatio quindecim dierum sanauit. Hinc colligit Noster, plerumque melius et tutius fascias, quam futuras adhiberi.

7) *Observatio de suppressione urinae* Cl. MA. p. 555.

RESCHAL. Puellae, quae ad aetatem triginta circiter annorum peruenerat, die 10 augusti 1765, cum ophthalmia leui laboraret, Cl. Auctor venam brachii secare iussit. Die vero 14 eiusdem mensis aegra de suppressione urinae, nec non de cruditate, doloreque renum, quotidie aucto, querebatur. Vena bis secta, balnea et purgantia per aliquot dies sine fructu adhibebantur, et die decimo dolor renum adeo augebatur, vomitusque crebriores accedebant, ita, vt non, nisi cochlearia aliquot iusculi carnium et ptisanæ, propinari possent. Die tandem decimo octauo aegra cochlear vnum urinae limpidae, non sine dolore vrente reddidit: a quo tempore per aliquot dies vrinam, quamquam dolore renum non remittente, secreuit: quae etsi denuo supprimebatur, illa tamen tandem, vsurpata aqua de *Pougues*, et menstruis accedentibus, hoc malo liberata, sanitate pristina potita est.



II.

Bibliotheca Botanica, qua scripta, ad rem herbariam facientia, a rerum initiis recensentur. Auctore ALBERTO VON HALLER, Domino in Goumoens, le Jux, et Eclagnens, Praefide Societatis Regiae Gottingenf. Praefide Societ. Oecon. Bernenf. Sodali Acad. Reg. Scient. Paris. Acad. Reg. Chirurg. Paris. Acad. Imper. Nat. Cur. Boruss. Suec. Bonon. Arcadicae; Socc. Reg. Brit. Botanicae, Bot. Flor. Bauaricae, Altisidior. Helueticae, Coll. Med. Edinburgenf. in Suprem. Senatu Reip. Bernensis Ducentum Viro. Tiguri, apud Orell, Gessner, Fuesli et Socc. 4 mai. Tom. I. 1771. pagg. 654. praet. praef. Tom. II. 1772. pagg. 785.

Gratulamur non solummodo rei herbariae, sed et omnibus bonarum artium cultoribus de hoc stupendi laboris, aut etiam insignis utilitatis opere, ab Ill. Auctore dudum promisso, nunc demum confecto atque absoluto. Historiam litterariam medicinae in deliciis semper habuisse Nobilem Virum, omnia eiusdem testantur opera: et praecipue luculenter apparuit ex methodo Boerhaauiana, ante viginti circiter annos, eius curis edita atque multum aucta. Continuauit eadem indefesso labore studia, sumptibusque maximis instructissimam, quae vndecim voluminum millia, et decies millenos minores libellos comprehendit, bibliothecam sibi comparauit, eodemque suppellectili non ad ostentationem; sed ita felicissime usus fuit, ut omnium librorum contenta, auctorumque in-

venta

venta et placita penitus cognoscere, in epitomen redigere, cuilibet suum reddere, eorumque merita vere diiudicare posset.

Neque hic substitit incomparabilis Viri industria, verum et alienis praesidiis notitiam suam auxit, et alia consuluit opera, in quibus medici scriptores recensentur: ut sunt diaria, biographiae, bibliographi, et catalogi bibliothecarum priuatarum et publicarum. Hinc omni parte perfectam totius medicinae litterariam historiam ab HALLERO, et solummodo ab Eodem, expectare debuimus: cum hactenus nullus, iisdem subsidiis instructus, eademque et multifaria eruditione ornatus, ad simile opus conscribendum accesserit, neque forsan vnquam accedere poterit.

Cum vero sit amplissimus medicinae ambitus, placuit Nobili Viro per partes euulgare hanc bibliothecam, et cuiuslibet, praecipuae inprimis, quae ad medicinam spectant, scientiae historiam proprio opere exponere. Initium itaque fecit cum re herbaria, eiusdemque fata et auctores a primis ad nostra usque tempora duabus quasi periodis recensuit: priori scilicet a primordiis mundi ad annum Chr. 1697, quo tempore inprimis TOURNEFORTIUS inclaruit; posteriori ab Eodem Viro ad ann. 1771 stabilita. Ordinem vbique elegit chronologicum, et auctores eo tempore nominavit, quo primum inclaruerunt; licet eorum scripta diuersis saepe annis edita fuerint: et ita in hac bibliotheca simul historiam artis, eiusque progressus et inuenta, per sua tempora sibi succedentia exposuit: citavit forte omnes, qui scriptis hanc artem illustrarunt, de illis, quorum libros coram habuit, et perlegit, copiosius plerumque differuit, aliorum modo titulos annotavit; neque tractatus, et schediasmata, seorsim edita, tantum recensuit, sed et eas commemo-

rauit commentationes, quae diariis, ephemeridibus, societatum variarum actis, aliisque collectionibus insertae fuerunt; neque ea, quae botanica modo continent, et ad rem herbariam vnice spectant, scripta excitauit; verum et historiae naturalis, et materiae medicae, et rei diaeteticae, artis coquinariae, et pharmaceuticae generales scriptores, itineraria, et quaecunque alia opera, et, si modo particulam quandam, ad plantarum notitiam spectantem, continerent, ne quid deesse videretur, laudabili consilio, reliquis copiose immiscuit; neque tandem typis exarata modo opera, sed manuscriptos quoque codices adduxit, et, in quam bibliotheca iidem associarentur, sollicitè monuit.

Haec omnia praestantiam huius operis declarabant egregie; eiusdem autem multum augebitur dignitas, dum animaduertimus, non modo titulos librorum, editionis annos, et reliqua, quae ad externum quasi habitum spectant, commemorasse Nobilem HALLERVM; sed etiam auctorum, clarissimorum praecipue, breuem vitae et meritorum historiam dedisse, ac primaria operum et commentariorum contenta recensuisse, suum cuique tribuisse, hosque laudasse, vituperasse molliter alios; eademque iudicia omnium facile applausum promereri, dum eadem, vt ipse fassus fuit, *sibi scripserit, nullo adfectu motus, vt neque sectae faueret, neque seruiret odiis; incorrupta autem esse, ex re ipsa nata, nunquam ex ira, nunquam ab aliis mutuo sumta; id eoque nihil omisisse, quicquid ad pleniorè notitiam scriptorum, huc pertinentium, aliquid conferre posset.* Denique monendum, bibliothecae propriae libros et editiones asterisco signasse, vt plenior esset de iisdem fides, alienis, vbi necessarium videbatur, suum testem addidisse.

Ex his, etsi praecone non indigeat egregium opus, praestantiam eius facile cognoscimus; attamen illud non completum et ex omni parte perfectissimum esse, ipse de HALLER vidit et lectores monuit. En eius verba: *Non tamen velim lectorem quidquam a me pleni expectare. Non potest eo hominis industria sola pertingere. Vitam integram oporteret huic labori dedicare, et subinde, post aliquot annos, alias in urbes principes migrare, Parisiis vivere, Londini, Romae, et si alibi pleniores sunt bibliothecae. Neque indiligens fuerit, etiam cum his opportunitatibus, qui intra quinquaginta annos vitae suae huic soli labori impenso, tolerabile opus compilauerit. Omnes praeterea linguas callere necesse fuerit, omniumque artium peritum esse, quarum socia opera medicina constat. Mihi huiusmodi nihil contigit. Vixi extra patriam annis viginti quinque; sed alii mihi labores incumbebant, in quibus plus esset officii. Nunquam liber fui, nisi forte nuper liber sum. alieni, nimii labores me per totam vitam distraxerunt. Praeterea nonnulla, quae lubenter consulere voluit, praesidia, omni adhibita opera, obtinere non potuit, ut est catalogus M. S. codicum Arabicorum bibliothecae Scorialiensis, Sloaniani thesauri, et ditissimae Trewianae bibliothecae. Verum typis fere exarato altero huius operis volumine, et hunc defectum ex parte supplevit, aliudque ac novum ornamentum eidem apponere Ill. Auctor potuit. CASIRIANI enim Arabicorum codicum catalogum, cura I. A. MURRAY, aliumque librorum, in Hispania et Lusitania editorum, et ad rem naturalem facientium, ex humanitate ANTON. CAP DE VILLA obtinuit, et sic a pag. 618. ad 711. et denuo a pag. 777. ad 785. partim varia emendavit, partim auxit. Indicem auctorum alphabeticum, itemque anonymorum realem, quos in fine a pag. 712. ad 777. addidit,*

dit, cuilibet gratissimos fore, facile coniecere licebit.

Praemissis his, quae ad notitiam operis spectant, generalioribus, nunc et ad specialiora transire debemus. Verum obruimur rerum copia; et selectum instituere, difficillimus est labor: hinc modo sciagraphiam adhuc repetamus et paucula inspergamus.

- Tom. I.** *Libro I.* de auctoribus *Graecis* differuit: pri-
- p. 1.** mordia rei herbariae a primis generis humani temporibus praecipue repetiit ideo, quia homines primaevi victum animale sibi comparare nondum didicerant, sed terrae fructibus vitam sustentare debuerant. De variis, quorum scripta perdita fuerunt, breuiter; deinde vero copiosius de HIPPOCRATE egit, et inter alia monuit, eundem per elaterium non valide agitans quodcunque pharmacum, vti SCHVLZIVS existimabat, sed omnino succum cucumeris sylvestris intellexisse; nominavit postea ARISTOTELEM, THEOPHRASTVM, ARETAEVM, DIOSCORIDEM, GALENVVM plurimosque Graecorum veterum alios, etsi nonnullorum scripta non amplius existant. Inter Graecos etiam CATONEM, VARRONEM, VIRGILIUM, CELSUM, COLVMELLAM, PLINIUM, PALLADIUMque, licet Latino sermone scripserint, retulit: nimis enim pauci sunt ex veteribus Latini scriptores, et sua plerumque a Graecis sumserunt: hinc separare noluit.
- p. 171.** *Libr. II.* *Arabes* commemoravit, et in genere monuit, per eosdem Indica aromata et medicamenta mitiora innotuisse quidem; non vero botanicem amasse, nec eius gratia labores aliquos suscepisse, solo excepto EBN. BEITHAR; descriptiones parum utiles dedisse: DIOSCORIDEM non optime intel-

intellexisse, et nimis sibi similes esse, vt, si vnum legerimus, omnes teneamus. Addidit in fine Chinenſium quosdam libros botanicos.

Libr. III. Arabiſtas recenſuit; inter quos *CA-* p. 214.
ROLVS MAGNVS, STRABVS, MACER, CONSTANTINVS AFRICANVS, IOHANNES MEDIOLANENSIS, HILDEGRANDIS, ALBERTVS MAGNVS, CRESCENTIVS, BARTHOLOMAEVS ANGLICVS, et alii barbari occurrunt.

Libr. IV. Inſtauratores collegit, qui, vergente p. 255.
ſeculo XV. litteras, remque herbariam in Europa colere coeperunt; GEORGIVS VALLA primum, DORSTENIVS vltimum hic tenet locum.

Inuentorum, quos *Lib. V* continet, ducem con- p. 281.
ſtituit VALER. CORDVM, quem excipit, vno anno minor, CONR. GESNER: laudauit hunc merito, et inprimis epistolae Eius commendauit omnibus, quicunque elegantioſiorem rei herbariae periti-
tiam amant. MATTHIOLI optima et praeſtan-
tiſſima editio eſt Latina Veneta 1565, cum magnis
iconibus. FAB. COLVMA, licet inter inuento- p. 380.
res locum ex primis mereatur, vltimum, ſecundum
tempora, hic obtinuit. Icones plantarum aeneas
primo omnium dediffe, et accuratiſſimas, monuit
HALLERVS; petalorum nomen floris partibus pri-
mum dicauit, ſtylum et ſtamina nouit, ſtylique di-
uiſiones et varietates fructuum deſcripſit, et a
flore, fructu, ac ſemine adſinitates plantarum de-
ſumſit.

Libro VI. ad VIII. Collectores comprehendit,
et quidem *Libr. VI.* BAVHINOS et aequales tem- p. 382.
pore; VII. Eos, qui poſt BAVHINOS ad RAIVM; p. 432.
et VIII. ab huius tempore ad TOURNEFORTIUM p. 500.
inclaruerunt.

Tomus secundus duos modo libros continet, et
 p. 3. Lib. IX. TOURNEFORTIUM ac reliquos ad LIN-
 ap. 244 NAEI tempora, atque Lib. X. LINNAEVM et
 ad 617. recentiores, omnes comprehendit. Huius botani-
 ces reformatoris merita rite aestimasse Nobilem Au-
 p. 244. ctorem, sequentia declarabunt: *Hoc anno 1732*
primum CAR. LINNAEI opusculum prodiit, viri,
qui maximam in vniuersa 12 herbaria conuersionem
molitus est, et qui omnino pene integre suo fine est po-
titus. A natura ardente animo instructus, acerrima
imaginatione, ingenio systematico, opportunitatibus in-
primis posteriore suae vitae parte usus copiosissimis, cum
ex vniuerso orbe undique ad eum certatim naturales
thesauri confluerent, omnibus sui animi viribus, quas
possidet maximas, in nouam rei herbariae constitutio-
nem incubuit; seque viuente et superstite placita sua a
plerisque suis coaetaneis recepta vidit. Neque dissimu-
lari potest, multo accuratius, quam prius solebat, ab
eo singulas plantae partes definitas esse, multas magis
naturam exprimere, quae nunc dantur, descriptiones:
etsi nouam fere linguam ad eam rem excogitatam fuisse
fatendum sit. De singulis archiatri scriptis specia-
tim egit, et e. g. de speciebus, et quidem edit. secun-
 p. 252. *da 1762. euulgata, sequens tulit iudicium: Iterum*
passim aliquas species recepit, quibus fidem negauerat,
et tamen in plusculis pergit in sententia, quam nuper
demum deseruit, ut plerasque nunc pro speciebus agno-
scat, quas inter varietates relegauerat. Maximum
opus et aeternum plenius futurum, si aliis, etiam plan-
tarum gnaris viris, fidem habuisset, qui in regione ma-
gis australi plantas, septentrioni a natura negatas, re-
centes et florentes viderunt.

Recentiorum auctorum, exterorum quoque,
 scripta vltimo libro copiosissime notata inuenimus,
 vt, si vno quasi intuitu scire vellemus, quaenam in-
 ter Suecos KALM, BRAVN, GADD alique, vel
 inter

inter Gallos DU HAMEL, BVCHOZ pluresque, aut inter Anglos HILL, ARTHUR, YOUNG et reliqui ediderint, opus ipsum modo euoluere deberemus. Neque neglexit bibliopolarum fraudes detegere; prodiit e. g. *Systema naturae* Hag. Com. 1765. fol. anglice, belgice, et gallice; quod pro LINNAEI opere venditum fuit, sed plane non est; P. 552. potius icones modo sunt plantarum, cum nominibus alienissimis, et tanta vbique animaduertitur inscitia, quantam hoc nostro aevo nunquam expectassemus. Denique monemus, remediorum inuentionem quandoque accuratius determinasse, ita ex PHIL. FERMIN *descript. de la Colonie de Suri-* P. 555. nam 1769 edit. notauit Ill. Auctor, Quassiam dudum ante Aethiopem Quassi notam, et radicis corticem in omni febre, continua etiam, vtiliter adhibitum, addiditque HALLERVS generum suum, *Tribun. Legion. LVD. BRAVNIVM* iam an. 1742, cum epidemica febre laborasset, eo, tanquam vulgo noto remedio, vsum fuisse.

Annunciamus quoque, duo proxime sub pre- lum datum iri opera Ill. Auçt. scil. 1) *Agrostogra-* P. 785. phiam IOH. SCHEVCHZERI, ineditis eius viri epistolis itinerariis, et itinere Rhaetico auctam, cum vita SCHEVCHZERI, et synonymis nuperis graminum, et nouarum specierum, ab auctore non tatarum, fasciculo. 2) Numerosas epistolas, quas pe- P. 425. ne a dimidio seculo a doctis viris accepit, et inter eas quoque floram Carlsbadensem, a b. HAENELIO collectam; possidet quoque ipsas, in eadem nominatas plantas; inter quas et *Orchis radice multiplex*. Conseruet Deus Praesidem Illustrem, quo in maximum rei litterariae commodum hos aliosque labores perficere valeat.

III.

Socken-Apothek och nagre Hus-Curer, utgifne under Kongl. Collegii medici öfverseende och befförjande. Andra Uplagan, nagot förbättrad. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1771. in 8. pl. 19.

i. e.

Pharmacopoea pagana, cum remediis quibusdam domesticis, edita moderante et curante collegio R. medicorum Holmieni. Editio secunda, paullum aucta.

Auctorem hic liber, cuius quoque germanica versio *), secundum primam editionem adornata, prodiit, Cl. IO. ANDREAM DARELIVM, collegii medici assessorem, agnoscit, et pertinet ad illos, qui ruri sub defectu medicorum consilia curandorum morborum suppeditant. Ad conscribendum illum ansam dedit oeditimus quidam, ex pago quodam Holmiam missus, vt, rudimentis medicinae imbutus, casibus summae necessitatis aegris auxilio esse posset. Hunc Noster instruendum, hac in re ipse suscepit, et, quicquid ille calamo notaue-
rat, Cl. Auctor dein in ordinem redegit, auxitque, ubi necesse erat. Respiciunt omnia collectionem definitam pharmaceuticam, qua variolis consultum esse cupit. In quinque capita librum hunc Cl. Auctor disposuit; quorum primum, quicquid ad vsum pharmacopolii huius tutiorem pertineat, exponit; alte-

*) *Landapothek, nebst einigen Hauscuren, unter der Aufsicht des königl. Collegii medici herausgegeben, übersetzt von I. C. WEBER. Kopenhagen, 1771. 8.*

alterum medicamenta potiora cum viribus eorum enumerat; tertium quaestiones de morbis necessarias continet; quartum morbos ordine alphabetico sistit, e quorum numero nec chronici exclusi; quintum formulas compositas, nec nisi a pharmacopola parandas, adnectit. Prolixitas stylusque rusticorum intellectus vi maxime accommodata sunt. Et in delectu medicamentorum ratio sedulo curtae eorum suppellectilis habita. Interim indicia de morbis et remediis exercitatum medicum haud difficulter produnt.

Quum non scopus fuerit huius libri, artem novis inuentis ditandi, difficile est, exempla proferre. Quaedam tamen delibanda dabimus. Pilulae ex p. 54. fece cereuisiae exsiccata commodae ad aluum solvendam pronunciantur. Sub nomine theae Sue- p. 77. canae miscela ex herbis melissae, menthae crispae, hyssopi et salviae, ad partes aequales siccatis, vel, quod praestat, vstulatis describitur. Contra ambusta dauci radices conquassatae laudantur. Cereui- p. 107. siam non lupulatam in syrapi spissitudinem Cl. Auctor redigit, et, loco sacchari, mellis, syrapi ex saccharo, adhibet ad electuaria; et linctus, et potus varia genera per eandem dulcia reddit. Quidam in phthisi levamen perceperunt, eiusdem cochlearibus duobus vel tribus, bis per diem epotis. Formulae nobis ob simplicitatem et efficaciam arrident. Boli contra p. 252. calculum parantur ex sapone Alicantino, calce viua testis ouorum, fructibus cynosbati vstis et sale tartari; hique praeferuntur bolis matronae STEPHENS.

IV.

Tal om de på Djur anställdte Röns och Förföks opalitelighet vid tillämpningen på Män-
niskans kropp; hållet, i Hans kongl. Majts
Höga Närvaro, för kongl. Vetenskaps Aca-
demien, vid Inträdet, den 4 Martii, År
1772, af JOHAN ANDERS MURRAY, D.
Med. & Bot. Prof. ord. vid Kongl. Acad. i
Göttingen och Ledamot af Kongl. Vetensk.
Societ. därstädes. Stockholm, tryckt hos
Direct. Lars Salvius, 1772, pgg. 24. 8.

i. e.

Sermo de suspecta obseruationum et experi-
mentorum in brutis captorum, quoad ap-
plicationem ad corpus humanum, fide, ha-
bitus in confessu Academiae Reg. scientia-
rum Suecicae, quum coram locum inter
membra eiusdem occuparet IOANNES AN-
DREAS MURRAY.

Quum post duodecim fere annorum intercape-
dinem reuifere per hiemem patrios lares Cl.
Viro contigerit: noluit gratam praetermittere oc-
casionem, obseruantiam suam erga academiam scien-
tiarum Suecicam, cuius ante aliquot annos mem-
brum factus erat, publica oratione testandi. Céle-
brem hanc vel maxime reddidit Regis GVSTA-
VI III, decoris gentium, praesentia. Quo vero
amore Noster adhuc in patriam ducatur, et oratio
declarat, qua Regem allocutus est, et ista, qua Re-
giam academiam scientiarum compellauit.

Quae

Quae per absentiam eius, in scientiarum et ar-
 tium incrementa, nouiter in Suecia instituta fue-
 runt, paucis initio exponit; ex quibus apparet, va-
 rios Cell. viros ad litterarum elegantiorum, musi-
 ces, oeconomicae et religionis cultum magis per-
 ficiendum, in totidem societates coiuisse, librorum
 commercium et artem typographicam maiori iam
 sollertia ibidem comprehendi: exstare artifices
 instrumentorum astronomicorum et physicorum
 cuiuslibet generis dexterrimos, aliosque in arte
 pingendi et sculpendi, nummosque cudendi peritif-
 simos: merita Regum et aliorum celebrium viro-
 rum in iusta existimatione haberi, vnde statua me-
 tallica in honorem G V S T A V I I, ab indigena fu-
 sa, et monimenta, forma nummorum, in L I N N A E I,
 K L I N G E N S T I E R N A E, S V A B I I, et aliorum
 quorundam memoriam inuenta. Laudat praeterea
 Cl. M U R R A Y peritiam, in vasis aureis et argen-
 teis, fabricandis, gemmis affabre scalpendis et con-
 durandis, pannis laneis texendis, horologiis, spe-
 culis, vasis murrhinis et opificiis scriniariorum con-
 ficiendis: in quibus omnibus ciues suos Cl. Auctor
 medios ire arbitratur inter frugiles Gallorum lau-
 titias et durabilem Anglorum simplicitatem. Inter
 rei medicae augmenta autem commemorat nosoco-
 mium pro insitione variolarum, auctum membro-
 rum collegii medici numerum, curam pro aegris
 egenis Holmiae aegrotantibus, aedes balneis cu-
 iuscunque generis dicatas; nec minus placet Cl.
 Viro, quod medici in curatione morborum cura-
 tius ad Anglorum normam sese accommodent.

p. 4.

Hisce praemissis ad ipsum, cuius titulum indi-
 cauimus, argumentum se confert Cl. Auctor. Vt
 nimirum structura nostri corporis et vires tot ali-
 mentorum, medicaminum et venenorum penitus
 explo-

p. 9.

explorarentur: innumerae in brutis observationes et experimenta instituta sunt. Nec carere hisce possumus, quum et lex diuina, et humana, et proprius noster sensus hominis corpus incidere vetet, et pariter culpabile sit, hominum valetudinem vel vitam submittere experimentis medicaminum iusto fortiorum; vel eorum, quae sub inertia sua morbum finant ruere, quorsum velit, et eatenus, instar veneni, considerari mereantur. Constitit vero, quadrupeda et aues ad hanc indaginem inprimis aptas esse, vtpote, quae animalia structura humanae naturae propiora exstant, etsi alia non omnino excludantur. Multa horum adiumenta in physiologia inuenta grauissima, vel omnino nouiter facta sunt, vel vltius confirmata; quorsum pertinent circuitus sanguinis cordisque motus, absentia aëris inter pulmones et pleuram, vis sensilis et irritabilis, vasa lymphatica RVD BECKII, experimenta HALLERI circa ouorum incubatum, et generatio ossium, rel.

p. 12. Quicquid horum sit, insigne tamen discrimen in multis, quoad hominum brutorumque naturam, percipitur. Etenim quibusdam horum partes quaedam competunt, quibus homines destituuntur, vel quae aegrius in hisce deteguntur, cuius generis est ventriculus quadruplex animalium ruminantium, vel carnosus auium graniuarum, membrana allantois, pori ampli in superficie pulmonum externa.

p. 13. Sunt et alia animantia, in quibus defectus obtingat partium, quibus hominum corpus instruitur; prout vesica fellea in nonnullis quadrupedibus, vti et quibusdam auibus et piscibus deest; in nonnullis cor vnum modo ventriculum et vnam auriculam habet, in aliis deest vtrique auricula; pisces priuantur pulmonibus, taenia capite, polypi ipso corde.

Multa

Multa rursus exstant momenta, quae quibus- p. 14.
dam animalium speciebus priua sunt. In vniuer-
sum animalibus, quae magnitudine et pondere ad
nostram naturam propius accedunt, maius robur
firmitasque adscribitur, quae diuersitas praecipue
pendet a minori gradu sensibilis et irritabilis poten-
tiae, ad quam fortior et continuata magis fibra-
rum neruearum et musculosarum actio bruta dispo-
nere, vel, quoad minimum, ab hac ipsa causa ali vi-
detur. Quoad nimium robur, quum in ipsum ce-
rebrum cadat: non possunt non vires quoque ani-
mi longe in hisce esse torpidiores. Antecellunt
nos tamen canis odore, vlula auditu, animalia her-
biuora gustu. Canes et aues, fortassis etiam feles
sudare nequeunt, equi et cuniculi vomere; quae-
dam tenaciori vita instruuntur, vt antlia pneuma-
tica de ranis, lacertis, testudinibus et multis inse-
ctis, et euulsio cordis in ranis docet; alia, vt vrsus,
erinaceus, cricetus per hyemem otio somnoque so-
pita sunt; alia, vt lepus, sciurus et quaedam aues in se-
ptentrionalibus regionibus colorem mutant; felium
pilis magna vis electrica inest; chamaeleon et coch-
leae diu vitam absque nutrimento protrahere pos-
sunt, cet. Horum omnium causa merito in stru-
ctura vel totius corporis, vel quarundam modo par-
tium diuersa quaeritur.

Prout autem structura animalia a nobis discre- p. 15.
pant: ita etiam non possunt non effectus veneno-
rum, medicamentorum et nutrimentorum differre.
Non potest igitur conclusio fieri ab vno animali ad
aliud, ab hisce ad nos. Displicet merito nostro se-
culo via per signaturam, quam vocant, et astrolo-
giam virtutes medicaminum detegendi. Expecta-
re vsque dum casu virtus detegatur, ob moram, mo-
lestum est. Similitudo inter morbos vel medica-
mina mutua saepe lumen accendit; sed saepe nec in-
genio

genio sagacissimo sufficit. Sensuum a medicamentis affectio magis ansam experimentis praebet, quam de effectu eorum nos condocet. Cognationes stirpium adminiculo crebro quidem sunt, sed ob exceptiones nimias et discrimen graduum, quibus operantur, non semper satis fidae. Et chemiae sane in hac ipsa re minimum meritum est. Experimentis cum medicaminibus, extra corpus institutis, maius omnino pondus inest, modo idem caloris gradus, eadem menstrua, idem motus ceteraeque vires in viuo corpore obuiaae essent, quorum usus in museis nostris et officinis fit: et nisi, ob longitudinem viae, quam saepe capere remedium oportet, antequam ad morbosam partem perueniat, et commixtionem partium peregrinarum vis valde infringetur vel omnino sufflaminaretur. Non alia igitur tutior, si a corpore humano discesseris, prostat via ad explorandas virtutes medicamentorum, quam experientia, in brutis capienda.

p. 17. Id vero iam scrupulum mouet, quoad animalia, quod non satis manifeste, quid sentiant, certe non sensum exquisitiorem, indicare queant. Sunt praeterea multa homini innoxia plane; animalibus tamen, quorum natura fortior iudicatur, veneni instar infesta. Recenset Noster inter haecce amygdalas amaras, vulpes, fues, feles, et plerasque aues necantes; piper scrophulas suis excitans, baccas sambuci gallinis noxias, semen anethi graueolentis loxiam pyrrhulam trucidans etc.

p. 18. Alia e contrario sunt, praecipue e vegetabilium censu, quae quibusdam modo animantium speciebus vim inferunt, aliis vero nihil damni excitant. Caprae minus in delectu stirpium sollicitae, quam alia animalia; nec istae cynoglossum, daphnen, lycoctonum, pulsatillam, scrophulariam respuunt. Et capras hac in re oues imitantur, quae nec
detre-

detreſtant lolio temulento, oenanthæ crocata, conio maculato veſci. Plura exempla ſtirpium, quæ quibusdam modo animantibus noxia ſunt, inuenimus in hyoſcyamo, phytolacca, kalmia latifolia, veratro albo. Mirum quidem videtur animalia minutiora, vt aues quaedam et inſecta, multas acres ſtirpes ingerere ſine damno; prout loxia cardinalis ſemina capſci, pſittacus quidam ſemina carthami, gallinae petiueriam deuorant, et varia inſecta ranunculos, nerium, ricinum, iatropham et veratrum album. Phalaena neuſtria euphorbiam conſumit, et ptinus fur ne in moſchi quidem pilam oua ponere dubitat, et nicotianae puluerem ſternutatorium acrem, ſibi in cibum vindicat.

Plures quidem cauſſae ſunt effectus in variis animalibus varii. In plantis ſaepe vim mutat ſolum, clima, aetas. Facilius illa ſeſe exſerit in animali iuniori, quam ſeniori. Multa ingerit fame impulſum, quae ſpernit iam fatiatum. Multa non curat ſub miſcela nutrimenti praeſtantioris, nec ventriculus alimentis et ſordibus refertus tam facile effectum percipit, ac vacuus. Saepe vitium in minus commoda doſi conſiſtit, et repetitione opus eſt. Sed, etiamſi in hiſce omnibus nihil vitii ſubſit: ſpe euentus tamen ſaepe excidimus. p. 21.

Experientia igitur, in ipſo corpore humano capta, certiffimum iudicium de vi medicamentorum fert. Quomodo haec ipſa tutiffime perficiatur paucis Cl. Auctor declarat, hacque adhuc opus eſſe iudicat ad explorandam commodam medelam contra epilepſiam, maniam, phthiſin, hydropem, cancrum et ad miaſma varioloſum, in minimo germine exſtinguendum. p. 22.

Habita hac oratione, academia ſcientiarum ore Ill. Equitis A ROSENSTEIN, qui tum praefidis
Tom. XIX. P. I. D muni-

munere fungebatur, testimonium animi sui erga Cl. Auctorem dedit valde honorificum.

V.

Nouae species insectorum. Centuria I. Auctore IOANNE REINOLDO FORSTERO, S. A. S. Londini, apud T. Dauies, 1772. 8. pl. 7.

Insecta a Cl. Auctore, qui iam iter in Australes regiones instituit, hic descripta partim Angliae sunt indigena, partim ab exteris oris aduecta, ex India scilicet, China, America septentrionali et freto Gaditano. Plurima noua sunt, vel antehac nondum satis verbis depicta, omnia vero in nouissima editione systematis Linnaeani desiderantur. Tabulas addere Cl. Auctor superuacaneum duxit, cum descriptiones tanta cura et diligentia exarauerit, vt icones minus necessariae sint. Secundam centuriam se proxime publicaturum esse pollicetur. Plurima ex insectis ad coleoptera pertinent, paucissima ad lepidopterorum ordinem, nulla ad apterorum.

VI.

Histoire de l'Academie royale des sciences et belles lettres, Année 1762, à Berlin, chez Haude et Spener, 4. 1769. 2 Alph. 18 pl. 10 tab. aen. Année 1763. ibid. 4. 1770. 3 Alph. 1 pl. 7 tab. aen. Année 1764. ibid. 4. 1766. 2 Alph. 15 pl. 5 tab. aen. Année 1765. ibid. 4. 1767. 3 Alph. 9 tab. aen. Année 1766. ibid. 4. 1768. 2 Alph. 22 pl. 19 tab. aen. Année 1767. ibid. 4. 1769. 2 Alph. 16 pl. sine tab. aen. Année 1764. ibid. 4. 1770. 2 Alph. 16 pl. 2 tab. aen. Année 1769. ibid. 4. 1771. 2 Alph. 15 pl. 6 tab. aen.

h. e.

Historia Academiae regiae scientiarum et elegantiorum litterarum Berolinensis. Ann. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768 et 1769.

Variae omnino causae, quas hic enarrare nimis longum foret, per satis longum temporis spatium impediuerunt, quo minus de commentariis academiae regiae Berolinensis ad Lectores nostros referremus; quibus remotis iam ea, quae ex octo hic commemoratis voluminibus propius ad nos pertinent, breuiter hic indicabimus.

In commentariis anni 1762 continetur primum A. 1762
obseruatio *de ranis, quae ex sopore, quo hyemem alias* p. 3.
transigere solent, excitatae fuerant. Notum est ra-
nas, vt alia frigida animalia, vel in aqua, vel extra

D 2

aquam

aquam per omnem hyemem sopitas quasi esse. In his ex LEVWENHOECKII obseruationibus vis contractilis cordis et arteriarum valde debilitata est; actiones naturales animales penitus silent; vitales vero debiles sunt. Eiusmodi ranas, quae mortuae quasi ex aqua extractae fuerant, Cl. GLEDITSCH caloris gradu sensim aucto exponens, eo ita disposuit, vt excitatae nutrimentum quaererent, imo inter se coirent, et quidem frequentius, quam vernali tempore solent. Post coitum tamen, viribus exhaustis, mortuae sunt.

p. 27. Cl. LAMBERT *experimenta circa pondus salis et grauitatem specifica variarum solutionum salium (saumures).*

p. 90. *Coniectura physica de variis mutationibus superficiei globi terrestis, Auctore Cl. SVLZER.* In omni globi nostri superficie plura vestigia occurrunt, quae eum magnas mutationes olim subiisse ostendunt, cum fere vbique variis stratis tegatur, quae ex lapidum, crystallorum cet. fragmentis proiectis et arena constant, nec in eo loco, vbi reperiuntur, nata, sed e longinquo huc translata fuerunt. Saepe in locis a mari longe remotis corpora marina reperiuntur, atque haud raro strata, de quibus diximus, non eo ordine, quem grauitas corporum, quibus componuntur, specifica necessarium reddebat, sibi incumbunt; sed saepe leuiora inferius, grauiora superius sita sunt. Hoc phaenomenon, quod vbique se intuentibus offert, plurimis hypothefibus ansam dedit, quibus physici illud explicare tentarunt. Cum vero eae omnes Auctori Cel. non satisfecerint, nouam hic proponit, cuius idea in itinere, ad montes Herciniae siluae suscepto, ei nata est. Assumit nimirum, omnem terram olim aqua tectam fuisse, ita tamen,

vt

vt iuga montium altissimorum v. c. alpium, pyrenaeorum cet. quos vt primogenios montes considerat, tanquam totidem insulae e mari vndique emerent, et lacus varios, in vallibus inter hos montes existentibus inclusos, haberent, in quos rivuli, e montibus defluentes, effunderentur. Iam si vnus ex his lacubus, fundo eius a lapidum fragmentis, e montibus in eum delabentibus, sensim elevato, aquam omnem non continere potuit, aut terrae motu catena montium, qua ab alio separabatur quodam in loco, disruptus sit: aqua, hac apertura facta, ad vicinum lacum, et ex hoc ad mare fluxit, fundum eius fragmentis lapidum, quae secum adduxit, impleuit et ita eleuauit, vt continens seu planities ad radicem montium posita oriretur: quae, vti notum est, stratis variis tegitur, quae ex ruderibus montium, vi maris destructorum, composita sunt.

Descriptiones duorum aethiopum alborum (negres-blancs) p. 99. communicatae a Cl. CASTILLON. Harum prima ex litteris Cl. CASTEL, altera ex epistola Cl. FERMIN est. Confirmatur his, id quod aliae similes historiae demonstrant, nasci ex aethiopibus perfecte nigris nonnunquam homines, quorum cutis alba, cerae instar, sit, et qui crines et reliquos pilos albos habeant. Iris igneum quasi colorem ostendit et in tenebris lucet; coniunctiua autem pluribus vasis rubris pingitur. Noctu melius ac interdiu vident.

Commentarius de coagulatione quadam singulari, p. 106. auctore eodem Cl. CASTILLON. Aqua simplex destillata, quam Cl. Auctor in vase vitreo frigori mens. Decembr. 1767 exponebat, congelata est singulari modo, ita, vt nucleus in medio eius oriretur;

ex quo vndique radii egrediebantur. Hoc phaenomenon pluribus experimentis, a Cl. Auctore accurate institutis, occasionem dedit, ex quibus cognovit, aquam non coctione singularem hanc congelandi proprietatem acquirere, sed tantum si in vapores resoluta, i. e. destillata fuerit.

A.1763 Ex commentariis a. 1763 ad nos pertinent:

p. 77. Cl. GLEDITSCH *dissertatio botanica de carpobolo* MICHELI. Fungus hic est: *Lycoperdon radiatum* LINN. quem MICHELI in *nou. plant. gen.* p. 221. tab. 201. n. 2. nomine carpoboli aurei, volua alba, fructu obscuro, feminibus subrotundis albicantibus descripsit, et quem Noster *lycoperdon* (carpobolum) volua calyciformi, limbo radiato colorato patente: vesicula feminali proiectili vocat. In sylvis obscuris nascitur et eam singularem proprietatem habet, vt vesiculae, quibus femina continentur, maturae disrumpant, et basi vesiculae subito constricta, femina haec eiiciantur, eaque ratione dissipentur. Contractio haec et seminum eiectio ex Cl. SVLZERI obseruatione ab exhalatione liquidi, his vesiculis contenti, pendet, qua penitus fere facta, quod superest liquidi in vapores dissoluitur elasticos, quorum vi vesicula disrumpitur, qua contracta et filo, quo semen capsulae adhaeret, disrupto, illud proiicitur.

p. 87. *De variis instrumentis acusticis* Cl. LAMBERT differit, et calculis mathematicis figuram determinat, qua eiusmodi instrumenta praedita esse debent, vt effectum maximum edant.

p. 125. *Commentarius primus de ambra grisea.* Commentarius hic cum sequente nuper a Cl. FELDMANN,

MANN, medico Ruppinenſi, ad Cel. MARGGRAFF miſſus eſt. Continet vero relationem Ill. ABELVEN, gubernatoris Ternatenſis. Ex hoc patet tres ambrae dari ſpecies, quarum prima cinerea ſit, maculis ſeu radiis fufcis inſtructa, quae optima eſt, et ſuauem colorem habet. Reliquae duae magis impurae et obſcuro colore praeditae ſunt, ac odorem ingratum ſpargunt. Putat vero Cl. ABELVEN, (id quod per experimenta chemica, in ſecundo commentario relata, magis adhuc confirmatur,) ambram grifeam ex petroleo oriri, quod ex fundo maris ad ſuperficiem eius deſertur ac ibidem ſale marino et ſolis calore induratur. Hanc ambram grifeam aues, et praecipue piſces, et inprimis cetacei auide deuorant, in ventriculi vero calore funditur, et ita mortis eorum cauſſa eſt, aut eos ſtupidos reddit, ita, vt ad ripos delati facile capi queant. Haec ratio eſt, cur in ambra grifea ſaepeius teſtacea, lapilli, inſecta, auium roſtra repariantur, et cur tam ſaepe inſignia fragmenta ambrae e piſcibus extrahantur. Optimum ſignum, quo puritas ambrae cognoscitur, eſt, ſi aqua puluis eius ſubtiliſſimus in fundatur, vt herba theae, cui aquae puluis hic ſupernatare debet.

Secundus commentarius *analyſin chemicam am- p. 126.*
brae grifeae Moluccenſis continet a Cl. KRIELE, qui Batauii in India orientali medicinam exercet, factam. Sumſit nimirum duas vncias ambrae puriſſimae, ab omnibus corporibus alienis repurgatae, easque calore 180 graduum thermometri Fahrenheitiani deſtillationi in balneo arenae ſubiecit, quem caloris gradum ſub fine deſtillationis ad gradum 500 dicti thermometri et vltra auxit. Obtinuit vero ſcrupulos quatuor liquidi pellucidi aciduſculi, olei pellucidi ſlaueſcentis vncias tres cum ſemiſſe et

D 4 grana

grana fedecim, tandemque olei obscurioris coloris et grauioris drachmas sex. In fundo cucurbitae drachma vna materiae durae, nigerrimae et splendentis remanebat. Magna tamen olei portio per fissuras luti penetrauerat. Nullum sal volatile obtinuit, quod se obtinuisse Cl. GEOFFROY refert.

- p. 132. Vnciam deinde semis ambrae cum vnciis quindecim aquae pluuialis purae cucurbitae inclusit, vt in experimento priore destillationem fecit, quam eo vsque continuauit, donec liquidum, in cucurbita contentum, fortiter ebulliret, et dimidium eius in recipientem iam transcendisset. Tunc in recipiente aquam leui lacteo colore imbutam, ambrae odore praeditam, nullum vero oleum reperit. Cucurbita autem decoctum leuiter fusco colore tinctum, et turbidum continebat, sapore amarum, odore autem fere penitus destitutum, cui oleum profunde fuscum, tenax et vitro adhaerens supernatabat: quod ipsa ambra, sola in aqua coctione mutata, erat, quae tamen odorem suum specificum retinuerat. In fundo cucurbitae nulla materia terrestris reperiabatur. Ambram solutam infundebat iterum aqua pluuiali eamque destillabat, idque tertia vice repetebat. Decoctum tunc fere nullo colore amplius tinctum erat; collecto vero omni liquido, quod in tribus hisce destillationibus in cucurbita remanserat, illud inspissauit et extracti gummosi paruam portionem amaricantem, nullum vero sal volatile obtinuit. Ambram liquidam miscuit fistulis, quibus ad fugendum fumum tabaci vtuntur, contusis, ex eaque ignis vi oleum empyreumaticum obtinuit. Reliqua experimenta, quae ambram in spiritu vini
- p. 134. penitus dissolui docent, praeterimus. Ex omnibus vero Cl. Auctor concludit: ambram, cum oleum eius cum aqua non transeat, sed in retorta remaneat, non ad vegetabile regnum, sed ad minerale perti-

pertinere. Substantia vero gummofa, quam Auctor ex decocto obtinuit, vix pondus grani vnus habebat. Cum ambrae deſtillatio nullum veſtigium ſalis volatilis alcalini oſtendat, ea animalis proſapiae non eſſe poteſt; odor vero empyreumaticus, quem varia producta habebant, ſale marino impuro et inprimis principio eius ammoniacali adſcribendus eſſe videtur, quo ambra in aqua marina fluctuans, in qua tanta animalium copia reperitur, imbuitur. Hinc ad minerale regnum pertinet, et a ſuccino differt, licet ſal volatilis acidus in deſtillatione eius non repertus ſit, qualem tamen ambrae inhaerere ſapor aciduſculus extracti gummoſi probat.

Initium commentariorum a. 1764 facit:

a. 1764.

Cl. MARGGRAFF *Commentarius, quo demonſtratur ex tartaro ſal alcali fixum, ope acidorum, ſine igne educi poſſe **). Tartarum ſal acidum vegetabile eſſe, omniaque ſalia alcalina fixa vegetabilia ignis ope demum generari, omnes fere chemico- rum ſcholae docent. Interim Cl. Auctoris hic recensita experimenta oſtendunt: tartaro, in aqua ebulliente, ſoluto, ſi terra cretacea vel terra quoque alia alcalina ad ſaturationem admiſceatur, et lixiuio huic filtrato acidum nitroſum eo vsque affundatur, donec nullus tartarus amplius praecipitetur, ex hoc lixiuio nitrum puriſſimum obtineri. Cum igitur nitrum ex acido ſuo et alcali fixo conſtet, hoc alcali vel natium iam tartaro inhaeſit, vel ſine ignis ope produci poteſt. Magis hoc confirmat alio experimento. Drachmam enim vnam cremoris

p. 3.

p. 5.

D 5

tarta-

*) vide Cel. MARGGRAFF *kleine chymische Schriften*, Vol. II. p. 49 ſeq.

- tartari in duabus drachmis spiritus nitri dissoluit, et in hac solutione, post quatuordecim dies, veras crystallos nitrosas reperit. Sic acidi quoque salis ope ex cremore tartari *sal commune* (an non potius *sal digestivum Sylvii?*) obtinuit. Tartarum autem vitriolatum ope acidi vitriolici parare non potuit, cum substantia mucilaginosa, quae tartaro inest, unionem acidi vitriolici cum tartaro impediret. Creta tamen adhibita, quae cum acido vitriolico superfluo selenitem formabat, id tandem bene praestitit. Interim alio loco iam monuimus *) Cl. DEMACHY negare crystallos, a Cl. MARGGRAFFIO in hoc experimento productas, verum nitrum esse easdemque pro cremore tartari plane non mutato habere, qui acido nitroso basin praebet, et cuius figura nitrum referens, ab hoc acido nitroso pendeat; ut itaque causa et natura huius phaenomeni notatu dignissimi omnino ulterioribus experimentis disquirenda sit. Ex sale quoque acetosellae, nec non ex rasura variorum lignorum et acido nitri, nitrum Cel. MARGGRAFF obtinuit. Plures quoque succi plantarum expressi, v. c. foeniculi, borraginis cet. si leniter euaporantur, crystallos dant, sali communi similes, quae vero basin alcali vegetabilis habent, cum acido nitroso admissis verum nitrum cubicum ex iis producat. Alkali hoc vegetabile plantarum cum alimentis in humores nostros receptum, nullam mutationem ibidem subit, cum idem Cl. Auctor etiam in vrina adhuc repererit.
- p. 13. Eiusdem Cel. MARGGRAFF observationes circa insectum, quod in foliis isatidis contusis et putrescentibus reperitur, iis vescitur, partes coeruleas, quae
haec
- p. 16.
- p. 18.

*) Commentar. nostr. Vol. XVII. p. 265.

haec planta continet, extrahit, et eundem colorem affumit. Cum Auctor Cel. varia tentamina cum foliis isatidis institueret, quo pigmenti, quod ex iis praeparatur, praestantiam augeret, inter alia folia quoque haec contusa putredini in aere libero exposuit. Post nouem dies in iis plures vermiculos seu larvas albas reperit, quae nigram striam in medio corpore ostendebant, de reliquo vero perfecte pellucidae erant. Haec stria, octo diebus praeterlapsis, coeruleum colorem adquisiuit, quo deinde totum insecti corpus tingebatur. Quatuor septimanis praeterlapsis, in chrysalides mutabantur, ex quibus muscae vulgaribus satis similes egrediebantur. In p. 22. fine de pigmento, quod ex isatide obtinetur, monet, principium tingens huius plantae, non in gummosis eius partibus, sed in iis latere, quae aqua non soluuntur, quae vero putredinis vi deinde per aquam affusam expanduntur.

Disquisitiones circa hypocistiten veterum, Auctore p. 25.
Cl. GLEDITSCH. Plantam parasiticam Cl. Auctor describit, quae in Europa australiore in radicibus cisti crescit, et quam LINNAEVS ad *Asarum* refert, cui vero Cl. GLEDITSCH in systemate suo nomen *Thyrsmes* dedit. Habet ea radicem parasiticam perennem: *caulis* eius est scapus annuus, aphyllus, rectus, teres, glaber, coloratus, ima parte nudiusculus, reliqua vestitus squamis amplexicaulibus, integerrimis, ouato-lanceolatis, alternis glabris coloratis, apice rotundatis, primo magis vel minus imbricatis. *Flores* terminales insident pedunculis filiformibus breuissimis, quorum singulum inueſtiunt bracteae binae, alternae amplexantes, ouato lanceolatae, concavae, tenuissime ferrulatae, et glabrae. *Calyx exterior* diphyllus et persistens est, foliolis oppositis, lanceolatis, ferru-

ferrulatis ac obtusis, perianthio brevioribus. *Interior* sistit *perianthium* monophyllum, campanulatum, semiquadrifidum, coriaceum, coloratum, persistens: laciniis erectis ouatis, integerrimis, obtusis. *Corolla* caret. *Filamenta* nulla adfunt, sed *antherae* sedecim lineares, parallelae, bivalves stigmati externe adnascuntur. *Pistillum* germen ouatum calyci adnatum sistit. *Stylus* cylindraceus et brevis, *stigma* vero subrotundum octofidum est. *Pericarpium* est bacca coronata, subglobosa, coriacea, intra substantiam calycis octolocularis, quae *semina* plurima, minutissima et subrotunda continet. Ex his omnibus vero Cl. Auctor concludit, hanc plantam singulare genus naturale constituere, quod ab omnibus aliis distinctum sit, huicque descriptioni tabulam aeneam addit, in qua fructificatio eius delineatur.

P. 37. Cl. DE FRANCHEVILLE *dissertatio de origine ambrae griseae*. Opinionem Cl. KRIEL superius (p. 55.) commemoratam, ambram scilicet petroleo affinem esse et ad minerale regnum pertinere, nec nouam, nec veritati consentaneam esse demonstrare annititur. Vix tamen argumenta eius iis, qui argumentis ex chemicis experimentis deductis magis, quam solis ratiociniis convinci solent, satisfacient. Putat enim ambram nequaquam ex regno minerali esse posse, cum omnia suffimenta suauius ad vegetabile regnum pertineant, cum naphtha tamen et succinum contrarium probent. Deinde non comprehendere potest, qua ratione petroleum fluidum se in aqua in corpus solidum condensare possit. Cum tandem, ut assumit, aqua marina magnam bituminis copiam contineat et amarities eius ab hoc bitumine oriatur, (quod utrumque tamen recentiorum multi negant), necessario ex Auctoris

Etoris Cl. mente sequeretur, vt idem hoc bitumen vel in ambram griseam condensaretur, vel haec ambra soluta in aqua marina, vt reliquum bitumen, maneret. His propositis, aliam hypothesein stabilire tentat. Ambram scilicet griseam apum esse opus putat, quae alueolos suos in scopulorum ad mare sitorum fissuris exstruant: et constare itaque ambram ex melle et cera, quae solis calore coquantur et in mare delabantur, in eoque natantes vltius perficiantur.

*Relatio brevis de foecundatione artificiali trutta- p. 47.
rum et salmonum, quae experimentis fide dignissimis confirmatur, a dexterrimo quodam physico institutis, Auctore Cl. GLEDITSCH.* Attentione maxime dignum est, hoc experimentum a Cl. IACOBI factum, quod foecundationem ouorum piscium in aqua ipsa fieri admixtione feminis marium probat. Sumsit enim feminas salmonum et truttarum viuas, earumque ventrem leuiter pressit manu ita, vt ouorum maturorum pars, sponte ab iis euacuaretur. Haec oua in cistam aliquam collegit, ita fabrefactam, vt riuuli cuiusdam aqua eam transire, nec tamen oua haec secum abripere posset. Tunc mares sumsit horum piscium, quae etiam, ventre eorum leuiter pressio, semen, quo turgebant, in aquam subiectam, in qua oua erant, emiserunt. Hinc oua haec impraegnata sunt ita, vt Cl. Auctor post aliquot septimanas viuos pisciculos, ex hac artificiali foecundatione productos, laetus conspiceret. Incrementum eorum, pro vario caloris gradu cet. retardatur, vel acceleratur. Cautiones, quae hac in re obseruandae sunt, omittimus. Monet Cl. Auctor inter pisciculos, qui hac artificiali foecundatione producuntur, plures esse, qui monstrosam fabricam ostendant; omnes tamen hos post breue tempus mori.

Ma-

Maxima denique admiratione dignum est, oua piscium demortuorum, imo semen marium per satis longum tempus vim prolificam conseruare, ita, vt ex missione ouorum horum cum semine etiam viui pisciculi prodeant.

Disquisitiones anatomico-physiologicae de causis fatuitatis (folie), quae ex vitiis partium internarum corporis humani oriuntur, auctore Cl. MECKEL. Saepe causam morborum animi corpori inhaerere, et in primis varia cerebri vitia sensus internos, licet alii quoque corporis morbi similem effectum nonnunquam producant, vario modo laedere, notissima res est. Inprimis vero Cl. Auctor experimentis accuratissimis cognouit, pondus specificum substantiae cerebri, in cerebro hominis sani et fatui vel melancholici insigniter variare. Cubus sex linearum in homine sano pondus drachmae vnus et granorum quatuor ad sex vsque habet, cum illud pro vario gradu, quo vasa repleta sunt, variet. In melancholicis et maniacis vero secundum Cl. Auctoris experimenta cerebrum saepius maiorem duritiem et siccitatem ostendit, et specificè leuius est. Saepe tamen etiam cum hoc vitio vniuersali particulare aliquod, vt calculus v. c. in cerebro etc. coniunctum est. Lymphae tandem coaceruationem, sanguinem acrem et maiorem eius affluxum, compressionem encephali, pus cerebrum irritans, irritationem neruorum intestinalium cet. tales morbos quoque efficere variis obseruationibus Cl. Auctor probat *).

a.1765. Inter commentarios anni 1765, qui nostram
p. 25. attentionem inprimis merentur, *dissertatio* est Cl.

COTHE-

*) Cerebrum maiorem duritiem et siccitatem in maniacis et melancholicis ostendere Cl. GREEDING negat.

COTHENII, in qua de remediis prophylacticis variolarum exponit. Variolas nouum esse morbum, non ab HIPPOCRATE describi, nec esse morbum hereditarium cet. monet, et de inoculatione disputat, cui non fauet. Cum vero omnia, quae hic contineantur, iam centies dicta sint, haec sicco pede transimus.

Noua experimenta physica de motu vegetabilium p. 52.
externo, eorumque a directione perpendiculari versus horizontem declinatione, auctore Cl. GLEDITSCH.
 De his experimentis, quae opusculis germanicis Cl. Auctoris inserta etiam sunt, alio loco iam diximus *).

Cl. MECKEL *observationes anatomicae de glandula pineali, septo lucido et origine paris septimi nervorum cerebri.* p. 91.
 Glandula pinealis non modo petiolis seu funiculis medullaribus cylindricis thalamis neruorum opticorum ita adhaeret, vt illos intret, sed et posterius e basi eius lamina medullaris egreditur, quae eam cum commissura cerebri posteriore coniungit, quam a nemine antea dictam, primus descripsit hic Cl. Auctor. In glandula pineali, fere semper grana calculosa reperit, quae sine dubio ex stagnatione lymphae oriuntur. Septum lucidum ex duplici lamina medullari cerebri componitur, quae posterius a se paullulum distant, sed deinde inter se coniunguntur ope striae medullaris tandemque ita confluunt, vt vnicam tantum laminam constituent. Nonnunquam inter has laminas lymphae effusa est. Anterius hae duae
 lamel-

negat. vid. Aduers. med. pract. Vol. II. Pars III. p. 534 seq.

*) Comment. Vol. XVI. p. 298 seq.

lamellae iterum a se inuicem secedunt. Nulla communicatio inter ventriculos cerebri anteriores seu tricornes existit, sed ii, ope septi lucidi, perfecte a se inuicem separantur. Fornix septo lucido brevior est, quod anterius inter duo crura fornicis cerebro, non fornici incumbit. Altitudo septi non ubique eadem est, cum illa minor sit versus posteriorem finem, quam versus anteriorem. Reliqua, quae ad fornicis descriptionem spectant, omittimus.

P. 99. Quod tandem ad originem nervi acustici attinet, notum est plurimos dissectores putare, partem eius mollem procedere e quarto ventriculo cerebri, et quidem ex fibris medullaribus transuersis, ex calamo sic dicto scriptorio prodeuntibus. Accuratus vero Cl. Auctor hoc examinavit, viditque illum oriri e margine posteriore pontis VAROLII, seu potius e pedunculis cerebelli; sed filo a radice nervi duri plane diuerso, quippe quae propius versus medullam oblongatam sita sit.

a.1766. Initium anni 1766 facit *commentarius* Cl. GLEDITSCH, de vero charactere naturali et generico plantae Zietenia dictae. Characterem essentialem huius plantae; quam in honorem Ill. DE ZIETEN, qui Trebnizii in Marchia hortum botanicum egregium instruxit, Cl. Auctor ita nominavit, iam in *systemate plantarum a flaminum situ* exposuit *). Planta est quam TOURNEFORTIUS iam descripsit, cui *galeopsis orientalis laeundulae folio, calyce villosissimo* dicitur, in cuius herbario viuo, quod Bero-
lini extat siccata etiam reperitur. BUXBAUMIUS vero eam nomine *sideritis parvis floribus purpureis* descripsit. Hoc commentario vero Cl. Auctor ostendit *Zieteniam* differre a reliquis ei similibus
plan-

*) vid. comment. Vol. XII. p. 359.

plantis : calyce hypocrateriformi , limbo patenti lineari longissimo , corollae labio inferiori laciniis lateralibus reflexis , media complicata , femineque semper vnico , perfecto in quouis calyce , ad cuius basin tria abortiua minima , seu potius rudimenta tantum conspiciuntur , vt in *Collinsonia*. In vniuersum proxime ad *Stachyn* accedit ; maxime autem differt a *Galeopside*, *Sideritide* et *Betonica*, quae genera ex Cl. Auctoris mente omnino separanda sunt. In tabulis adiectis speciosa haec planta egregie delineatur.

Commentarius de oleo quodam vegetabili, loco olei p. 11.
oliuarum in omnibus iis regionibus adhibendo, quae frigidiores sunt, quam vt olea in iis crescere possit, Auctore Cl. DE FRANCHEVILLE. Oleum ex fructibus fagorum loco olei oliuarum commendat, variasque cautiones addit, quae in praeparatione eius obseruandae sunt.

Inter commentarios an. 1767 tantum ad nos a. 1766. pertinet:

Relatio de foecundatione artificiali, tertia vice p. 3.
optimo successu in horto botanico academiae regiae Berolinensis reiterato, Auctore Cl. GLEDITSCH. Cum palma dactylifera nunquam fructus maturos exhibeat, nisi puluere antherarum fuerit foecundata; Cl. GLEDITSCH, vt alio loco indicauimus *) spatham floridam ex planta mare, quae in horto Lipsiensi Bosiano extat, sibi transmitti curauit, et femineis flori-

*) Conf. *Hamb. Magazin*, V Band, p. 529. Comment. Vol. I: p. 257. it. *Hist. de l'Acad. de Berlin*, 1749. p. 103. Comment. l. c. p. 401 seq. it. Comment. nostr. Vol. IV. p. 298.

floribus, puluere antherarum conspersis, fructus maturos obtinuit. Hoc experimentum anno 1749 factum, non solum a. 1750 eodem successu reiteravit, sed etiam a. 1768 puluere antherarum, ex orto Carolsruhenfi a Cl. KOELREYTER transmissio, usus, similem euentum obseruauit.

a.1768. Anni 1768 primus commentarius est:

p. 3. Cl. MARGGRAFF *obseruationes de volatilisatione partis illorum lapidum, qui fluores (Flüsse) dicuntur, ope acidorum effecta.* Distinguendi sunt hi lapides ab ea specie, de qua Cl. MARGGRAFF in Tom. V. et VI. commentariorum horum disse-ruit, quae etiam *flus-spath* dicitur, et ex qua phosphorum idem ille praeparauit *). Lapidēs vero, de quibus hic exponit, sunt *fluores* sic dicti *minerales* crystallifati, qui variis coloribus tincti in officinis *pseudo-smaragdi*, *pseudo-amethysti* e. s. p. dicuntur. Illi nullum acidum vitriolicum continent. Cum vero Cl. MARGGRAFF sedecim vncias calcinati huius lapidis cum vnciis duabus olei vitrioli misceret et destillationem institueret, sublimatum obtinuit album, quod butyro antimonii simile erat, et, pruna admota, liquecebat. Liquidum, in recipiente contentum, odorem acidi formicarum habebat. Proportione olei vitrioli aucta, etiam sublimati copia augebatur. Eadem fere phaenomena, acido nitroso, acido salis marini, et ipso acido phosphori ac aceti adhibitis, obseruauit, ita, vt haec volatilifatio, quae ope acidorum obtinetur, inter praecipuos characteres horum lapidum referri mereatur.

p. 12. Cl. GLEDITSCH *dissertatio physico-oeconomica, de usu, quem variae species caricis LINN. inprimis*

*) Pertinet haec species ad *gypsum spatiosum* CRONSTAEDEII.

mis in viis, per loca vliginosa et paludosa munien-
dis, praestant. Plurimas caricis species, quae in
Marchia crescunt, describit, et vsum oeconomicum
earum indicat. *Caricem arenariam* L. sassaparillae
loco adhiberi posse, imo ei praeferendam esse mo-
net. Radices vero caricis, in locis vliginosis crescen-
tis, ita inter se concresecunt, vt massas satis duras
formant, quae in frustula minora diuisae viis, per
loca paludosa muniendis, optime inferuire pos-
sunt.

Cl. COTHENII *dissertatio de necessitate scholae* p. 42.
veterinariae et ratione, qua ea institui debeat. Utili-
tatem et necessitatem eiusmodi scholae pluribus
commendat, et, quae in ea doceri debeant, exponit.
Quae tamen omnia, cum cognita iam sint, omit-
timus.

Iam ad annum 1769 accedimus, in quo Cl. a. 1769
GLEDITSCH, *characteres generum Albucae et Ale-* p. 57.
thris LINNAEI corrigit, quarum plantarum flo-
res Ill. LINNAEVS ex ficcis tantum speciminibus
descripsit. Cl. vero GLEDITSCH descriptionem
hanc hic ita emendat, vt doceat: *Albucam* non mo-
nopetalam, sed hexapetalam esse, nullum in ea ne-
ctarium reperiri a corolla diuersum, stamina omnia
inter se eiusdem longitudinis esse, cet. Quod ad
Alethrin attinet, notat, secundam speciem LIN-
NAEI, seu *A. Capensem*, quam hortulani *Brunswi-*
giam dicunt, ab *Alethri* L. caractere differre.
Nouum igitur genus ex ea constituit, illamque *Velt-*
heimiam in honorem Ill. DE FELDHEIM, qui hor-
tum celeberrimum Harpkensem, prope Helmsta-
dium instruxit, vocat. Descriptionem vero chara-
cteris huius generis ita exprimit Noster, vt do-
ceat, *Veltheimiam* habere calycem nullum; corollam ei
esse

esse monopetalam, tubulosam, oblongam, hypocarp-
 piam, marcescentem. Tubus est nonnihil angulatus,
 basin versus incuruus. Limbus erectus, breuissimus,
 sexfidus, patens, laciniis ouato-obtusis, in apice cras-
 siusculis. *Stamina*: Filamenta sex, subulata, versus
 latus inferius inflexa, tubo corollae paullo breuio-
 ra, eodemque tubo infra mediam sui partem secun-
 dum longitudinem adnata, et in fundum decurren-
 tia. *Antherae* incumbentes, oblongae, didymae.
Pistillum. Germen oblongum, trigonum, triful-
 cum. Stylus subulatus, striatus, situ et flexura sta-
 minum, iisque breuior; stigma obtusum. *Peri-
 carpium* capsula tumida, ouato-oblonga, superius
 attenuata, tribus alis notata, trilocularis, triualuis,
 apice dehiscens. *Semina* in singulo loculo soli-
 taria, obouata, arillata, receptaculo columna-
 ri affixa.

VII.

Selectus medicamentorum rationalis tam simplicium, quam compositorum in duas partes diuisus: scripsit CHRISTIANVS PHILIPPVS HERWIGIVS, med. doct. seren. princ. ab Hohenlohe etc. a consiliis et terrae Waldenburgicae praefecturarum physicus, academ. caes. nat. cur. collega, et regiae Francof. ad Viadr. assessor. Ienae, apud Christ. Henric. Cuno, 1771. 8. pagg. 156. praeter dedicat. praefat. cap. argum. et indic.

Inter alios huius generis libellos non vltimum locum hic promereri nobis videtur. Ac potissimum quidem, cum recentiorum inuenta hic quoque sint commemorata, inprimis Stoerckiana, quorum et nonnulla laudauit, multaque obsoleta et inutilia remedia praetermissa. Plane enim omisit terras lapidesque omnis omnino generis: item marina. Pauca e mineralibus et animalibus, plurima e vegetabili regno repetiit remedia, historiamque naturalem et chemicam explicationem ideo neglexit, quod practicam materiae medicae partem hic solummodo curat.

Inter acria resoluentia, quae primum caput sistunt, inuenimus quoque castoreum, moschum, assam foetidam. Castoreum Nostro nociuos edidisse effectus, non semper vtilis videtur. Vetustum enim et rancidum plerumque occurrit, ventriculum hinc onerat, bilem exaltat et putrida generat. Moschus apud Nostrum est incidens, nervinum et cordiale, gustuque acre remedium. Assa foetida est incidens, roborans vermibusque inimica.

p. 1.

p. 12. Dein sequuntur acria purgantia et emetica, adstringentia, subadstringentia, aromatica s. aromata, balsamica, partim resolvente gummoso benigne balsamico, partim oleo et resinoso fragrantiori stipata; subadstringentia dissoluenti acido saponaceo iunctis, vt tamarindi; vel dissoluentia saponaceae indolis dulcia, quibus adscribit Noster mannam, mel, passulas; dissoluentia saponaceae indolis amaricantia; amara fortiora tonica, inter quae reperimus amygdalas amaras; resoluentia mineralia insipida, ex quibus cinnabarim nativam e. gr. commemoremus; leniter resoluentia, humectantia nutrientia, mucilaginosae s. emollientia et tandem narcotica, quibus adnumerati sunt a Nostro flores papaveris erratici, femina papaveris albi. Nos vero, cum non omnia quaeque possimus hic breuiter, vti constituimus, tradere, de nonnullis singulis videamus.

p. 30. Cortex Peruvianus specificè agit contra morbos periodicos omnes. Solus exhibitus totam quidem paginam saepius absoluit, sed magis efficax redditur, si cum aliis commiscetur. Ita in febribus exanthematicis putridis cum camphora et acido quodam, in malignis intermittentibus et tussi convulsiva cum sulphure antimonii aurato et moscho, in inflammatoriis cum nitro, in lue venerea et verminosa causa cum mercurio dulci, in viscerum labe et obstructione cum rheo et marte, in scabie cum floribus sulphuris et in tumoribus cum squilla. Hic cortex solus magnum remedium, nec vnquam noxium est. Non tamen singulo individuo, neque omni morbo medetur: innocuum quidem, at non vniuersale est remedium. Plethora et primarum viarum saburra corticis effectui officiunt. Cum Ill. A ROSENSTEIN externe imponit ventriculo corticem, cum vino s. aqua in pultis formam coctum, porro et in enematibus eum commendat.

Staphi-

Staphilini, alias dauci, interne in morbis pectoris, p. 40.
iſtero et heſtica abdominali praefſto ſunt, nec non ex-
terne in cancro dolores leniunt. Semina hyoſcyami
in mania profunt. Huic ſimile eſt remedium ſtramo-
nium. Conuenit muliereculis, quae opium non fe-
runt, clauo hyſterico laborantibus.

In parte ſecunda compoſita et praeparata con- p. 57.
tinentur. Atque hic acria reſoluentia; emetica,
purgantia et laxantia; adſtringentia; ſubadſtringen-
tia aromatica, baſamicaque; ſubadſtringentia, diſſol-
vente acido ſaponaceo; diſſoluentia ſaponaceae indo-
liſdulcia, et acido dulcia; diſſoluentia, ſaponaceae in-
dolis amaricantia tam gummofa, quam ſalina; ama-
ra fortiora tonica; reſoluentia mineralia; leniter re-
ſoluentia, humeſtantia et nutrientia; mucilaginofa
ſeu emollientia, denique narcotica.

En quaedam exempla: Aqua e. gr. vulneraria p. 86.
mineralis, quae conſtat ex ſaccharo ſaturni, cam-
phora et aqua fontana laudatur in cancro aperto
mitigando, eique limites ponendo.

Infuſum picis liquidae eſt liquor baſamicus, p. 110.
blande reſoluens, vrinam potiffimum promouens,
conducit morbis pulmonum, arthriticis, ſcabiei, ob-
ſtructionibus abdominalibus etc. Doſis eſt mane
et vespere ab vnciis quatuor ad ſex et vltra. Com-
ponitur ex aqua comuni et pice liquida Noruegiae,
vel ex reſina pini puriſſima. Aqua terebinthinae
acida picem liquidam puritate et virtute baſamica
antecellit.

Oleum cerae commendatur externe in fiſſu- p. 117.
ris labiorum et papillarum, tumoribus et pernio-
nibus.

Cremoris tartari partes quatuor et vna bora. p. 125.
cis ſiſtit cremorem tartari ſolubilem, cremori tar-

tari, praeter solutionem promptiorem et faciliorem, non absimilem quoad effectus.

Finem imponit huic libro index nonnullorum librorum chemicorum, pharmaceuticorum practico-
rumque, in vsum huius libri perlustratorum.

VIII.

GERARDI L. B. VAN SWIETEN commen-
taria in HERRMANNI BOERHAAVE apho-
rismos de cognoscendis et curandis morbis.
Tomus quintus. Lugd. Batau. apud Ioan-
nem et Hermannum Verbeek, 1772. 4.
cum priuilegio praepotent. ord. Holland. et
Westfrisiae, pagg. 691. praeter praefationem,
indices Auctorum atque rerum. Nec non
HERRMANNI BOERHAAVE libellus de
materie medica et remediorum formulis,
quae seruiunt aphorismis de cognoscendis et
curandis morbis.

Absoluit itaque b. VAN SWIETEN *) hoc opus
intra triginta fere annorum, cuius utilitas
omnibus constat, cuiusque lectio neminem poenite-
bit. Incipit quintus hic tomus a variolis, praefa-
tione praemissa, quae quadam ex parte insitionem
variolarum, curam praeparatoriam, quam non ni-
miam esse oportet, atque vsum liberi aeris in naturali-
bus aequae, atque artificialibus spectat. Dein morbi
epidemici pertractantur, nec non de calculo, lue vene-
rea, rachitide, rheumatismoque agitur. Nos vero, uti
cum praecedentibus est **) factum, de nonnullis
fingu-

*) v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 159 et 543.

**) ib. Vol. III. p. 457. Vol. XIII. p. 392.

singulis videamus, salvis breuitatis legibus nostris.

Omnis omnino aetas variolis est obnoxia. Vidit Noster sexagenarios et octogenarios senes variolosos. Sed nunquam b. SWIETEN in numerosa praxi triginta annorum spatio, bis variolis laborantem aliquem vidit. Id quod tot affirmant, quot negant medici. Grauidas porro variolis laborare expertus est, nec non fetum in vtero. Id quod etiam negatur *).

p. 8.

Variolosus morbus sanguini talem inducit spissitudinem, qualis in morbis maxime inflammatoriis obseruatur. Quapropter optimum pro hoc morbo, naturali et artificiali modo cum corporibus communicato, tolerando vitae stadium videtur esse, quod inter quartum annum absolutum ad pubertatem fere intercedit. Praeterea et tunc dentitio nequit mala augere. Interim tamen et senes, rigida fibra praediti, satis frequenter ex hoc morbo emergunt, quamquam mollis et laxae temperiei hominibus mitior ille contingat.

p. 14.

Inter multas sententias de contagio varioloso, quo sine dubio variolae propagantur, habet et Cl. HAHNII **) opinionem, quae potius Nostro ingeniosa, quam vera, non prorsus inutilis tamen videtur. Lectu digna in primis corollaria sunt de contagio, quae addit b. SWIETEN. Contagium variolosum diu et superatis variolis nocet.

p. 16.

De pabulo seu fomite varioloso cum agitur a Nostro, videtur ei contagium variolosum non assimilare sibi tantum certas quasdam humorum mole-

p. 34.

E 5

culas,

*) v. COTTUNNIVS, de sedib. variol. comment. nostr. Vol. XVIII. p. 417.

**) v. aduersar. medic. practic. quae Lips. prodeunt, Vol. I. p. 215. comm. nostr. Vol. XVII. p. 497.

culas; sed omnia fluida et solida corporis posse corrumpere. Id quod et ex insitione variolarum quodammodo patet.

P. 43. Semper b. SWIETEN suspectum fuit in praxi, si variolarum morbus cum acri et immani lumbagine inciperet, ita, ut aegri, prae doloris acerbitate, corpus mouere non possent, si subinde mitescit et per interualla recrudesceat, praesentibus febricula leni, et pulsu paruo et debili sine celeritate. Prodit enim haec lumbago maximam variolarum malignitatem.

P. 54. Vltimus inflammationis exitus, in scirrhum nempe, in morbo varioloso proprie non obseruatur quidem; attamen habet et ille locum, si pars inflammata glandulosa est. Variolarum enim species obseruatur, uti et Noster in sequentibus docebit, in qua papulae non suppurant, sed indurescunt et verrucas callosas referunt, sicque utcumque scirrhos imitantur. Inde et apparet, morbum variolosum inflammatoriis adscribi posse, licet multa habeat peculiaria, per quae ab aliis inflammatoriis distinguatur. Notat vero Noster, tum contagium febrem acutam calidam excitare oportere; non autem virium prostrationem, et frigoris potius sensum, quam aucti caloris inducere.

P. 55. Largitur quoque Noster febrem variolosam sine variolis. Constat porro, variolas oriri a contagio, quod applicatum corpori, venenorum instar, agit. Ex historia autem venenorum probabile videtur, singulum habere suum antidotum. Quapropter poterunt varia tentari circa variolosum experimenta, et forte inueniri quid, quod hoc venenum domet, sicque morbum hunc variolosum in ipsis incunabulis suffocet.

P. 61. In variolis profuisse mercurium dulcem exempla hic enarrantur, ex quibus patet, variolas vel paucif-

paucissimas, vel nullas sequi mercurii dulcis usum. Nec minus stibii vires huic morbo conueniunt, imprimis, si cum argento viuo, seu eius praeparatis vnitur, vt aethiope minerali *), cinnabari antimonii e. f. p.

Venaesectionem, quam b. VAN SWIETEN et p. 67. ipsis maculis variolosis iam apparentibus sine vlla eruptionis turbatione instituit, dirigere oportet febris vehementiam. Nec putat Cl. Auctor, omnes papulas suppurare, sed multas apparere quidem, sine suppuratione tamen resolui. Pari modo febris variolosae impetus et vehementia methodi medendi electionem iuuant. Antiphlogisticam medendi rationem plerumque exigunt variolae, interdum tamen essentia alexipharmaca STAHLII, quam et BOERHAAVIUS suavit, vel tinctura croci, a Nostro cum fructu propinata, ad variolas formandas requiruntur, febre minus valida, quam opus est, praesente.

Variolas et internas corporis partes occupare, p. 73. videtur Noster asserere, id quod non omni omnino exceptione maius est **). Quando numerosissimae sunt variolae in cute capillata capitis, et, capillis densis tectae, vix apparent, tunc obseruauit Noster deliria satis valida et capitis intensos dolores.

Tum Noster crises variolarum accessorias per- p. 88. tractat, diarrhoeas, haemorrhagias saluationemque. Haemorrhagias narium non adeo timet Noster, nec menses; grauidis autem ingens periculum imminere credit, si variolis corripiantur. Abortiuerunt plerumque et perierunt quoque. Vnius grauidae narrat Noster hic rarum exemplum, quarto mense grauiditatis variolis affectae, quae conualuit,

*) vid. comment. nostr. Vol. XVIII. p. 414.

**) vid. ib. p. 411.

et debito tempore sanum satisque robustum fetum peperit, licet ipsa tenella esset salivationemque copiosam a die nono morbi usque ad diem vigesimum cum aphtis faucium et oris, laesaque deglutitione toleraret: item sequebatur per triduum diarrhoea valida, quid, quod sanguis incepit fluere de vtero vigesimo secundo die, sequenti cessabat, quarto die redibat.

P. 90. Has euacuationes sanguineas, variolis superuenientes, plerumque salutare esse, symptomata lenire minuendo calorem et febrim largitur Noster, modo nullam humorum resolutionem prodant. Qua occasione de stillante sanguine ex oculo, e. s. p. in variolis, nec non ex ipsis papulis differit, sanguinemque per vomitum, urinam aluumque exiisse in variolosis monstrat.

P. 97. Videntur Nostro salivatio et tumor manuum pedumque inter diuersas vias, quas natura affectat in materia morbi variolosi e corpore eliminanda, numerari debere inter salutaria haec naturae, morbo medentis, conamina: licet ignoretur causa, cur haec crisis accessoria variolosa per salivales ductus fiat.

P. 99. Variolas discretas, paucas, benignas, pisi subgrandis magnitudinem aequantes, Noster vidit, nec non maculas liuidas, letales, variolis discretis malignis interspersas. Porro obseruauit benignas variolas, nono die morbi suppurantes et arefactas, decidere. Variolas bonae indolis materiam, puri similem, continere oportet: semper periculosum est, si ab hac conditione recedit, vti apparet ex crySTALLINIS, filiquosis, verrucosis et id genus aliis *). Intumescencia partium variolis obsessarum, prodit vires vitales validas. Miliaria rubra et alba variolas vel comitantur, vel eas sequuntur, non raro sine periculo.

*) vid. l. c.

culo. Plerumque hoc euenit, euacuatione primarum viarum non curata, de qua in omnibus exanthematicis morbis olim magnopere timebant.

Bona fide testari posse Nostrum legimus, quod p. 112. in numerosa praxi pulcherrimos effectus viderit opiatorum in curandis variolis: idem nouit contigisse aliis egregiis medicis, quibuscum hac de re saepius egerit. Aluum constipari a narcoticorum usu certum est; sed clysmata, serum lactis cum tamarindis facile hic iuuant. Etenim alui perpetuam constipationem in variolarum curatione valde noxiam iudicat.

Pus variolosum, a venis bibulis resorptum, et p. 114. circulantibus humoribus traditum, potest sanguini purulentam cacochymiam inducere, plurimaeque mala producere, vt febres pessimae indolis, deliria ferocissima, suffocationem subitanam, tabem, vomitum, dysenteriam, hepatitidem, quam Noster post pessimas confluentes natam vidit, et icterum. Diuersitas horum malorum pendet praecipue a partibus et cauis corporis humani variis, in quae derivatur haec purulenta materia. Felicius vero puris variolosi resorpti metastasis est versus exteriorem corporis superficiem, aut artus. Vidit cubiti et genuum anchylosin, anthraces, vlcera sinuosa et curatu difficillima, aliaque. Merito cum MORTONO pro signo suspecto habendum est, si, variolis exsiccatis, aegri non appeterent, et hecticus maneret in corpore calor.

Octenni puellae, pessimis variolis decumbenti, p. 117. sexto morbi die difficultas respirandi erat cum tumore colli, turgidam columbarum ingluuiem referente et cedente, quamdiu externe premeretur. Moritur aegra et tumor dein subsidet. In cadauere inueniebatur interstitium septimi et octauae annuli cartilaginei asperae arteriae erosum.

Ad

p. 119. Ad tensionem inflammatoriam minuendam, et ad suppurationem pustularum variolosarum promovendam vsus est Noster emplastro de meliloto, et **Cl. ALEXANDER SUTHERLAND** suadet totum corpus hoc emplastro inuolui et nonnullis exemplis, quorum a Nostro hic mentio iniecta est, confirmat huius emplastri vtilitatem magnam. Porro pertusionem variolarum maturarum, quam alii volunt, alii nolunt, omnino, si cum abscessu comparetur, concedi posse Noster arbitratur. Nec timet de foveolis et deformitatibus in cute per incisionem variolarum. Non expectat Noster, ut **TULPIUS** et **HOFFMANNVS** sunt experti, ab acidis mineralibus in variolis profundiores foveas et acrius pus, modo caute et moderata dosi adhibeantur.

p. 133. Indicatione curatoria quadruplici in stadio suppurationis proposita, ac primum quidem, ut concilietur puri facilis exitus versus exteriora, ut illud dein, quod iam resorptum est, expellatur de corpore, ut tertio degeneratio humorum in putredinem, hic metuenda quam maxime caueatur, vel nata si iam sit, emendetur, quantum fieri potest et tandem, ut febrilis impetus in debito retineatur moderamine, non inutile **b. VAN SWIETEN** iudicat quaedam addere de symptomatibus nonnullis, hunc morbum quandoque comitantibus. Inter haec sunt conuulsiones, quas non adeo noxias credit et imprimis profuisse observauit, si caueretur, ne infantes dorso incumberent supini, sed in alterutrum latus conuersi iacerent. Porro inter haec referuntur a Nostro dolores subiti et molestissimi in externis partibus: item glandularum inguinalium tumor, semel a Nostro observatus, qui simul cum morbo euauit: vrinae suppressio, mictusque cruentus periculosum symptoma.

Denique

Denique breuiter recensentur rationes, quae Cl. p. 142. Auctorem permouerint, vt nemini variolarum inplantationem suaserit.

Pestis quandoque in aliis morbis latet. Id quod p. 152. vidit Noster anno decimo tertio huius Seculi, cum Vindobonae grassaretur. Etenim pestis saepius occultabatur sub pleuritidis, catarrhi, et anginae specie. Non diu autem post prodibant bubones et carbunculi, certissimi testes pestis. Pleuritis ex propria natura per sudores interdum soluitur. Causas morborum epidemicorum manifestas esse, et in aere posse quaeri a Nostro ostenditur, et multorum Auctorum, qui in primis de peste scripserunt, exemplis illustratur, illudque, quod aeri inhaereat, et morbis epidemicis generandis seruiat, explicatu difficillimum iudicatur. Accedit et hoc, quod morbosum epidemicum aeri inhaerens varium sit. Porro disquirat: num per infecta noxiaque paludum effluuia, illud contagium propagetur? Contagium semel natum efficax esse, idem et mora acrius forte fieri posse, mutata etiam aeris vicissitudine; attamen sine praedisponente causa in corpore ad morbum contagiosum producendum non sufficere. Contagium, in aere natum, non semper huius ope communicari probat Cl. Auctor ex inplantatione variolarum, quae tum, cum nullum variolosum contagium aeri inest, pure varioloso in corpus immisso, excitari possunt. Epidemicus morbus in alios intercurrentes et stationarios habet imperium, ac omnino magna profecto cautione, atque perspicuitate opus est in morbis epidemicis curandis. Id quod Cl. Auctor, iis medendi rationem tradens, clare monstrat, et multis exemplis ex SYDENHAMO aliisque, additis suis ipsis obseruationibus practicis illustrat.

Hic

p. 201. Hic de calculo agitur a Cl. Auctore. Calculi rudimenta adfunt etiam in vrina hominum sanissimorum. Vidit Noster in linteis neonatorum infantum, ceterum sanorum, copiam sabuli nephritici, satis duri. Atque hoc sabulum, in vrina sanissima apparens vocari posse Nostro videtur calculus natus, felicesque illos praedicat, in quibus hoc tardissime fiat. Licet vero calculi materialis causa seu rudimenta non tantum vrinae, sed et aliis corporis humoribus insunt; tamen ex his solis, alia causa non accedente, maior facile nasci calculus non videtur. Atque hanc causam occasionalem praebet corpus quodcunque insolubile, siue illud sit animale, vegetabile, aut fossile; siue in corpore ipso formetur, siue in illud extrorsum deferatur: cuidam corporis parti inhaerens, ad se trahens elementa calculi, etiam in homine, in quo nusquam vlla dispositio ad calculum observata est, et basin nucleumque crescentis calculi efficiens. Vidit Noster calculum renum fuisse factum nucleum calculi vesicae urinariae.

p. 215. Credibile est, in bile et vrina maiorem copiam elementorum calculosorum haerere, eaque ibidem facilius adunari posse; interim nec deesse in aliis corporis humoribus calculorum rudimenta, omnesque omnino corporis cauitates calculos continere observationes docent. Omnia enim caua corporis exhalant tenue quoddam liquidum, quod, nisi a venis absorbentibus denuo recipiatur, stagnat et hydropem facit ibi, vbi colligitur. Si viui animalis abdomen thoraxue subito aperiuntur, fumus quasi exhalat, qui manifeste vrinofum odorem spirat. Sanguis, e vasis emissus sanguiferis, similis odoris halitum prodit. Vnde non temere creditur, exhalans illud, suburinofum, aequè continere calculi elementa, quam vrinam, ac seruire eius formationi.

Id

Id quod multis exemplis illustratur a b. SWIETEN, ex quibus facile intelligitur, vix loca in corpore humano esse, in quibus calculus non fuerit aliquando inuentus. Inter ea exempla, GAVBII quoque reperimus de calculis vterinis *), quod a Nostro omni omnino exceptione maius iudicatur. Reliqua exempla hic nobis sunt praetereunda partim breuitatis ergo, cuius rationem habeamus oportet; partim, quoniam iam multa eorum his nostris commentariis sunt inserta.

Quaenam esset calculi materies, multum disputatum fuit. Relictis hypothesibus hac de re excogitatis, constat materies calculi solidorum et fluidorum corporis elementis, quae vitae seruierunt, partes corporis fecerunt, et ad vitam inutilia redita, abrafa motu vitali, separata sunt. Vnde patere Nostro videtur ratio, cur tanta diuersitas obseruetur in calculis, prout diuersam materiam in prima formatione sua admiserint, aut partes, calculum constituentes, diuersa proportionem inter se mixtae fuerint.

Chemica analysi calculorum id quoque, de quo p. 233. nunc agitur a Nostro, commonstrat. Color calculorum fuscus debetur oleo. Ferrum inesse humoribus corporis humani affirmatur, atque multis exemplis probatur; an vero basin ac duritiem calculo dare possint ferreae particulae, dubitat Noster. Calculosae porro hae concretionem videntur magnam habere affinitatem cum tartaro vini. Vnde et calculus vocatur tartarus animalis. Id quod partim ex formatione calculi et tartari, partim ex solutione vtriusque in vnis iisdemque menstruis probatur.

His

*) Haarlemsche Maatschappy, Tom. III. p. 604. comm. nostr. Vol. IX. p. 21.

p. 245. His praemissis, sequitur, ut considerentur illa, quae ad diagnosin, prognosin, et curationem calculi pertineant, cum in renibus, vreteribus, vesica aut vrethra haeret. De calculis vesicae felleae in capite de hepatitide et ictero multiplici dictum est. Quod si vero calculi in aliis visceribus et locis corporis haerent; fere semper deficiunt certa signa diagnostica. Vidit Noster hominem, qui singulis mensibus triginta, imo plures quandoque calculos, phaseoli interdum minoris et pisi, interdum alius atque alius figurae, magnitudine, sine magna molestia et ita, ut eorum descensum ex renibus sentiret, eorumque aduentum certo praediceret, emingebat.

p. 261. Obseruatur in calculo vesicae laborantibus, imprimis magno, urinam emingi, longe pallidiorem vrina sana, pessimeque foetentem. Calculi albi sunt fere semper fragiliores reliquis; cinerei duriores; ferrugineum nigricantem colorem habentes vulgo sunt durissimi.

p. 277. Inter signa calculi, cuius diagnosis non semper adeo facilis est, inueniuntur et hic flocculamenta et fila mucosa in vrina haerentia.

p. 281. Tenerae fabricae mulierem, a matre calculosa genitam, obseruauit Noster emingere calculum triangularem valde acutum, paullo post urinam subturbidam cum ramentulis albis et copia sabuli nephritici. Atque haec femina ita conualuit, ut per plures annos nulla incommoda calculosa pateretur, licet haereditaria ei inesset ad calculos dispositio.

p. 282. Signa calculi renum moti maxime obuia haec sunt: oritur saepe cito dolor punctorius in latere potius, quam in dorso, cum nausea, vomitu, inquietudine, perpetua mutatione corporis de loco in

in locum. Si magnus est calculus, post motus minus cruentus facile producitur.

Signum certum calculi vesicae vrinariae esse dicitur p. 287. citur vrina alba cum sedimento mucoso, crasso, multo, graueolente, quod alii pro pure habuerunt; Noster vero illud non esse monstrat.

Tres indicationes curatoriae sunt hic enumeratae p. 300. quae cernuntur in imminutione et expulsionem calculi renalis, tandemque in auxiliis palliativis, quae ad malum, quod tolli nequeat, facilius tolerandum quid conferant. Nephrotomiam, quam non adeo difficilem iudicat cum nonnullis aliis G. TEN HAAFF *), qui notabilem curationem fistulae, ex adipe renum ortae, ibi commemorat, multis et insuperabilibus premi difficultatibus Noster putat.

Iam ad lithontriptica Noster progreditur. Cum p. 313. nempe calculus humanus non sit corpus homogeneum et simplex; sed chemico igne examinatus, similia det producta, atque ex aliis animalium partibus elici igne possint, nimirum sal volatile, aquam, olea, et caput mortuum nigrum, et friabile, quod, omni oleo tandem expulso, relinquit terram non amplius cohaerentem: non temere arbitrari videntur nonnulli, cohaesionem partium, calculum constituentium, turbari posse, indeque calculos solui. Qua occasione et Noster aeris fixi potestatem ad cohaesionem cum HALES, MACBRIDIO aliisque monstrat: atque ideo cum aliis calcem viam, vi praeditam expellendi aerem fixum ex calculo, laudat et magni nominis remedia lithontriptica ex ea parari posse autumat. Quapropter et hic IO. STEPHENS remedium lithontripticum proponit, cuius vis pendet a calce testarum ovorum et sapone,

F 2

et

*) v. Verhandel. te Haarlem, V. Deel, p. 168. comm. nostr. Vol. XI. p. 124.

et omnino hic aqua calcis, lac et sapo, vt optima quaeque lithontriptica remedia nominantur.

p. 333. Porro et agitur de immittendis lithontripticis iisdem remediis, inprimis calcis aqua in vesicam. Est quoque in hunc finem instrumentum inuentum, quod WILL. BUTLER *) descripsit.

p. 336. Vua vrſi inſigniter Noſtro profuit, in vlcerofis viarum vrinariarum malis, vbi nulla calculi ſigna aderant. Repetitis experimentis, et ſolo vuae vrſi vſu, certus Noſter factus fuit. Nihil enim praeter ea b. SWIETEN exhibuit aegris, quam radicum altheae et liquiritiae decoctum largiter et copioſe, quod ab aegris potabatur ad imminuendam et inuolueſcendam vrinae acrimoniam. Vnde Noſter aſſerit remedium hoc laudem mereri, licet de eius vi lithontriptica nihil certi conſtet. Liquorem betulae et ſpiritum nitri reiicit Noſter. Nam ſpiritus nitri dulcis ſoluit calculum, ſed veſica non fert illum niſi dilutum, nec ventriculus: ideoque inefficax redditur. Magiſtra ſeu lixiuum ſaponis capitale, quod conſtat ſale alcalino fixo, igneo ac cum calce viua parato, aqua diluto, non, niſi limitata doſi et dilutum molli liquido, adhiberi poteſt. Quae poſtremo habet Noſter de lithotomia, cuius euentum ſemper dubium iudicat, ea hic non poſſumus, ſalvis brevitatis legibus, vlterius perſequi.

p. 372. Iam veniamus cum Noſtro ad luem veneream, quae et ſiphylis dicitur a HIERONYMO FRACASTORIO, qui in carmine, quo luem veneream deſcribit, fingit ſiphylum, regis ALCITHOI greges paſcentem, et illorum numero et pulchritudine ſuper-

*) v. EIVSD. a method of cure for the ſtone chiefly by injections, Edinb. 754. 12. comm. noſtr. Vol. IV. p. 273.

superbum insultasse soli. Regnavit lues constanter et vno tenore ultra ducentos et septuaginta annos, cum aliqua symptomatum mutatione. An unquam hoc in alio morbo epidemico observatum? Quapropter abluere penitus videtur lues Nostro a more epidemicorum. Est contagium, quod sese communicet cum corporibus alio atque alio modo.

Praecipuum signum diagnosticum vlcusculo-
rum venereorum est, quod vulgaribus remediis
pertinaciter resistent; e. gr. unguento pomato, se-
bo candelarum, ceteris. Cicatricis quoque formatio
in venereis vlceribus apparet, in medio vlceris fun-
do versus omnem ambitum, in aliis ab ambitu vl-
ceris versus centrum, docente Cl. GOULARD.
Lues venerea plerumque se manifestat in illa parte,
qua communicatur, sed non semper tamen, diuer-
sique malignitatis gradus in contagiosa materia luis
observantur, uti et Cl. ASTRUC notavit, quem,
quoad sedem huius morbi, quae non convenit cum
eius scala affinitatis, non iure a BOERHAAVIO dissen-
tire Noster monstrat. Contagium enim venereum
in tunica cellulosa vel pinguedine adiposa vel mucositate
subpingui irretitur, et sic partibus corporis variis
adhaerens illas erodit, vi contagiosa, prolifera
omnia corrumpit, dum quaelibet particula infecta
novae infectionis causa evadit. Species quidem
acrimoniae venereae non satis est definita hactenus;
omnes tamen partes corporis, molles et duras,
internas et externas, eam petere et corrumpere
posse exemplis a Nostro multis confirmatur.

Quibusdam de penis mirabilis fabrica praemissis,
partim ob corpora cavernosa tria, cellularum et
vasorum sanguiferorum multitudinem et nexum ar-
ctum rel., ad gonorrhoeam considerandam venit,
eiusque species varias pertractat: cui dein iungit

similem sexus sequioris morbum, fluorem album, seu gonorrhoeam muliebrem. Cuius varias quoque species hic Noster persequitur.

p. 431. Ophthalmiam veneream quandoque nasci non per metastasin; sed a contagio, oculis ipsis applicato, proficisci, improbabile Nostro non videtur, et exemplo confirmatur. Adolescens consueverat oculos vrina calente mane eluere, id quod et continuabat gonorrhoea virulenta laborans. Subito oriebatur ophthalmia grauis venerea, quae dein cum gonorrhoea simul curata est. Si ergo oculos digitis, qui materiam veneream e pene expresserunt, id quod saepe fit ab eiusmodi aegris, ob leuamen et dolorum lenimen, fricant hi aegri, vel nares fodicant, in periculum et ozaenae, et ophthalmiae venereae incurrunt. Solo itaque attactu materiae gonorrhaicae oculos inflammari posse ex superiori exemplo patet.

p. 448. Carunculae, verrucae, aliae atque aliae excrementariae, in vrethra et viciniis, post gonorrhoeam non adeo frequentes, vt vulgo creditur, hic a Nostro considerantur. Varie sentiunt de his Auctores. Quapropter variae ad illas extirpandas occurrunt methodi. Inprimis hic candelulae, seu cerei IACOBI DARAN, in censum veniunt. Alii maluerunt vapores crudi argenti viui, ope infundibuli, in vrethram immittere, iisque praeferunt cereos. Inter quos et SHARPIVS est referendus, qui emplastra ex mercurio crudo adhibuit. Hac occasione et de solutione plumbi *) in vesica per argentum vivum, a Cl. DARAN proposita, describitur.

*) V. HEUERMANN'S *vermischte Bemerkungen und Untersuchungen der Arzneywissenschaft, II. Theil*, p. 101. comment. nostr. Vol. XVI. p. 83.

feritur. Denique pauca addit Noster de cereis Cl. GOULARDI *).

De doloribus venereis osteocopis notat Noster, p. 472. eos non augeri ad attactum, imo saepius a valida pressione imminui. Arthritici vero id non ferunt. Quodsi vero ossa in tophos venereos eleuantur du-ros, tactum et venerei non tolerare possunt.

Sincere dicit Noster, quae viderit in hoc mor- p. 475. bo tractando: laudat eos, per quos profecerit, at-que indicat rationes, ob quas nonnullorum cura-tiones relinquat. Atque sunt profecto hic multa in curatione huius morbi notatu digna vel collecta ab aliis, vel a Nostro accurate obseruata, quae le-gisse neminem poenitebit.

De externo per inunctionem et suffitum, et inter- p. 519. no cum et sine saluatione mercurii viui alio atque alio vsu Noster tum agit, efficaciamque huius re-medii in lue venerea domanda considerat; proponit difficultates, quae fecerint, vt cre-deret, argenti viui efficaciam et vim in corpore humano non posse explicari ex eius pondere, et di-uisibilitate solis, sed deberi singulari eius naturae, per experientiam solam tamen clarae, ceterum ob-scurae tribui. Nam aurum e. gr. hydrargyro multo ponderosius, nunquam excitabit saluatio-nem, aliaque metalla eorumque praeparata nihil ef-ficiunt in lue venerea. Praeterea metallica corpo-ra vix agere possunt in corpus humanum, nisi fue-rint prius soluta in menstruis suis, et sic fluida red-dita. Mercurius autem ex sua natura fluidum est, omnesque omnino ideo humores adire potest. Quam ob causam, malleabilitate ipsi deficiente, multi

F 4

credi-

*) V. EIVSD. tr. f. l. effets de préparat. de plomb. etc. comment. nostror. primae decad. supplement. I. p. 113.

crediderunt improprie dici metallum, et appellarunt aquam metallicam. Quae cum ita sint, sufficit medico nouisse, quid agat mercurius, licet modum, quo agat, ignorauerit. Cur rheum aluum moueat, cur opium somnum faciat? et optimi, qui de viribus medicamentorum egerunt, nesciunt.

p. 531. His praemissis et in medio relictis, consideratur a Nostro, qua via, et qua methodo tuto hydrargyrum possit adhiberi in lue. Externam mercurii applicationem ob mala inde sequuta, et a Nostro hic collecta: item ob inconstantiam huius methodi, quoad remedii quantitatem, atque eius effectus reicit Noster, eique praefert saluationem, quam tutam esse expertus est, praeparatis mercurialibus interne datis excitatam, quae in corpore non diutius morantur, quam par est, nec ad varias corporis partes, in quibus mercurius tamen inuentus est post externam applicationem, deponuntur. Inter praeparata mercurialia ab initio mercurium praecipitatum album et mercurium dulcem ter sublimatum prae reliquis elegit, et cum saccharo albo in pulvere aegris exhibuit. Ad saluationem, si opus est, per sudorifera moderandam, commendat diascordium HIERON. FRACASTORII, eiusque compositionem hic tradit: dosin opii in eo definit atque cum eo comparat diascordium FRANC. DE LE BOE SYLVII, aliter compositum.

p. 547. Cum vero Cl. Auctor in morbis difficilibus curandis, circa solutiones metallorum olim multa tentauisset, quoniam putaret, vegetabilium et animalium partes vix non omnes citius vel ferius subigi per vires vasorum et viscerum, ita, vt humoribus omnino assimilentur, tentauit et vitriolum mercurii, sed dilutissimum, seu mercurium sublimatum corrosiuum, quem cum aqua, seu spiritu vini, seu frumenti iisdem cum effectibus commisceri posse

posse putat. Hanc solutionem dici mixturam Swietenianam notum est, licet Cl. Auctor ipse fateatur, se non esse huius inuentorem; tamen eam adhibuit et suavit, aliis quoque medicis, ut LOCHERON Cl. *), insimulque eam externe adhibitam mixturam, quadruplo aquae purae dilutam, laudat in nodis, verrucis exostosisque venereis, felicemque huius remedii externe, lauando adhibiti, usum exemplis confirmat. Saliuatio raro sequitur usum mixturae Swietenianae sic dictae.

Mirum profecto Noster enarrat exemplum, p. 560. quod docet, venereum contagium pertinacissimum, nec optime quibusque remediis cedens, elici posse ex locis corporis, expelli per sudores validis laboribus ruri viuentium, calidoque aere excitatos, dum simul diaeta macilentissima seruetur, et copiosus liquidi soluentis potus sudori aptum vehiculum praebet.

Duplicem porro Noster modum, quo adhibea-
tur decoctum guaiaci, hic proponit. Item laudatur, p. 566.
inprimis ab Anglis decoctum sassaparillae ad luem veneream domandam tam interne, quam externe linteis eo imbutis in vlceribus venereis, et membris inde dolentibus. Cl. STOERCK narrat memorabile exemplum feminae, omnibus remediis frustra contra luem tentatis, solo decocto sassaparillae a lue venerea liberatae **). Nec non hic radicem chinae inter remedia antiuenerica vidimus. Quam sanguinem depurandi habere vim Noster putat, et eodem iure minus pretiosiores radicem bardanae offert.

F 5

Tandem

*) V. EIVSDEM obs. pract. c. luem veneream, epileps. etc. comm. nostr. Vol. XII. p. 32.

**) V. EIVSDEM ann. med. secund. p. 225. comm. nostr. Vol. X. p. 277.

P. 573. Tandem de cicutae, aconiti et lobeliae contra luem venereum vsu Noster agit; quorum autem remediorum virtutem, a nonnullis in lue venerea non frustra tentatam fuisse aliis locis *) iam diximus.

P. 578. Rachitis, morbus Anglicus cum duplicatis articulis, apud Gallos *enfants noués* dictus, perfecta et imperfecta ab aliis nominata, primum a GLISSONIO est descripta. Hepar satis magnum est in rachiticis infantibus, ceteroquin non vitiosum. Non largiuntur omnes medici nouitatem huius morbi. Interim in veterum medicorum monumentis rachitidis descriptionem non adeo obuiam esse asserit Noster. Rachitidem non pro connato morbo habet; GLISSONIVS autem enarrat eiusmodi exemplum. Raro ante nonum aetatis mensem hic morbus accidit. Alii, vt Cl. DUVERNEY, quintum vel sextum statuunt mensem a natiuitate. Lente hic morbus incedit, nec non in initio, vulgo saltem non cito cognoscitur.

P. 604. Pluribus dictum est, soliditatem ossium pendere a terra, debita proportione admista, qua sublata, os mutari in cartilaginem elasticam et flexilem. Atque hoc cadere in rachiticorum ossa omnia phaenomena edocent. Quapropter et BOERHAAVIUS asseruit, cum vis mutandi acescentia in alcalia in corpore humano deficiat, tum ossa, cartilagines, dentes, ligamenta, laxa, debilia, mollia, flexibilia, vti fit in rachiticis, reddi.

p. 607. Cariosi cum nigredine dentes concomitantur rachitidem. Tales aliquot vidit Noster adolescentes, quorum morbus in initio negligentius tractatus

*) v. comm. nostr. Vol. XI. p. 233. p. 237. Vol. XV. p. 525. Vol. XVII. p. 302. it. Vol. XVI. p. 82.

tus fuerat, qui edentuli manserunt tota vita. Laudatur et hic Cl. BVCHNERVS *), qui asseruit in rachitide imperfecta dentes, carie eiectos, septimo anno reparari; in perfecta vero non. Perfecta enim plane nullam admittit curationem ex sententia Cl. BVCHNERI, qui miseram vitam rachiticorum exemplis illustrat. Vidit inprimis miserrimam rachiticam puellam, extremo vitae die adeo tetram ore exspirasse mephitim, a qua sanissimus volucris, cauea, quae puellae vertici perpendicularis imminebat, inclusus, mox enecatus est.

Rachitis itaque lente incipit, progreditur ita, ut p. 611. anni requirantur, antequam corpus destruat. Triplici modo finitur hic morbus: vel enim abit in sanitatem, vel in mortem, vel desinit in morbum alium diuersum a priori, cui tamen, ut causae, originem suam debet. Sic e. gr. gibbosi, nani, curui aut aliter deformes demum fiunt rachitici. In rachiticorum quoque cadaueribus omnes artus manent flexiles, carnes sunt albae, molles, decolores: sanguis est aquosus, valdeque resolutus et, ut Cl. BVCHNERVS **) obseruauit, rutilus.

Quod longe alia curatione, quam iam Noster p. 615. tradit, indigeat rachitis, quam lues venerea, imo, quod illa, quae ad virus venereum extinguendum laudantur, huic morbo minime profint; non videtur lues venerea inter causas rachitidis referri. Curatio rachitidis autem spectatur in elasticitate et robore fibrae laxae et debilis, quibus destituta est fibra rachiticorum, restituendis. Sicciores et inde potius suadentur cibi. Cum causa proxima porro rachit-

*) IO. PETR. BVCHNER diff. inaug. de rachitide perfecta et imperfecta. Argentor. 1754. 4.

**) v. diff. laudat.

rachitidis consistat in cacochymia inerti, mucosa, frigida, vna cum laxa partium firmarum fabrica; prodest aer siccus, calidiusculus, vtpote indoli morbi aduersus.

p. 627. Inter remedia contra rachitidem reperimus quoque ens veneris a BOYLEO descriptum, quod cum decocto sassaparillae et lacte muliebri si detur, laudatur: et Cl. BOERHAAVIUS flores salis ammoniaci martiales aequae efficaces iudicat, atque ens veneris. Noster cum fructu est usus in hoc morbo tintura vitrioli martis aurea.

p. 635. Praemissis editionis Boerhaauianae varietatibus, cum prima et secunda non habeat capita de rachitide, et rheumatismo; ad rheumatismi considerationem sese Noster accingit. Huius nomen rarius occurrit apud veteres medicos; videntur tamen illuminatis cognouisse, et sub arthritidis nomine descripsisse. Rheumatismus dicitur agnatus arthritidi, podagrae et scorbuto. Item nominatur et arthritidis vaga rheumatismus. Plura hoc de morbo reperiuntur in SYDENHAMO.

p. 645. Testatur PIETRO CORNACCHINI, se vidisse in rheumatismis chronicis efflorescentiam salinam cutaneam. Experientia enim constat, vrinam rheumaticorum habere trigessimam modo partem materiae salinae, quae vrinae sanorum inesse alias solet. De crusta sanguinis in rheumaticis et arthriticis morbis legitur apud Cl. STOECK *), qui febris continuae arthriticae et rheumaticae symptomata et curam diligenter est persequutus. Tres aegros quoque, materia rheumatica ad interiora delata, periisse IDEM narrat, maximamque saepenumero

*) v. EIVSDEM ann. medic. sec. p. 112. comm. nostr. Vol. X. p. 274.

mero adesse difficultatem morbum detegendi, si cerebrum et pulmones occupat, Noster in sequentibus edocet.

Notatu dignum exemplum tradidit Cl. STOERCK *), p. 656. ex quo appareat, consortium febris intermittentis cum rheumatismo quandoque contingere. Ad tumorem et ruborem partis, rheumatismo laborantis, quod attinet, meminit Noster videre se articulum quendam, acerrimo dolore rheumatico affictum, sed non tumentem; cum postea in alium articulum migrabat malum, locus, prius affectus, subrubeilo rubore apparebat tumidus, insimulque ibidem dolor leniebatur. Id quod et SYDENHAMVS notauit. Rheumatismus porro ex sua natura non habet illos periodicos itus et reditus, vti in podagra et arthritide obseruatur. Sunt, qui subito frigore admissio corpori calefacto, rheumatismum semel passi fuerint, nec, cauta refrigerii huius frequentissima rheumatismi causa, rheumatismus rediit. Huius morbi sedes non cernitur solummodo in articulis, sed et musculis illosque tegentibus membranis, nec non in membranis, neruos tegentibus. Quod si itaque ille morbus in articulo quodam duret, augeaturque; turbabitur naturalis secretio muci naturalis: porro et excretio olei medullofi in cauum articuli: indeque saepe redditur totus articulus prorsus immobilis. Eiusmodi exempla Noster enarrat de rheumatismo in spina dorsi, vbi flexo corpore, quod plane non poterat erigi, per totam vitam incedere oportuit miseros aegros. Alia et alia, huc pertinentia Cl. SYDENHAMVS potissimum in agricolis, commemorat exempla. Eadem et Noster expertus est, quae Cl. SYDENHAMVS de rheumatismo et scorbuto exhibet.

An

*) vid. l. c.

- p. 661. An rheumatismus absolute nunquam in suppurationem abire possit, quaeritur; sed satis certo constat, raro hoc contingere: Cl. TISSOT *) tale exemplum enarrat. Inprimis talis error Nostro metuendus videtur in ischiade, ne abscessum comitantes dolores pro rheumatismi cruciatibus habeantur.
- p. 665. De vtilitate venaesectionis in cura rheumatismi quamuis satis conueniant medici; tamen prudentia hic opus esse videtur Nostro, pro morbi diuersitate et aegri constitutione. Id quod et SYDENHAMVS, qui quater venam secare in rheumatismo suadet, arbitratus est.
- p. 671. Meminit Cl. Auctor, se lumbaginem rheumaticam molestissimam, variis methodis tentatam frustra, curare cum vapore calido, per tubum ad locum affectum, ex infuso thymi satis diluto mediae horae spatio: dein per quartam partem horae frictione. Nec vesicatoria hic sunt spernenda. Interdum enim rheumatismus terminatur per metastasin materiae acris ad crura, quae vesicas eleuat, aperte in vlcera degenerantes; quae non cito claudi debent quoniam facile redeunt rheumatici dolores. Natura ipsa itaque videtur Nostro indicare vesicatoria in hoc morbo, nec non alia irritantia, vt sinapismos, imo cauteria et moxam hic conducere. Cl. STOERCKII curationibus rheumatismi cum cicuta, aconito e. f. p. hic commemorandis, cum iam de iis dictum sit, supersedemus.
- p. 679. Suadent in rheumatismo diluentia et emollientia, addito nitro. Noster largo nitri vsui in morbis acutis inflammatoriis indulgit, cum magna diluentium copia. Dedit nitri inter viginti quatuor horas sex drachmas saepius; nec timuit de vi eius frigefaciente

*) Avis au peuple sur sa santé, chap. IX. comm. nostr. Vol. XII. p. 546.

faciente, cum certo sciret, illam vim tantum obtinere illo tempore, quando nitrum soluitur; evanescere satis cito, nitro soluto. Talis methodus non tentanda est, nisi incipiente rheumatismo inflammatorio.

Si rheumatismus coxae ac vicinorum regionem p. 682. occupat, nuncupatur ischias. Cuius curatio difficilior est, indeque pendet etiam curationis huius diversitas. Egit hac de re imprimis Cl. COTTUNIVS *), quem et Noster laudat.

Sequitur nunc index Auctorum et rerum. Finem autem huic libro imponit materia medica et remediorum formulae, quae serviant his aphorismis Boerhaavianis.

*) vid. EIVSDEM commentar. de ischiade nervosa, Vienn. 1770. 8. commentar. nostr. Vol. XVIII. p. 125.

IX.

IOSEPHI QV ARIN, Sacrae Caes. Reg. Apost. Mai. Inf. Austr. Regim. Consil. Sanitat. et in nosoc. fratr. miseric. physici, methodus medendarum febrium. Vindobonae, apud Rudolphum Graeffer, 1772. 8. pagg. 158. sine dedicatione, praefatione et indice capitum.

Ex praefatione intelleximus, per viginti annos Cl. QV ARIN observasse morbos, atque febres feliciter curasse: quibus potissimum hunc librum dicat, proximeque se de morbis inflammatoriis et chronicis esse eodem modo scripturum. Hic hoc ordine febres persequitur Noster, ut primum de febribus in genere agat, dein synochum non putrem, febrem ardentem, putridam, malignam, miliarem, petechias, variolas, morbillos, erysipelas, scarlatinam et postremo febres intermittentes consideret. Finem imponunt huic tractatui formulae.

p. 2. Abit febris, quae est celerior sanguinis motus cum laesione functionis, vel in sanitatem, vel in alium morbum, vel in mortem. Hinc nonnunquam mitiganda, interdum augenda, non raro sibi relinquenda. Febres sunt epidemicae, endemicae sporadicae et topicae. Exempli loco sit haemitritaea.

p. 6. Itaque a Nostro traduntur febres haemitritaeae seu semitertianae, quo nomine CELSVS febres tertianas simplices et duplicatas vocat, quae, paroxysmis admodum productis, continuas remittentes referunt. GALENVS haemitritaeam appellat

pellat febrim, ex quotidiana protracta et tertiana intermittente factam. Denique febris continua, cum tertiana sociata, a quibusdam ad haemitritaeas refer-
tur; quam vero alii rectius tritaeam, seu tritaeophiam nominant.

Quam diu vero pulsus satis durus est, etiam- p. 26.
si venaesectiones sint institutae, primae viae purgatae et vires admodum prostratae, cortex in febre ardente non prodest, imo morbum auge-
t. Opii actio similis est ac vini, quod certe nemo in arte peritus suadebit in motibus in-
flammatoriis ac omnino ferociori naturae impetu. Quapropter reiicit cum Cll. HOFFMANN, GORTER et PRINGLE opium, vigiliis, quae perse-
verantes crebrius leue inflammationis initium in encephalo notant, accedentibus ad febrem arden-
tem. Opium enim facile augeat hoc delirium, quo-
niam, eo sumto, humores ad caput feruntur. Cri-
sis in febre ardente est varia: per haemorrhagias
narium, aluum, sudorem, parotides et quandoque
haemorrhoides. Urina cum sedimento lateritio
potius pro crisis nuncio, quam critica euacuatione
habenda. Quo enim sedimenti citior et diuturnior
depositio, eo perfectior crisis. Febris ardens raro
vel nunquam soluitur rigore solo.

Laudatur contra nimiam diarrhoeam radix sa- p. 33.
lep, sed tuto substitui potest orchis morio Ill.
LINNAEI, ob gelatinosas eius partes. Laete cre-
scit orchis in Austria. Prodest et in diarrhoea in-
fusum ex floribus rhoeados et sambuci ficcis, quo-
niam recentes sambuci purgant.

Non raro sputa copiosa post febres ardentes p. 37.
corpora ita exhauriunt, vt respiratio ad motum dif-
ficilior cum purulentis sputis notetur. Equitatio,
aura ruralis, decoctum ex cortice et lichene Islan-

dico, interposito lactis usu, profunt. Sudores nimios post ardentes febres compescit infusum salviae aquosum et vinosum. Quod si vero aestum nimium excitet, cortex cum acidis mineralibus exhibetur a Nostro.

p. 52. Spiritum vitrioli omninoque acida mineralia praescribit Noster in febribus putridis vel ad gratiam, vel ad fortiores acores, ridetque eos medicos, qui decem vel quindecim spiritus vitrioli guttas librae vni aut alteri aquae admisceant. Porro hic praefert sinapismos vesicatoriis, quoniam a cantharidibus putredo augetur; eaeque nocent in magno humorum motu, testantibus Cll. VALCARENGHI et PRINGLE. Quod si vero malum nervis potius, quam sanguini inhaereat, tum vesicatoria indicantur, ac plura quidem et repetitis vicibus. Ita enim symptomata, non raro ab usu cantharidum orta, evitantur. In constitutione epidemica plurima loca vesicatoriorum fiebant gangraenosa. Hic Noster laudat inter alia et chinam chinam cum digestivis externe, potensque remedium antisepticum iudicat eam, cum alumine externe applicatam.

p. 57. Quamquam Cl. Auctor nec Cl. HOFFMANNUS, nec aliis fidem denegat, neque eorum observata de camphora, in larga dosi in dubium vocat; tamen fatetur, se nunquam ultra decem quindecim, ad summum viginti grana per nyctemerum praescripsisse. Observavit enim ex maiori dosi camphorae letalia symptomata, ut phrenitidem, convulsiones cet.

p. 72. Venaesectio in maligna febre nocet pessime, nec clysmatibus in hoc morbo locus est. Potiora hic sunt ut plurimum vesicantia, raro duo sufficiunt.

In

In magno sopore vtiliter nuchae applicantur. Diluentia aquosa sola non iuuant, sed, quae stimulant et lentorem, neruis inhaerentem, corrigunt, vt infusum menthae et florum sambuci. Incerta est ad mortem et ad sanitatem dies. Signa bona sunt maior pulsus impetus et robur, vrina magis tineta, caput liberius. Interdum sine notabiliore euacuatione terminatur hic morbus. Diarrhoea in febre maligna rarissime est critica. Haemorrhagia quoque hic periculosissima est.

Reprehenduntur ii, qui, cum in miliaribus p. 81. odor vappidi aceti attendatur, absorbentia exhibeant, acidiusculorumque et acidorum vsum plane interdican. Cadauera enim eorum, qui miliaribus perierunt, cito intolerabiliter foetent et intumescunt. Ergo putredini resistendum est. Retrogressis miliaribus, id quod saepe et facile contingit, inter alia maligna symptomata conuulsiones occurrunt, quibus nullum efficacius cum Cl. НУХНМО opponere potest Noster remedium, quam moschum, qui sine magno calore miliaria ad cutim deriuat, et aequalem, blandum et lenientem sudorem, quem tranquillus excipit somnus, excitat.

Petechiae raro pedes occupant. Si in facie apparent, periculo sunt pleniores. Oriuntur saepius ex primis viis, non sufficienter depuratis. Rarissime petechiae cum leuamine cernuntur. Cl. SWIETEN et STOERCK autem criticarum petechiarum exempla enarrarunt. Frequentissime petechiae superueniunt feбри putridae, rarius malignae, rarissime inflammatoriae. Quapropter quoque febris et primarum viarum ratio dirigit petechiarum curam.

p. 90. Variolae epidemicae vernali tempore ingrediuntur, aestate maxime grassantur, minuuntur autumnō et vix hyeme occurrunt. Sunt malignae et benignae. Sunt et variolae, verrucarum formam habentes, nec suppurantes, sed exsiccatione fere vna terminantur. Periculosissimas iudicat Noster crystallinas, quarum pustulae ichorea et glutinea materia repletae sunt. Adultis et stricta fibra praeditis suadet Noster serum lactis cum spiritu vitrioli, ad fortiorem acorem paratum, eiusque remedii utilitatem laudat. Tentata est Viennae insitio variolarum cum felicissimo euentu. Eius arcanum a Nostro cum Cl. TRISSOT in eo cernitur, quod variolosum virus indatur corpori, omni rigiditate, laxitate, debilitate, obstructione, cacochymia, viru, omni labe vacuo; breuiter corpori sano, sed non atletico.

p. 101. Morbilli regulares quarta die prodeunt, vt maculae paruae, pulicum morsibus similes. Symptoma, quod maxime aegros turbat, est tussis, quam, si sicca est, inspiratio vaporis aquae calidae iuuat. Vbi morbilli pallefcunt et exsiccantur, sunt purgantia antiphlogistica exhibenda. Cauendum etiam est, ne aegri luci exponantur ob oculos illachrymantes, morbillis superuenientes. Oculorum enim labem et pectoris morbos cum tussi facile relinquunt morbilli.

p. 109. Erysipelas in vlceratum, et non vlceratum diuiditur. Stibium diaphoreticum non ablutum commendat, illudque abluto multum praefert. Externe saturnina in erysipelate, cum Cl. BRAMBILLA *) non commendat; sed caute hic cum externis reme-

*) v. EIVSD. riflessione fisico-medico-chirurgiche. In Milano, 1769. 4. p. 24.

remediis versandum esse monet, quoniam facile, vt oleosa, pingua resinosaque, erysipelate retrocedente, gangraenae aliisque incommodis seruiunt.

Scarlatina est frequentior exeunte aestate, et iunioribus familiarior. Diuiditur in sporadicam et epidemicam, malignam et benignam: circa aequinoctium vernale frequens et contagiosa cernitur scarlatina. Vberius eas descripsit Cl. PLENCIZ*). Non raro post fugatam scarlatinam valentes viribus labuntur, et leucophlegmatici fiunt, cum lotio, loturae carniū simili, interdum sanguineo, cum et sine febre leucophlegmatica, et nisi tumor leucophlegmaticus saepe per totum corpus cedat remediis, serum ad nobiliores partes fertur aegrique comatosi, conuulsi, apoplectici aut suffocati pereunt. Pauca hic et Noster de febre vrticata differit.

De causa proxima febrium videtur Nostro probabilis sententia Ill. VAN SWIETEN, eam nervis et liquido nerueo inesse. Causae remotae et praedisponentes variae sunt. In frigore febrili tepida Noster suadet, vt infusum florum sambuci, decoctum quinque radicum aperientium, ad transpirationem promouendam. Autumnales febres potius purgantia ferunt, quam vernales. Vernales in sanguineis facile in inflammatorias mutantur. Quapropter tum opus est venae sectione. Sed et in autumnalibus vena est secanda, vrgentibus symptomatis. Varia dosis corticis Peruuiani est in febribus. In quotidiana sex drachmae, in tertiana vncia, in quartana vncia vna et dimidia tempore apyrexiae dentur. De pessimis malis timet Noster ex intempestiuo laudati remedii usu.

G 3

Inter-

*) EIVSDEM oper. phys. med. Tom. III. p. I comm. nostr. Vol. XV. p. 137.

p. 134. Interdum febres intermittentes pleuritidem, choleram apoplexiamque mentiuntur, quae, redeuntibus grauibus symptomatis, subito cortice Peruviano sunt debellandae. Conueniunt et opiata cum cortice in febre, a terrore, et animi pathematibus profecta, potissimum in hystericis et hypochondriacis.

p. 141. Visceribus chylopoëis laesis, frictiones, ieiuno homine, per totum abdomen pannis asperis laneis mirabiles praestiterunt effectus, inprimis fumo accensi succini, massichis cet. addito. Id quod et b. VAN SWIETEN probat. Pertinent et huc inunctiones cum vnguento de althaea etc. in obstructionibus infimi ventris, febres intermittentes comitantibus, vti supra a Nostro est commemoratum.

Aduërsaria medico practica. Voluminis II.
Pars I. II. III. IV. Lips. 1771 et 1772. 8.
c. fig. pl. 48.

Indicamus nunc alterum volumen huius continuati operis, cuius instituti rationem reddidimus, cum primi voluminis summam breuiter traderemus *).

Prima pars continet sequentia:

P. I.

1) *Observationes de materiae arthriticae euolutione.* Monuit b. LVDWIG, se, dum in horum aduersariorum primo volumine **) de euolutionibus corporis animalis in vniuersum, et speciatim de morbosus ageret, non, nisi generalem euolutionis ideam, delineasse, et ad veram euolutionum indolem definiendam omnino necesse esse, vt specialius examen instituatur, varia euolutionis exempla in phaenomenis tradantur, inter se comparentur indeque vltterius definiantur. Quapropter secum constituit, selectas doctrinas, euolutionum ideam illustrantes, easque euidentes sub examen vocare. Ac ad primum huius doctrinae specimen edendum selegit Noster arthriticum morbum, cuius indoles in mixtione materiae morbosae, admodum obscura est, cum fixa sit atque volatilis, aliis atque aliis caussis gignatur, et contagio haereditateque propagetur. Differentiae enim huius morbi profecto cernuntur in morbi arthritici genesi eiusque varia euolutione, et habituali tandem confirmatione: indeque varietas symptomatum, huic morbo superuenientium, pendet.

p. 3.

G 4

Agit

*) v. comm. nostr. vol. XVII. p. 488.

**) v. ibid. p. 502.

- p. 5. Agit igitur b. LUDWIG primum de morbo, per varias generationes mutato: dein de morbo arthritico latente, sub varia febrium specie moto et euoluto, atque ita ut plurimum exitioso: rursus de materia arthritica, in senectute imperfecte mota, et sub varia symptomatum serie tandem vita misere finita.
- p. 6. Progredimur ita cum Nostro ad arthriticos morbos, per successivas generationes mutatos. Pater podagricus progenuit duos filios, nimis molliter a matre educatos, vino et veneri praematurae deditos. Natu maior sine prole et in flore aetatis defuit rebus humanis interesse, morbo Cl. Auctori non satis noto. Natu minor quiete, somno ac vino usque ad ebrietatem, ter saepe de die expertam ac toties somno discussam, delectatus, variis podagricis insultibus diuexabatur, et quadragesimo aetatis anno apoplexia ita tangebatur, ut paralytis insanabilis superesset. Hic ex duplici matrimonio filium et filiam reliquit. In hac vestigia morbi arthritici non desunt, et in senectute, quam adeptus est, eadem sentit; ille vero ex podagra mota et retrocessa optima aetate non diu post celebratas nuptias obiit.
- p. 11. Feminae rarius quidem podagra quamquam laborant, nec vera morbi continuatio a matre ad liberos propagata Nostro constat; tamen feminae reminiscitur, et sexagesimo sexto circiter aetatis anno adhuc podagra et imprimis chiragra nodosa affectae, cuius liberi, ante morbi ingressum nati, vegeti et sani, post accessum autem morbi parti, sine vestigio quidem mali arthritici erant, imbecilles tamen a puero inter vicesimum et trigesimum annum obibant.
- p. 12. Morborum arthriticorum effectus quiescere, vel ad tempus suppressi et latere, tandem tamen ex improviso saepenumero euolui, et subitanam mor-

mortem inducere probat b. LUDWIG duobus exemplis, in quibus materia morbi arthritici latens nullo modo cognita esset. Alius post initum matrimonium febre continua, catarrhali simili, laborare videbatur; alius febre intermittente tertiana. Ambo autem ex materia arthritica teſta, subito euoluta et ad partes nobiliores delata, sub variis febrilibus motibus, quorum summam attentionem suadet Noster in his morbis arthriticis, mortui sunt.

Qua occasione etiam Cl. Auctor obiter monet, p. 17. matrimonia senum, arthritico morbo affectorum, et in moderato usu veneris arthriticos insultus graviores ac breui exitiosos reddere.

Progreditur Noster ad arthriticos morbos im- p. 22. perfecte motos, et sub insigni symptomatum varietate exitiosos. Vir ut plurimum sub catarrhalium affectuum specie patiebatur arthriticos dolores. Vagas enim praeter tensiones, in primis crurum lassitudinem et immobilitatem, nihil habebat, de quo conqueretur. Paulo post herpete, cachexia, totius corporis inertia et aliis atque aliis symptomatibus, sine vero insulto arthritico viribus exhaustus et languidus periit.

Alius, mercaturae deditus, et idcirco itineribus p. 26. saepe defatigatus, interea satis validos insultus arthriticos patiebatur. Post annum autem quinquagesimum quartum quieti, cui sese dicaerat, atque diaetae ordinatae adscripsit, quod per decennium nulla arthritica incommoda percepisset. Bene enim interea valuit; iracundia tamen facile poterat commoueri, usque ad sexagesimum fere annum, quo de variis catarrhalibus affectibus conquerebatur: quibus et medicus occurrebat, nihil cogitans de causa praedisponente arthritica. Accedentibus variis symptomatibus, languoribus sine febre, noctibus inquietis, subitaneis sensuum obnubilationibus,

bus, scintillantibus radiis, oculum agitantibus, aliisque, b. L V D W I G consilium exigebatur. Qui, in scrutinio caussarum versatus, respexit ad materiam arthriticam antea praesentem, nunc latentem, eique methodum medendi accommodabat. Nihilominus redibant symptomata capiti molesta, inter quae vnum ab aegro ita describebatur: non flamma est, sed sensus halituosi calidi, quale ex prunis vehementer incandescentibus surgeret, qui ex abdomine per pectus ad caput vniuersum ascenderet, nec nisi quiete in lectulo, et oculis, sine somno clausis, et liquore cornu cerui succinato supprimi posset. Atque ita misere et anxie vixit, et vires morbo, et senio prostratae, nullos motus regulares permittebant. Interea autem calculos ducebat, suisque negotiis intererat vsque ad annum sexagesimum octauum, quo languidissimus lectulo detinebatur, nec amplius nutrimenta concoquere poterat. Lenta autem mors et minus tranquilla continuis tensionibus cum in vniuerso corpore, tum in capite imprimis et incompletis conuulsivis motibus vitam per plures annos traxit. Tandem clamores tristes tantum emittebat, interdum eiulabat, nec placide ita exspirabat.

p. 29. Ex sequenti exemplo patet, vlcera crurum materiae podagricae vim suppressere.

p. 39. In senibus lenti et imperfecte moti morbi arthritici pariter occurrunt, quibus alias podagra regularis sanitatis optimum praesidium, atque longaeuitatis causa censetur. Vidit Noster senem, qui diaeta ordinata ad septuagesimum secundum annum peruenisset, sub regularibus et annuis prope modum podagricis insultibus, tandem autem morbo lento, ex incompletis crebrioribus podagricis paroxysmis nato, anno septuagesimo octauo aetatis succubuit.

Com-

Commemoratis adhuc aliis exemplis suppressae p. 44.
 materiae arthriticae in senili aetate, addit b. LUDWIG exemplum excitatae in senē. Cum enim virum, ex haereditate arthriticum, accedente septuagesimo secundo anno, imbecilliores ac antea quidem, attamen crebriores pati oportebat insultus arthriticos, medicus dissuadebat vini potum. A quo postquam aeger prorsus abstinebat, paroxysmi leviores quidem, sed vires vitae imbecilliores reddebantur. Aduocatus tum b. LUDWIG vini optimi moderatum usum ei concedebat, inde dolores arthritici acerbiores facti sunt. Pertaesus autem huius remedii, dolores augmentis, rursus a vino abstinuit et insultu apoplectico, a materia arthritica, ad caput delata, ex hac vita discessit. Quapropter Nostro videtur tutius, analepticum vini haustum, ut lac fenum, iis propinare, et dolores subinde excitatos patienter ferre, nec diaeta strictissima paroxysmos imminuere. Morbus enim nihilominus ita supprimitur.

2) *Oratio de neglectu contemplationis naturae*, p. 46.
caussa neglectae medicinae, mense maio 1768. in solemni doctoris inauguratione recitata. Enarratis causis, quae impediunt naturae contemplationem, atque in vita varia hominum et imprimis educatione non semper probanda potissimum cernantur, b. LUDWIG ex neglecta naturae contemplatione, neglectum medicinae derivat, idque ipsum ex methodo discendae medicinae, ratione eius faciendae et tandem cultura, a variis inuentoribus et professoribus suscepta, declarat.

Neminem Noster ad studia seueriora, et disci- p. 52.
 plinas altiores addiscendas aptum iudicat, nisi ingenio ad res naturales contemplandas instructum, in quo omnis omnino doctrinae initia posita sunt.
 Ita

Ita enim tiro medicus grata rerum varietate, quas offert scientia physico mathematica, historia naturalis, anatome, chemia, et quae porro ad medicinam recte colendam, faciendam et docendam scitu sunt necessaria, saepeque a discentibus pariter ac docentibus negliguntur, facile allicitur. Sed quam saepe educatio, opiniones, hypotheses amorque singularis in hanc vel illam medicinae partem discentium et docentium impediunt rerum naturalium contemplationem, iisque neglectis, neglectum medicinae infimul inducunt!

p. 58. Quemadmodum igitur in illustribus nonnullis academiis nullus ad altiores disciplinas admittebatur, nisi ex scholis philosophorum tentamine rite instituto dimissus esset: sic nemini ad medicorum scholas aditus largiretur, nisi, qui in vera naturae contemplatione versatus esset. Ita quidem pauciores forte medici dimitterentur, tales tamen, quales in vera systematis medici, ad naturae ductum compositi, consideratione confirmati essent.

p. 69. 3) *De fallaci iudicio vulgi super vi imaginationis maternae in fetum observata quaedam **). Cum de vi imaginationis maternae in fetum, cui vulgo omnes deformitates et laesiones fetus adscribunt, alio atque alio modo eruditi **) sentiant, atque dubitent, b. L V D W I G nec in affirmatiuam, nec in negatiuam sententiam transiens, iudicium suum hac de re potius suspendit, atque hic observata tantum quaedam proponit, ex quibus elucet, esse quasdam corpusculi embryonis mutationes, quae, etiamsi imaginationi maternae adscribi soleant, nihilominus

*) Est prolusio academica 1759 edita, passim aucta.

**) v. comm. nostr. Vol. VI. p. 455.

hilominus tamen ab ea non repeti posse videantur: ideoque parum imaginationi maternae tribuitur.

Grauida, cum viscera gallinae semiextracta ex p. 72. abdomine vidisset, horrore perculsa fetum edebat, cuius intestina circa vmbilicalem regionem nuda quasi conspicerentur. Atque, praeter eam abdominalium integumentorum partem, quae circa vmbilicum ad duos pollices extensa, adeoque flaccida et attenuata, tenuis et pellucida apparebat, vt viscera abdominalia inprimis intestinorum tenuium gyri in vmbilicali regione transparent, omnes embryonis partes naturali modo dispositae inueniebantur. Viscera, praeter flacciditatem, quae ab imbecillitate minusque iusta nutritione proficiscatur, nullam praeternaturalem prae se ferebant mutationem. Ex his itaque patet, imaginationis maternae vim, si fuisset, viscera nullo modo agitalle, sed defectum solummodo nutritionis in vasis, versus vmbilicum tendentibus, hanc attenuationem integumentorum induxisse, et in simili historia, a Nostro hic narrata, et huic praemissa, idem fortasse euenisse, licet ibi intestina, laesis inuolucris propenderent.

Praeterea mater fetum de reliquo sanum et per p. 75. fectum in lucem edebat, cum tumore obscure rubicundo in osso bregmatis dextro, indubitato ab obstetricis pressione profecto, quo ipso loco mater quarto propemodum grauiditatis mense improuiso, et fortuito casu tacta fuerat baculo. Pariter vero putat b. L V D W I G, hunc tumorem inde non ortum esse, sed vti reliquas maculas (*Feuermähler*) dictas, seu alias atque alias excrescentias ex stasi aliqua cruoris attenuati prouenire, quae saepenumero sponte discutiantur, easque remanere et augeri, inprimis si nimiam remediorum externorum et haud raro irritantium applicationem varie tentant.

His

p. 79.

His subiungit Noster obseruationem, icone illustratam, cum ea defectum partis organicae prae se ferat, non ex imaginatione materna, sed ex denegata ei parti nutritione declarandum. Militis vxor enitebatur infantem ceteroquin sanum, cuius brachium sinistrum ad mediam ferme ossis humeri partem truncatum appareret, integumentis communibus circumcirca productis, nec laesis. Papillae solummodo protuberantias molles integumentorum referebant, nec quidquam, praeter exiguam pinguedinis copiam, iis perquisitis, inueniebatur. Arteria brachialis descendendo ita contracta in oculis Nostri veniebat, vt in attenuatis filamentis euanesceret. Atque ita et reliqua vasa et nerui extenuati euanescebant.

p. 80.

Deltoideus in tenello hoc corpore bene sese habebat, minus vero brachiaeus internus. Coracobrachialis in media parte deficiebat, et in tendineam expansionem sese finiebat, quae cum vicinis partibus coaluerat, et ad latus finis ossei humeri, quasi abrupti, inferebatur. Musculi, teres maior et minor, nullam prodebant praeternaturalem insertionem. Antequam vero tertia pars tricipitis vere sibi vniri posset, in tendinem euanescebat, et fini humeri quasi truncati annectebatur. Os humeri superius non mutatum erat; descendendo autem attenuatum, cuius iam media pars in duo tubercula finiebatur, nulla cartilagine superinducta, sed quodammodo aspera. Multi hanc deformitatem adscribebant grauidae imaginationi, quae amputationi brachii in milite quodam administratae, durante grauiditate, interesse dicebatur. Sed mater hoc negabat non solum, sed nec vllam aliam quoque huius deformitatis causam commemorare poterat. En dubiam vim maternae imaginationis in fetum!

Tum

Tum exemplum enarratur iuuenis viginti anno- p. 83.
rum, mutilatis extremitatibus vtrisque nati, ea-
rumque exiguo motu, qui curiosorum oculis a pa-
rentibus, hic Lipsiae monstrabatur, et ex pago
Latobrico (*Kletgau*), in Sueuia sito erat. Nomen
eius erat *Ioannes Heß*: cuius mater, durante gra-
viditate terroris seu imaginationis laesae causam
ignoravit. Denique addit de animalium brutorum
mutationibus quaedam.

4) *Melancholico maniacorum et epilepticorum* p. 90.
quorundam, in ptochotropheo Waldheimensi demortuo-
rum, sectiones tradit IOANNES ERNESTVS GRE-
DING. Diuidit Cl. Auctor has commentationes
in duas partes, historicam nimirum et anatomi-
cam atque eadem ratione in his ipsis aduersa-
riis subinde communicat. Quod si vero rela-
tiones de morbis, minus perfectae irrepperint, hoc
tribuendum est imbecillitati mentis aegrorum, qui
saepe confuse, imo prorsus non ad quaestiones re-
spondere poterant. Posteriores autem huius tra-
ctationis partem in tres sectiones distribuit Cl.
Auctor, atque in prima ea, quae in calua, meningi-
bus et encephalo: in secunda ea, quae in pectoris
cavitate, praecipue ratione pulmonum et cordis,
et in tertia tandem sectione ea, quae in imo ventre
eiusque visceribus proposuit.

Omnes vero aegros, de quorum morbis in hi. p. 92.
storica parte hic et in sequentibus refertur, No-
ster digessit in quatuor classes, quarum prima de
melancholico maniacis, secunda de singulari et con-
nata ut plurimum mentis imbecillitate laboranti-
bus, stupidis fatuisque, tertia de epilepticis, et de-
nique quarta de epileptico maniacis agit. Pluribus
enim subdivisionibus iure Noster supersedere arbi-
tratur.

Primam

p. 93. Primam classem dispescuit in duas sectiones, quarum prima eos complectitur, qui aliquo modo ante mortem resipuerunt: altera, qui nunquam. Similesque aegros, ut meticulosos, desperantes, superbientes, voluptuosos, fanaticos cet.

p. 149. 5) *De morborum imprimis exanthematicorum successione observationes.* Attendisse iam medicos ad has successiones primum, easque saepe a minus idonea medendi ratione pendere, iisque nec rarius eruditos medicos ex negligenti contraindicationum consideratione occasionem dare: item ex aegri regimine, morbo superato, minus iusto, proficisci monstratur. Dein respicit Noster non pariter ad recidivas solas, ut fieri solet ab intermittentibus febribus, ac potius ad novos morbos, a prioribus diversos, quorum genesis saepissime in lentis febribus, alia atque alia ratione corpus afficientibus, cernitur. Ac hoc potissimum hic b. LUDWIG observationes volunt, ex quibus nimirum apparet, etiam ex ipsa morbi, et materiae morbosae indole successivam evolutionem novorum morborum, prioribus saepe grauiorum, oriri.

p. 156. Quamquam itaque hae observationes exanthematicas potissimum febres spectant; tamen ex instituti ratione Nostro a scabie ordiendum est, quae intempestive repressa, innumeros morbos chronicos producit, et causa est variorum morborum succedentium. Exemplo febris peculiaris et tandem exitiosae, a scabie repressa ortae, a Cl. Auctore memorato, varia alia scabiei succedentia exanthemata

p. 160. enarrantur. Nobilis iuuenis vel scabie vera, vel aliis pustulis laborabat diu, dein hac dyscrasia humorum quodammodo correcta, per aliquot annos bene valuit et ad iustam adolescentis proceritatem accesserat. Postea morbillos et variolas feliciter supera-

superabat; relicta tamen ophthalmia, accuratiori
diaeta et remediis, correctioni lymphae inseruien-
tibus, quoque sublata. Nihilominus tamen paullo
post scarlatina maligna accedebat cum diarrhoea,
deliriis et continuis partium tensionibus et artuum
tremoribus, ab acrimonia subtili, nervis inhaerente,
vt videbatur, deriuandis. Post triduum etiam
erumpebant pustulae miliares albae, adeo copio-
sae, vt corpus quasi totum iis obtegeretur: quae
quoque non recedebant, licet corpus ob continua
deliria maxime inquietum, semper fere denuda-
retur, atque diarrhoea, inscio aegro, continuaret.
Miratus porro saepe est Cl. Auctor, vesicatoria in
corpore tam emaciato, in quo cutis ossibus quasi
adhaerere videbatur, continuam suppurationem
effecisse, quae et post morbum feliciter superatum
continuabat. Summe debilitatus iuuenis dein iusta
diaeta et roborantibus medicinis quoque ad verum
robur virile accessit.

Quapropter quaerit Noster: in hoc iuvene p. 167.
vtrum post variolosum morbum demum noua ma-
teria morbi collecta sit, an aliqua particularum
acrium collectio, a scabie relicta, adfuerit, per mor-
billos et variolas non extricata? Vltimum Noster
arbitratur et probat, insimulque de acrimonia lym-
phae, quatenus vel velamenta neruorum, vel ipsum
fluidum illorum petat, quaedam addit.

Disquirat porro Noster: an non ex successioni- p. 175.
bus morborum, quales in propositis exemplis nunc
demonstrauit, indoles materiae morbi quodammo-
do appareat? Sed, cum mixtio morbosa non ad
sanas humorum elaborationes referri queat, haec
disquisitio Nostro inanis videtur. Rursus de suc-
cessionibus exanthematum dum hic disputatur, tan-
ta obseruationum varietas Nostro est, vt suadeat,

potius ad progressum febris et symptomata, quam ad exanthemata ipsa respici debere.

p. 178. Denique de scarlatina, saepe epidemica, quaedam addit b. LUDWIG monita, quam post alios morbos iam superatos prodiisse vidit. Duo infantes, ad cacochymiam dispositi, variolas benignas patiebantur. Obseruauit itaque partim ob cacochymiam, partim ob variolarum benignitatem, magna cum attentione conualescentiae tempus: et cum his per hyemem vagae cutaneae erosiones cum ophthalmiis molestae essent, strictissimum diaetae regimen iniunxit. Nihilominus tamen, cum scarlatina epidemice grassaretur, hi duo infantes ea corripiebantur aequae grauitate, ac reliqui huius domus liberi. Atque scarlatina vix superata, tumores glandularum colli, congestiones acris humoris ad aures accedebant, tandemque tumores ad parotidem sequebantur. Lymphaticos humores itaque in his singulari acrimonia infectos fuisse, exanthematicisque morbis non raro succedere obstructiones glandularum lymphaticarum, ex hoc exemplo patet.

p. 183. 6) *Obseruatio de abscessibus lacteis in infante post variolas abortis*, Postquam Cl. Auctor de affluxu lactis maiori in macilentis, quam in obesis feminis: de necessitate, qua cogantur feminae, ob morbos, ut purpuram, lacteos abscessus, saepe ex temere denegato infantibus lacte oriundos, ipsae lactare, et de officio lactandi suos infantes, atque de cauta nutricis electione quaedam praemisit: notabile exemplum infantis, abscessus lacteos illustrans, ab Eo enarratur.

p. 185. Infans octimestris copiosis benignis laborabat variolis, et a nutrice nimis copioso lacte nutriebatur, ut, variolis superatis, leuia mannata ipsum lac per aluum

alium subducerent. Accedente dein febre, brachium dextrum intumescebat, et abscessus, ad cubiti articulum latens, detegebatur. Similis tumor in crure dextro cum abscessibus ad malleolum externum et internum. Quibus incisis, materia purulenta tenuis et saniosa cum lactis coagulo emanabat, nullaque inflammatione orta, lacteus hic humor vulneris sanationem impediēbat.

Tum magnus abscessus sub clauicula dextra, et p. 188. sub musculo pectorali formabatur, qui ad pleuram vsque penetrabat, mortemque infantis accelerabat. Noluit quoque mater, vt ille incideretur. Hi abscessus non sub cute, sed profundius ad periostrium generabantur, et praecipue ad loca, articulis vicina. De aliis abscessibus post variolas Noster in superioribus egit *).

Iam ad quaestionem respondetur, vtrum teneri p. 190.
infantes, lac matris et nutricis sugentes, in variolis
vel aliis morbis acutis ablaetari debeant nec ne? In
sexto mense lactationis suadet ablaetationem: no-
lunt autem plerumque matres. Quod si vero hoc
fieri nequeat, nutrix non largo, sed tenui et facile
digerendo victu nutrienda est: nec cereuisia ei lar-
gienda, sed ptisana ex resoluentibus et demulcenti-
bus parata, item liberioris aeris vsu atque motu la-
boreque opus est.

In altera parte haec leguntur.

1) *Commentatio de arthriticis doloribus, ex incremento corporum oriundis*. Vt specimen evolutionum arthriticae materiae supra b. LUDWIG **) dedit:
H 2 fic

*) vid. aduers. medic. pract. Vol. I. p. 499. comment. nostr. Vol. XVII. p. 505.

²²) v. supra, p. 103.

fic hic duo exempla examinat, quorum alterum fuit in puero nouem annorum, ad incrementum corporis ducendo: quod etſi non ita celere, ſed moderatum magis erat; tamen multa incommoda, cum celeri incremento alias coniuncta, oſtendit: alterum in virgine duodeuiginti annorum, in qua corporis incrementum iam abſolutum videbatur, cum illa nihilominus in confirmatione epiphyſium plena, articulorum doloribus mire excrucietur. De his exemplis haec habeto:

p. 198. Filius erat Noſtri, qui in nono aetatis anno varia incommoda ab incremento corporis experiretur. Quae erant, dolor in diaphyſibus et epiphyſibus, dolores capitis poſſimum matutino tempore et ventris, cum alui ſegnitie et vrinae tenuis aquosae excretionē. Obſeruauit praeterea Noſter in filio muſculos in ſomno duriores et tenſos, qui non contracto corpore et membris incuruatis, vti ſolebat, ſed extenſus et quaſi rigidus dormiebat. Inde et explicat languorem, torporem et tenſiones, praefertim matutino tempore, filii poſt ſomnum. His ſymptomatibus intercedebat catarrhalis febris alique, a debilitate oriundi, morbi tranſitorii. Nihilominus tamen, licet aeſtate ſanior videretur, altera hyeme iterum conquerebatur de iisdem incommotis, ſed quodammodo imminutis. Poſtea vero nullus amplius morbus incrementum filii turbauit, et plena adhuc fruitur ſanitate.

p. 210. Morbus virginis huius non erat hereditarius; nihilominus tamen dolor articulorum permanebat, atque vehementior reddebatur, qui catarrhalis videretur: et varia ideo quoque remedia a Noſtro ſunt fruſtra adhibita. Quapropter incidit Noſter in cauſſam celeris incrementi, atque curationem illic direxit cum fruſtu.

Qua

Qua occasione asserit quoque b. LUDWIG, p. 216. plures imbecilles, praesertim praedisponentibus causis ex morbo arthritico transitorio, sed grauiori perpeffo, subsistentibus, et interea occasionalibus accedentibus, ad morbos arthriticos habituales disponi posse. Porro accedunt et causae complicatae, ut vermes, spasmi, quae cum incommodis, ab incremento profectis, sese coniungunt.

Exemplo praeterea vno addito virginis, arthriticis p. 218. doloribus vexatae, pauca de incremento ossium in vniuersum subiungit b. LUDWIG. Dolor in diaphysibus ossium perceptus, incrementum corporum declarat: dum enim ossa cylindrica elongantur, tensiones partium, his iunctarum, et obscurus aliquis in osse ipso sensus, incommodorum causae sunt. Haec potissimum inter annum nonum ad decimum tertium usque percipiuntur, raro citius vel tardius, et tunc aequale plerumque est corporis incrementum. Adolescentibus vero anno duodevicesimo ad vicesimum sunt dolores praecipue ad epiphyses, veris arthriticis doloribus similes, plerumque vagi: coniunctique cum lassitudine corporis et cephalaea, et id genus aliis.

Quapropter de ossibus capitis Noster quoque p. 221. exponit, et rachiticorum simul incrementum commemorat. Lassitudo non solum in externis partibus percipitur, sed in ossium medullis, illeque ipse sensus dolor vere osteocopus dici meretur.

His praemissis, curam aegrorum in doloribus, p. 223. cum corporis incremento coniunctis, Noster persequitur. Atque haec cernitur in diaeteticis potius, quam pharmaceuticis remediis. Resoluentia non ferunt hi aegri, euacuantiaque, nisi prudenter electa, nocent. Roborantia summe necessaria quidem videntur; attamen, cum iis siccandi vis sit

propria, et hic magna opus est circumspectione. Quapropter accuratioris diaetae commendatio in his morbis non spernenda est, cui analeptica tantum iulapia a medico sunt iungenda.

p. 229. Balneorum moderate frigidorum vel scoriis additis, magnus quidem est usus in his morbis; attamen, cum liberiori aeri aegros exponere eosque sufficienti nutritione reficere possumus. Alias vis roborans balneorum pariter nocet, atque interna roborantia medicamenta.

p. 231. 2) *Oratio de maiore propensione medici empirici ad hypotheses, quam dogmatici; mense maio 1768. in solenni doctoris inauguratione recitata.* Contemplatione vniuersae rerum naturae qui tenentur, ortum, incrementum et interitum corporum cognoscere possunt, modo desidia ac negligentia indagatores non deterreat et arceat. Et hanc contemplationem vniuersi sequi oportet medicos in singulari hominis natura disquirenda. Et haec naturae contemplatio medica et discendae, et faciendae, ac denique colendae scientiae medicae vna et certa est via. Attamen, cum doctrinae physicae veritatem amantes saepenumero ab hypothesebus perturbentur, dogmaticos magis esse hypothesis amicos, quam empiricos autumant. Id quod Noster refutat, systematisque medici vtilitatem, et hac in re commonstrat. Cuius ope non solum initia doctrinae medicae discuntur; sed etiam ad vias naturae, in mutationibus morborum et effectibus medicamentorum recte obseruandas, ducuntur medici rationales.

p. 253. 3) *De luxatione vertebrarum colli, a medico forensi circumspecte disquirenda **). Narrantur hic a
b. LVD-

*) Est prolusio academica Lipsiae a. 1767. 4 proposita.

b. LUDWIG tria exempla, et diiudicantur eadem variis monitis additis. Ac primum quidem complectitur subluxationem vertebrae colli secundae, a secantibus, ut causa mortis propositam, sectione vero legali non satis declaratam. Erat autem potius paraplegia partium, sub capite positarum.

Secunda disquisitio pertinet ad luctum fratrum, p. 258. inter quam vnus ex iis subito vita priuatus est. Quaesitum itaque est, vtrum mors ex apoplexia, internis causis adscribenda; an vero ex subluxatione, ad quartam, quae trium linearum distantiam secesserat a tertia, colli vertebra notata, orta esset? Et, si hoc euenerit, vtrum haec subluxatio violentiae trahentis, an renisui tracti et in lucta mortui fratris adscribenda esset? Mors autem haec adscribatur apoplexiae.

Tertio in exemplo vertebrae primae, uti referebatur, satis nimis deductae a secunda, luxatio et apoplexia inde orta, causa mortis, sed falso, creditur. Mortuus vero et hic est ex alia causa, ex refrigerio nempe, cui sudans aeger, febre catarrhali epidemica laborans, imprudenter expositus fuerat.

Quam ob causam luxatio et subluxatio vertebrarum colli a medico forensi circumspecte est disquirenda. Cuius disquisitionis modum hic b. LUDWIG tradit. Nos vero, saluis breuitatis legibus, hoc vnum hic addere possumus, quod attinet firmam adhaesionem vertebrae primae ad os occipitis, et hiatum posteriorem naturalem inter primam et secundam vertebra, qui ob motum lateralem capitis adeo necessarius est, saepeque, uti et ex his exemplis in aprico est, secantes inducit, ut luxationem et subluxationem fingant. Difficile autem est hunc hiatum detegere: inde et factum est, ut optimi osteographi EUSTACHIUS, CHESELDEN

aliique, eum non commemorarent. Ill. TREW vero annotavit illum in osteologia sua, et Cl. ALBINVS in tabulis ossium humanorum, corpus secundae vertebrae per hunc hiatum conspiciendae praebet, tab. X. fig. 2. lit. a.

p. 269. 4) *Melancholico maniacorum et epilepticorum quorundam in ptochotropheo Waldheimensi demortuorum, sectiones tradit* IOANNES ERNESTVS GREDINGIVS. Continuatio I. *). Pergit hic Cl. Auctor in ea tractatione, quam in prima parte incepit, et cuius instituti ratio supra a nobis est tradita **), et de stupidis fatuisque, de epilepticis et de epileptico maniacis agit. Breuitati autem studentes has historias in compendio tradere non possumus.

p. 314. 5) *De belladonnae viribus et efficacia in icteri curatione tentamen.* Auctore EODEM. Belladonnam Cl. GREDING in ictero chronico, cum aliis in morbis tam egregios praestiterit effectus ***), adhibuit, hicque eius vires in hoc morbo tradit. Femina, furto deprehensa, et verberibus atrocius tractata, non diu post puerperium de dolore hypochondrii dextri conquerebatur cum praecordiorum dolore et alui segnitie. Anthelmintica, lumbricis expulsis, praestabant paruum dolorum lenimen, et, digestionem laesa, cum spasmodicis et contractionibus abdominalibus, macilenta ac debilis femina euadebat, rite tamen interea menstruata. Variis incassum tentatis remediis, tandem decem salis com-

*) v. supra, p. III.

**) v. ibid.

***) v. comm. nostr. Vol. IV. p. 261. it. Vol. VIII. p. 654. not. Vol. XI. p. 258.

communis *) vncias, in sufficienti quantitate aquae solutas, partitis vicibus ita cum fructu exhibuit Noster, vt per trimestre ab his molestiis prorsus liberaretur. Effectus huius salis erant, quod quatuor aegris aliis eiusmodi exhibuit, sitis insignis, aluius saepius laxa, ante primam alui exonerationem capitis dolor, aliquoties biliosi cum pituita vomitus, et in duobus magnus ventris ardor, agente hoc remedio. Ceterum actio huius remedii Nostro rudior videtur, indeque non continuandum hoc tentamen.

Haec sola femina ex eius vsu conualuit; attamen p. 317. non cum continuatione. Nam vernali tempore recrudescebant symptomata et quidem aucta. Variis tum rursus tentatis frustra remediis, belladonna Noster in hac femina vsus est. Vespero et mane per decem dies pilulam, ex partibus octo extracti, et quinque pulueris foliorum belladonnae paratam, sesquigrani pondere ei dedit. Cuiuslibet vero pilulae deglutitionem insignis corporis calor, vehementior crebriorque arteriarum, praesertim in temporali regione ictus, capitis temulentia per duas horas et largus sudor sequebantur. Altera pilula vix deglutita, praeter sudorem, binae deiectiones, virides, cum larga vrinae copia euacuabantur, idque sequentibus diebus cum continuatione, et quotidiano icteri decremento. Haec itaque decem dierum spatio a morbo hoc conualuit.

Porro addit Noster exemplum de vsu belladonnae p. 320. in ictero, in quo vrinam, profunde croceo colore tinctam, et mucum prorsus lutei copiam e nare sinistra effluere obseruauit, bonumque et hic belladonnae effectum expertus est.

H 5

Tum

*) v. Medical transactions, Volum. I. Lond. 1768. 8. artic. IV. p. 54. comm. nostr. Vol. XVII. p. 198.

P. 322. Tum et vsus est Cl. GREDING belladonna in iſtero recentiori. Et huic feruiit belladonna, etiamſi oculorum hebetudo, vrinae excretionis plenus defectus *) et id genus alia ſymptomata continuationem vsus belladonnae impedirent.

P. 327. 6) *Traſtationis de diſtorta ſpina dorſi pars prima: de diſtorſionis differentiis.* Reſpicit b. LVDWIG ad totius ſpinae dorſi vitioſam diſpoſitionem, quoniam tum mutationes reliquarum partium connexarum recte declarari poſſunt. Quapropter agit Noſter primum de contorſione ſpinae in vniuerſum, et huius differentiis bene ordinatis, mutationes figurae et ſitus non ſolum in vertebris, ſed in aliis quoque partibus deſcribit.

P. 333. In decimo anno confirmationis ſpinae dorſi initia conſtituit. Poſt decimum itaque rarius gibberofitatis correctio locum habere videtur. Diſtorſionis ſpinae differentiae primum cernuntur in curvitate verſus anteriora, λορδῶσι: dein in lateralibus declinationibus σκολιῶσι: et denique verſus poſteriora, κυφῶσι. Quibus deſinitis, coſtas, ſternum, clauiculas, ſcapulasque iisdem oppoſitas, nec non coxarum et oſſis ſacri curvitates b. Auſtor examinat: indeque varios diuerſae aetatis gibberofitatis gradus a mala conſuetudine pariter, atque ab internis cauſſis, nec non a negotiis, vt in opificibus, pendentes conſiderat: et gibberofitatem duplicem ſiue eminentiam thoracis, a parte anteriori et poſteriori formatam, cum ſterni obliquitate coniunctam, icone addita, quantum fieri poterat, illuſtrauit. Nos vero, pauca tantum delibabimus.

Curui-

*) confer. Cl. GATAKER, v, comment. noſtr. Vol. VII. p. 720.

Curvitas versus anteriora rarior est et exemplo p. 336. confirmatur. Haec in rachiticis euenit, qui, ob tumorem infimi ventris, flexum anteriorem ad confinia thoracis et lumborum praeter modum antrorsum eminentem habent.

Commemoratur hic exemplum gibberosi, quem p. 359. ad decimum quartum annum vsque seruauit b. Auctor. Hic puer cubando et sedendo rachiticum corpus incuruabat, et eo situ dolores infimi ventris compescebat. Gibbus recta retrorsum, in ima thoracis parte obortus, et tandem ita confirmatus est, vt non, nisi manibus, super genua applicatis, incedere posset. Post decimum aetatis annum abscessus ad spinam apparebat, quo aperto, ex magna copia puris ichorosi effluxa, puer commodius incedere potuit, ac omnino melius sese habebat. Non diu post nouus iterum abscessus formabatur, quo inciso et contenta materia emissa, depuratio et consolidatio nullum locum habuit; sed aeger, lectulo inde continuo affixus tabe periit. Dolemus nos reliqua non tangere posse per instituti nostri rationem.

7) *Monita de aluiductione in conualescentibus.* p. 372. Agitur hic potissimum de selectu purgantium medicamentorum, conualescentibus accommodato, atque monstrat hic b. Auctor vsum et abusum purgationum in conualescentibus. Largitur Noster vsum purgantium leniorum in febribus intermittentibus, continuis, scabie, affirmatque leniora laxantia non nocere exanthematibus. Respicit porro in selectu horum remediorum in conualescentibus potissimum ad vim morbi, debilitatem aegri eiusque appetitum, et canalis intestinalis conditionem. Ita salia, cum laxitatem augeant, non laxitati intestinorum conducere Noster autumat.

Tertia

Tertia pars haec concernit:

- P. 387. 1) *Tractatio de venaesectione in haemorrhoidariis.* Earum definitione praemissa, ut distinctio haemorrhoidum a medicis stabilita, et a Nostro passim hic commemorata, eo melius diiudicari queat, varia symptomata, haemorrhoidariis superuenientia, pertractantur: ut narium haemorrhagia, mictus cruentus, aliaeue sanguinis euacuationes.
- P. 392. Vidit Noster tumores in haemorrhoidariis, qui ad oui columbini, imo ad gallinacei magnitudinem excreuerunt. Hae appellantur ergo tumentes haemorrhoides seu coecae, quas cum variis earundem incommodis hic Noster primo persequitur, postmodum de fluentibus, venaesectione dirigendis, disputat. In coecis non tam ad copiam sanguinis urgentis, quam ad siccitatem scybalorum et intestini ipsius, nec non ad causas antecedentes attendendum regrediendumque est. Igitur siccantia remedia, ut aloetica, quae vero hic omnino nocent, in his sunt vitanda. Multo potius libera circulatio sanguinis, ut omnino, sic in systemate venae portae est curanda, et elaboratio omnium humorum adiuvanda in primis aequae, ac reliquis viis. Atque ita haemorrhoides non raro fugari possunt, nec, venaesectione vernali admissa, regredi solent.
- P. 400. Coecis itaque haemorrhoidibus medendi ratione praemissa, venit Noster ad earundem molimina, quae nullo modo dissipari queunt et subinde molestiora redduntur his aegris. Sanguinis euacuatio in loco ipso affecto hic praefertur venaesectioni a medicis, qui partim hirudines, partim incisionem suadent, nec raro utrumque auxilium promiscue admittunt. Constitutio autem venarum haec auxilia dirigit atque definit. Qua occasione
b. Au-

b. Auctor et de tractatione abscessuum ad anum in haemorrhoidariis quaedam proponit.

Non raro fluxum haemorrhoidalem sponte au- p. 405.
Etum, grauissimos morbos eosque rebelles dissipasse,
aliquoties in spasmis vesicae, melancholia et prae-
cipue mania Noster intellexit.

Statae haemorrhoides, quae cum definito cata- p. 407.
meniorum fluxu in feminis comparari possent, nun-
quam Nostro obuenerunt. Semper enim aliqua in
ordine et temporibus obseruatur varietas, viridis-
que inde senectus cum haemorrhoidali fluxu nun-
quam est expectanda.

Menstruis non rarius antecedunt haemorrhoi- p. 416.
des, vel ea sequuntur, quae quoque haereditate
continuari videntur aequae in feminis, ac in viris; si
nimirum in mixtione humorum atrabilaria causa
spectatur. Magna vero in his medici conuertenda
est attentio ad abdominalia potissimum viscera,
ne, cessantibus catameniis, continua reddantur haemorrhoidum incommoda. Venaesectionis auxilium hic adeo dubium est, ut saepe in eo suadendo Noster haesitet, ob plethoram feminarum, potius a debilitate solidorum, quam a sanguinis boni et elaborati copia proficiscentem. Speciosum enim interdum auxilium affert venaesectionis; attamen transitorium, quoniam tenuitas sanguinis per crebriores venaesectiones fouetur, accedente inprimis vita sedentaria, quae plus in feminas cadit, quam exercitata; qua tamen haec incommoda optime tolli possunt. Ceterum et venaesectionis hic interdum requiritur, ac potissimum quidem, cessantibus mens-
truis, quo tempore multa inprimis moliuntur, nec
non in grauidis, his ipsis haemorrhoidariis incom-
modis laborantibus.

P. 421. 2) *Observata in sectione cadaueris feminae, cuius ossa emollita erant* *). Haec debilis et macilenta, ex arthritide laborans, nec ipsa venerea, nec ab eiusmodi parentibus nata, febre lenta tandem ita correpta est, ut e viuis eximeretur quadragesimo tertio aetatis anno. Cadaver erat summe emaciatum, abdomen contractum, thorax incurvatus, gibbosus et ex situ aegrae caput versus pectus erat inclinatum. Cutis sicca, pura. Pinguedinis loco sanies. Non multa inuenta sunt mutata in thorace et abdomine, nec in ligamentis, cartilaginibus, glandulis, et articulis aliquid est perspectum, quod a statu naturali multum recederet. Periosteum adhaesio in ossibus non adeo arcta erat. Externa ossium superficies scabra, quodammodo aspera, lamellis non adeo arcte cohaerentibus, erat. Femore fracto, cum cadaver verteretur, periosteum totum erat solutum, in reliquis ossibus periosteum levius, quam solet, adhaerebat. Ceterum erat periosteum densum.

P. 430. Medulla vix congelata, sed mollis et fere fluida erat, alba et pura in femore, et, quae cellulas osseas replebat, grate rubicunda: prope ossa autem innominata aliaque multis grumis sanguineis referta deprehendebatur.

P. 439. Singulorum fere ossium descriptione data, et mutatione in mollitie et flexilitate descripta, de ossium substantia omnino quaedam a Nostro commemorantur. Ac primum quidem attinet laminarum ossearum coagmentationem, quatenus os constituat. Hae externe succo conglutinante destitutae erant. Interne in illis ossibus, ubi cellularis fabrica inter densas laminas continetur, laminae illae f. parie-

*) Est prolusio academica b. LUDWIGII, 1757, Lipsiae 4. proposita.

parietes, a se inuicem remoti, copiosiore medullam continere videbantur. Præterea attenuatio in diaphysibus ossium non solum admiranda erat, sed etiam porosa et friabilis eorum substantia. Inde et ossa hæc, exsiccata sole, calcaream materiam ostendebant.

Hanc læsam ossium nutritionem non tribuit p. 441. Noster cum aliis acidæ acrimoniæ. Nam sana medulla destillatione prodit acidum, vti Cl. GRÜTZMACHERVS docuit, ex tentaminibus chemicis *), nec ex medulla huius exempli acidum destillatione est elicatum. Quapropter putat potius esse adscribendam læsam ossium nutritionem defectui boni succi, indeque deficienti nutritioni.

3) *Melancholico maniacorum et epilepticorum quorundam, in ptochotropheo Waldheimensi demortuorum, sectiones tradit IOANNES ERNESTVS GRÆDING. Continuatio II. **).* Traditis in superioribus morborum horum historiis, ea, quæ vidit notatu digniora Cl. GRÆDING in cadaueribus, quorum disquisitionem nunquam diu distulit, sed quam subito cum DIONYSIO SCHMIDT, chirurgo, curauit, accurate refert et cum aliorum obseruationibus confert illustratque. Consectaria autem in posterum communicabit. Agit hic potissimum de calua, meningibus et encephalo.

4) *Tractatio de distorta spina dorſi, eiusque pars p. 538. secunda, de causſis huius distorsionis ***).* Accuratius versari hac in re existimat b. LVDWIG, si primum
ad

*) v. EIVSD. diss. inaug. de medulla ossium, Lipsiæ, 1748. 4.

**) v. supra, p. III.

***) v. ibid. p. 122.

ad imbecillitatem, et postea ad deprauatas quasdam consuetudines in situ corporis et membrorum attendat, interdumque ad laesam ossium nutritionem respiciat. Curat itaque non solum hic infantum et puerorum imbecillitatem, quae ex multis diaetae erroribus in victu, potu, motu, regimine calido et id genus aliis inducuntur; sed etiam adolescentum, in quibus distorsiones spinæ sunt frequentiores. Quod attinet ad peruersas istas consuetudines, in situ corporis minus commodo per varias has aetates admissas, e. gr. cubandi, sedendi, standi, seque ad varios progressus disponendi: de his quidem et inprimis de mutationibus spinæ dorsi diligenter videt.

In parte quarta communicantur haec:

P. 579. 1) *Traſtationis de diſtorta ſpina dorsi pars tertia, de remediis huius diſtorſionis *)*. Ac primum quidem Noſter hic diſquirit, quomodo imbecillitati ſit ſuccurrendum: poſtea conſilia, quibus deprauata conſuetudo corrigi poſſit, expendit: item de machinis variis ad infirmitatem ſuſtinendam, et deprauatam ſitus conſuetudinem corrigendam inuentis, nec omni omnino vtilitate atque auxilio deſtitutis, quaedam ſubiungit monita.

P. 582. Inprimis magna imbecillitatis correctio cernitur, in victus quantitate et qualitate: nam corpora non ſolum ſunt replenda victu, quo ſine vi elaborationis et mutationis corrumpuntur, et fibrae minimae relaxantur; ſed etiam eo, qui veram vim elaborationis et aſſimilationis admittit. Porro et motus aequalis totius corporis omnium partium in aere libero et puro ad digeſtionem, diſtributionem,
appo-

*) v. ſupra, p. 122 et 127.

appositionem, et assimilationem nutrimenti animalis omnino requiritur. Exercitatio non suscipiatur ieiuno ventriculo, nec ea, nisi digestionem maximam partem absoluta, concedatur. Rursus fiant exercitationes usque ad initia defatigationis, quae nonnunquam usque ad initia sudoris continuandae sunt. Non minus huc pertinet frictionis et balneorum usus. Balneorum frigori subinde assuefaciendi sunt aegri.

Quo facto, de mutando situ peruerso corporis, p. 595. ex quo obliquitas spinæ nasci incipit, agitur: ac primum quidem de infantibus, ad tertium usque annum ducendis: postea de cura puerorum usque ad decimum annum continuanda, additis nonnullis monitis, quae correctionem adolescentum, ad vigorem iuuenilem ducendorum, attineant. Hic de fasciis, stragulis, modo cubandi, sedendi, standi, corpora mouendi e. f. p. a Nostro accurate disputatur, quae Lectoribus commendare quidem, diligentius tamen hic tradere non licet.

Reiecit Noster omnes thoraces obliquos, ferri p. 605. aliisque durioribus laminis munitos, quibus eleuatae, hinc inde ultra modum dorsi partes comprimebantur: et elegit nouum thoracem sanae feminae alius, quae cum aegrae habitu et proceritate conveniebat, quem interdium ferret. Praeterea addit ad scapulam eleuatam puluinaria parua, pilis equinis crispis et elasticis referta, quae quotidie mutari et eleuari iussit. His cautionibus adiunxit, matris attentionem, quam oportebat habere interdium in omnes obliquos aegrae situs, et noctu feminae custodiam, quae in aegram diligentius attenderet, eiusque somnum, obliquo corporis atque peruerso situ, interromperet. Fatetur quidem Noster, in hoc exemplo non omnem spinæ rectitudinem esse restitutam; scapulae tamen eleuationem prorsus disparuisse, nec, nisi in vertebrae lumborum potissimum,

exiguam remansisse curuitatem, idoneis vestimentis ita celandam, ut a paucis animaduerneretur.

p. 611. Quo facto ad machinas et similia auxilia, curuitatem confirmatam corrigentia, Noster progreditur, quorum usum exiguum, interdum plane noxium iudicat. Cum collari ferreo tristem Noster euentum vidit in puella, quae tali collari instructa, de scala cadens, tantam vim vertebrae cervicis imprefserat, ut breui post diem supremum obiret. Denique thoraces, coxas non nimium comprimentes, ne in partu tanta sese offerant impedimenta, suadet virginibus, et topica auxilia, ut vnguenta, emplastra emollientia e. s. p. friuola et incerta agyrtarum auxilia iudicat.

p. 622. 2) *Melancholico-maniacorum et epilepticorum quorundam, in ptochotropheo Waldheimensi de mortuorum, sectiones tradit* Lic. IOANNES ERNESTVS GREDING. Continuatio III. *). Hic a Nostro considerantur in externa trunci et extremitatum constitutione color corporis alienus, nigredo, maculae pustulaeque atque oedema; porro observatur de cavitae pectoris, praecipue pulmonum et cordis, deque scirrhis mammarum, costis, mediaestino, hydrope pectoris, e. s. p. Item de adhaesione pulmonum ad pleuram, ad pericardium et diaphragma, nec non de scirrhis, lapide, ulceribusque hic differitur. Dein pericardii concretio cum corde, illiusque ossificatio, liquor, eius quantitas et qualitas, varius hydrops, et corruptio exemplis illustrantur. Cordis pinguedo, exulceratio, volumen, flacciditas, vacuitas, polypi veri et spurii, ut causae maniae e. s. p. hic considerantur.

3) *Com-*

*) vid. supra, p. 111.

3) *Commentatio de ischuria ex tumoribus vesicae* *). Senex haecenus bene valens, nunquam venerea labe, ne cum suspicione quidem, inquinatus, inter mingendum sensit debilitatem, mox cessantem; non diu autem post ischuria plena, et ad mortem usque continua, coepit laborare. Variis frustra tentatis remediis externis, perinaeum nec tumores, nec duritiem prodebat, et sanguine, loco urinae per catheterem euacuato, absque dolore aegri, vesica urinaria magis magisque intumescebat, febreque putrida apparente cum pulsu debili et sudore, urinae odorem spargente, quinto morbi die praeterito, aeger e viuis eripiebatur.

Hi duo tumores, uti ex icone addita apparet, ita p. 684. collocati erant, ut minor, nucis auellanae magnitudinem referens, ferme in medio, sed paululum dextrorsum ad orificium colli vesicae ampliori basi adhaereret; maior vero nucis iuglandis magnitudinem aequaret, et sinistrorsum magis, basi etiam nonnihil expansa, accresceret. Erant tumores steatomatosi, densi, inaequales, non prorsus duri, sed fungosi, venis varicosis nunc collapsis cincti. Tumor minor ad ostium colli vesicae pressus, impedimentum facile superandum exhibuerat; maior autem totum orificium obturabat, ita, ut pressio, per catheterem facta, eundem potius pertunderet, quam remoueret. Curationem itaque huius morbi, de qua b. LUDWIG varie disputat, si quae fieri potuisset, in separandis tumoribus cerni oportebat: reliqua enim auxilia chirurgica enarrata a Nostro, nihil hic valuisse b. Auctor arbitratur.

I 2

4) *Animad-*

*) Est prolusio academica 1767 proposita, nunc passim emendata et aucta.

- p. 695. 4) *Animadversiones de scilla.* Eius historia naturalis, antiquitas, usus, crescendi, exsiccandi, corrigendi agendique modus, adiectis praeterea observationibus practicis, usum iustum scillae attinentibus, hic leguntur. Radix scillae est alba et rubra: haec est efficacior illa. Exsiccationem Noster suadet, et in pulvere recenter contusam scillam anteposit pulveri contuso et ad usum, uti solent in officinis pharmaceuticis, reseruat.
- p. 703. Principium actuum scillae est subtile, salinum, acre, causticum: in ulteriore disquisitione volatile, pungens, phlogisto acidulum, intense amarum, gummoso mucilaginosum, fixum, valde vrens, etsi nihil salis fixi inde producat. Ad nauseosum itaque et summe amaricantem saporem in praeparationibus pharmaceuticis pariter, atque in monitis therapeuticis Noster respicit. Exhibetur scilla optime in pulvere ab vno grano ad quinque usque, addito terreo vel sale. Amplissimae enim scilliticae compositiones scillae vires infringunt. Scillae porro vsui interponendum est semper remedium aluum ducens, ut materia mota promoueatur. Id quod et in asthmaticis pituitosis, et de omnibus bechicis remediis valet.
- p. 711. Nodulis purgantibus non lubenter addit scillam: turbatur enim atque infringitur hic eius vis; sed, ea data sola, nodulum purgantem exhibet.
- p. 720. Scillae usus nullus est, nisi adhuc aliquod solidorum robur superfit, quo euacuationes ex primis viis, et per viam urinae postea succedant vel iuuentur. Laudatur oxymel scilliticum ad gummata solvenda: item oxymel simplex. Scillae usus nullus est in cachexia, cautus in cacoehymia atrabilaria et haemorrhoidariis. Scilla tandem comparata cum colchico, non negat Noster huic illam semper esse praeferendam.


5) *Moni-*

5) *Monita de aluiductione post sopitos ventris* p. 727.

fluxus. Placuit Nostro hic de diarrhoeis, interdum in lenteriam transeuntibus, quaedam praemittere: item de dysenteria, in quibus, ficcitate demum alui accedente, galbanum, myrrha, terebinthina vel balsama alia nobiliora commendantur; oleosa vero medicamenta a Nostro reiiciuntur. Nec hic obsunt subtilissimae bolares et margae nobiles.

Verus fluxus hepaticus est ille, qui, cum visce- p. 738.
ris labes vehemens inducatur, curationem non admittit; sed tabe tandem finitur. Obtigit vero Cl. Auctori exemplum eiusmodi fluxus, qui, cum mitior esset, sanaretur. Atque eandem felicitatem b. L V D W I G ipse expertus est, in itineribus Africae.

Postremo venit Noster et ad alia viscerum abdo- p. 746.
minalium vitia, quae fluxum ventris difficilem, et saepe hepatico similem efficiunt, ut glandulae pancreaticae vitium, rariores obstructions in tenuibus intestinis, callositates et angustiae, scirrhusa, ulcerosa, nonnunquam carcinomatica glandularum corruptio, nec non tumores scirrhusi, in quibus remedium selectum valde difficilem iudicat.



XI.

Inledning til Djur-Riker, efter Herr Archiatern
och Riddaren CARL VON LINNES, Lärögrun-
der. Af ANDERS IAHAN RETZIUS,
Phil. Mag. Adjunct, och Botanices Demon-
strator vid Lunds Academie. Stockholm,
tryckt på nya Informations - Inrättningens
Bekostnad. Hos Carl Stolpe, 1772. 8.
plagg. 17.

h. e.

Institutiones in regnum animale secundum Ill.
LINNAEI mentem, ab ANDREA IOANNE
RETZIO.

Quod iam pluries in Germania tentatum est, et si
inaequali successu, tentauit Cl. Auctor in
Suecia, rem nimirum naturalem, quoad omnes suos
terminos, lingua vernacula tradere. Quam felici-
ter in arduo hoc consilio, quoad regnum animale,
versatus sit, demonstrat testimonium grauissimum
Ill. A LINNE, hisce institutionibus praefixum.
Non tamen diffitemur, nobis saltem, aequae diffici-
lem intellectu scientiam, quin difficiliorem longo,
eiusmodi versione, qualicunque lingua extra lati-
nam prodeat, videri; nec facile spem esse, fore, vt
cuiusdam hominis placita integrae nationis imitatio-
nem obtineant; tanto magis, quum vulgaribus vo-
cibus non noui tantum significatus tribuendi; sed
nouae plane voces neque in lexico, ne ambitus qui-
dem, largissimi obuiaae, effingendae sint.

In hoc vero libro Cl. Auctor non solum clas-
sum, ordinum et generum animalium characteres
Suecice

Suecice descripsit; sed terminos quoque cuiuslibet classis indicis serie vertit: qua in re, quoad nonnullas classes, ordine vsus est ab Ill. A LINNE in dissertationibus academicis quibusdam vsitato. Laudandus Auctor, quod cuilibet termino Suecico latinum apposuerit, additis ad horum omnium illustrationem tabulis necessariis.

XII.

Mineralogische Abhandlungen von FRIEDRICH AVGVST CARTHEVSE, Hochfürstl. Hessischen Bergrath und Professor zu Gießen. Gießen, bey Iohann Philipp Krieger, 1771. 8. 194 Seiten.

i. e.

Mineralogicae tractationes. Auctore FRIDERICO AVGVSTO CARTHEVSE.

Quum in maxime varia corporum mineralium natura et indole multa adhuc reperiantur, quae nondum satis sint disquisita ac definita: non inutile recte iudicat Cl. Auctor, si tentaminibus, observationibus, annotationibusque singula corpora a studiosis rerum naturalium illustrantur. Quam quidem ob causam etiam hunc libellum conscripsisse Cl. Auctor monet: quem eo magis laudandum censemus, quo magis distincta, atque experimentis, satis probatis, confirmata in eo leguntur. Complectitur is vndecim tractationes, e quibus notatu dignissima iam breuiter excerptamus.

1) *De ferro spatoso* LINN. Cl. Auctor agit. p. 1.
Est illud, uti constat, coloris albicantis, neque a
L 4 magne-

magnete attrahitur; si vero funditur, non solum color eius mutatur, atque ipsum magnetis vi exponitur; verum sui etiam ponderis multum amittit. Imminutionem hanc ponderis ideo fieri existimat Cl. Auctor, quod materies aquosa calcinatione abeat; non vero vel sulphurei, vel arsenicalis aliquid: nisus experimento, quo, cum nitro depurato, fusoque ferrum spatosum tritum cochleatim in crucibulo immisceret, neque flammam vidit, neque odorem sensit vel sulphureum, vel arsenicalem.

- p. 9. Acidis ferri spatosi magna frustra non solvuntur; sed tum demum, cum in pulverem teruntur. Solutionibus his si alcali additur, praecipitatur ferrum spatosum solutum forma calcis coloratae: unde apparet, esse illud spatum calcarium, particulis ferreis refertum. In eo tamen a vero spato calcario differt, quod hoc magis cum acidis ferueat, solutumque ilico in gypsum mutetur; ferrum vero spatosum solutum maneat. Inesse huic ferro spatoso non terram tantum ferri, sed potius ferrum natium, efficitur ex commixtione cum vitriolo, quod cum terra calcarea commiscetur, atque nasci facit vitriolum martis. Porro ferrum hoc spatosum non ipsum tantum est propter puritatem aptissimum, ex quo chalybs paretur; sed alias etiam ferri mineras idoneas reddit, ut fusione inde eliciatur ferrum, quod in chalybem facile mutetur.
- p. 12. Non concedit Cl. Auctor, quod Cl. SCOPOLI affirmat *) acidum aereum, huic minerae coniunctum, eam in massam, spato fluenti similem, mutare, vel colore fusco induere: ideo, quod eadem mutatio non fiat in spato calcario, neque ipsa haec minera fiat fluor crystallinus, cum acidis semper solvatur.

*) vid. EIVSD. *Einleitung zur Kenntniß und Gebrauch der Fossilien*, p. 121.

tur. Sed eum in finem aeri exponi hanc mine-
ram affirmat, vt ferrum facilius a petra soluatur.

2) *De margaceo schisto, cuprum continente.* In p. 29.
dicata schistorum cupreorum differentia, margaceos considerat, eorumque attributa enarrat, e quibus iis maxime propria sunt, quod molles sint atque friabiles, cum acidis ferueant, atque igne facile fundantur: sicque particulas cupreas mox offerant; ipsi vero fiant scoriae vitreae. Porro, quod locum attineat, inueniantur intra calcareos, ac vix quatuor pollicum latitudinem superent.

Basis itaque eorum est terrae calcareae magna pars, et terra argillacea, quibus accedit bituminis aliquid, quod odor, quem spargunt, si commisceantur cum spiritu vitrioli, vel fundantur, comprobare videtur. Deinde continetur in iis cuprum purum: unde tostura ante non egent, quam fundantur. Denique refert Cl. Auctor in iis ut plurimum corpora vegetabilia, e. gr. filices, reperiri.

3) *De sulphureis et arsenicalibus minerarum fer-* p. 46.
ri lapidearum particulis agit Cl. Auctor, atque tostura
eos non egere ostendit. Negat Cl. Auctor in mi-
neris ferri lapideis vel sulphur, vel arsenicum conti-
neri: ac si quid interdum in iis inueniatur, pende-
re illud affirmat a particulis pyritae, vel pyritae albi,
quae his mineris sint immixtae; has tamen parti-
culas ad veras ferri mineras non esse referendas.
Id quod confirmatur experimentis, quibus praesen-
tia sulphuris et arsenici generatim demonstratur:
quae, cum euentis caruerint, unde sulphur et arse-
nicum adesse pateat, colligitur, nihil eorum inesse
veris mineris ferri lapideis. Quapropter tosturam
iudicat Cl. Auctor superuacaneam: cum ita nihil
damni,

damni, quin imo vtilitatem in parcendis sumtibus sequi, exempla ostendant.

p. 60.

4) Sequitur *de cupro nudo* disquisitio, in qua, allata distinctione inter cuprum nudum et praecipitatum, de origine eorum disputatur. Expensis hypothesium argumentis, cum alii iis vnam eandemque tribuant originem, alii diuersam; statuit Cl. Auctor, si vel fieri possit, vt eadem sit iis origo, non tamen generatim id affirmandum esse; sed potius probabile, sulphur sensim exhalare, atque ita remanere cuprum nudum. Hanc enim sententiam et ratione, et simili argenti nudi origine probatam iudicat.

p. 73.

5) *De diuisione minerarum ferri lapidearum* ita agit Cl. Auctor, vt, recensitis variorum mineralogorum, quibus has mineras diuidant, rationibus, eam diuisionem optimam censeat, quae variam earum respiciat matricem. Ita enim et ipsas species facile distingui, et fusibilitatem earum vel maiorem, vel minorem inde statim colligi. Hinc sex primarias species constituit: mineras nimirum ferri saxosas, arenaceas, argillaceas, spatosas, calcarias, haematitas et vitreas. Harum specierum omnium externas notas characteristicas, proprietatesque, atque praecipua, vbi inueniantur, loca, aliasque etiam earum subdiuisiones enarrat. Saxosas et arenaceas, haematitas, et vitreas mineras difficulter fundi; exargillacearum vero quibusdam, spatosis, et calcariis facilius ferrum elici asserit.

p. 80.

Tum, argillaceas coloris esse vel rubri, flau, bruni, vel nigri; nonnunquam terrae calcariae imixtas refert: atque huc esse referendam existimat mineram martis pisiformem, plurimasque ex palustribus, nec non LINNAEI ferrum talcosum, cuius

ius fusibilitatem ab alia, ei immixta parte pendere coniicit. Spatofas esse vel albas, vel flauicantes, vel brunas, vel rubras. Ex iis, propter magnam ferri copiam, quam inde accipias, esse notatu dignam eam, quae Dannemorae in Suecia inueniatur, et a LINNAEO dicatur, ferrum calcarium, refractorium nigrans marmoris. Centenarium enim huius minerae pondus, nonaginta libras ferri praebere. Haematiten et mineram martis vitream vnam esse speciem postremo affirmat, nec, nisi externa forma, differre.

6) Proponuntur *quaedam ad Chrysolithum an-* p. 94.
notationes. Diatribes huius summa eo redit, ut ostendatur, duritiem esse eam proprietatem, ex qua variae gemmarum species, ideoque etiam chrysolithus, distingui debeant. Quapropter non assentitur Cl. CRONSTEDTIO, qui chrysolithum speciem topasi fecerit *): neque Linnaeanas partes sumit, cum Ill. LINNAEVS, propter crystallorum figuram, illum ad boracem retulerit **). Non enim solum crystallorum figura minus constans a Nostro habetur; sed etiam ostendit crystallorum chrysolithi figuram, cum illa boracis, quae est rhomboidea, neque octaëdra, non conuenire. Denique etiam affert, gemmas, vel igne colorem proprium mutare, vel illum retinere: atque posterioris generis esse chrysolithum.

7) *Signa, quibus gemmae pretiosae a reliquis cry-* p. 107.
stallis et lapidibus certe et vere discernantur, expo-
nuntur:

*) vid. EIVSDEM *Versuch einer neuen Mineralogie*, §. 46. 47.

**) vid. EIVS *system. naturae*, Tom. III. edit. nou. p. 94 seq. vid. comm. nostr. Vol. XVI. p. 341.

nuntur: eaque solum cernuntur in insigni earum duritie atque splendido nitore, quippe quae nulla ars imitari potest. Quae enim alias certa habentur, grauitas magna, atque absentia pustularum in fundo gemmarum; ea, cum interdum varient, a Cl. Auctore disquisitorem saepe fallere dicuntur.

- p. 117. 8) *De partibus constitutivis nitri, quod dicunt embryonatum.* Etli STAHLIVS alique opinati sunt, esse in eo, praeter acidum nitri, sal ammoniacale, quod, addito alcali, expelleretur; Cl. Auctor tamen huic non subscribit sententiae, sed potius experimentis reperit, terram calcariam alcalinam fixam, cum acido nitri semper coniunctam. Cum enim combinaret nitrum embryonatum cum aqua: obtinuit lixiuium lutosum lacteumque, in quo terra calcareae indolis praecipitaretur. Addidit huic lixivio calcem et viuam, et extinctam; neque tamen vrinofum inde sensit odorem, neque, igne adhibito, sal quoddam vrinofum inde elici potuit. Itaque alcali, quod in nitri paratione vel experimentis additur, non expellit sal ammoniacale; sed potius coniungit se cum acido nitri, et terram calcariam praecipitat: atque ipsum id, quod in paratione nitri semper terra alcalina addatur, Nostri sententiam
- p. 124. probare videtur. Qui in nitro murario easdem partes, quae in embryonato sunt, inuenit: atque ideo in hac re dissentit a Cl. PIETSCH *), qui affirmet, inesse ei sal ammoniacale. Experimentis enim PIETSCHII a Nostro repetitis; nihil tamen odoris vrinosi sensit. Ceterum existimat Cl. Auctor in aere contineri et acidum nitri, et vitrioli, quae ambo ad generandum nitrum conducant.

*) vid. EIVSDEM Diff. sur la génération du nitre, qui a remporté le prix de l'Academie. à Berlin, 1750. 4.

9) Cum *de gypso eiusque in fusione ferri usu* dif. p. 141. ferat Cl. Auſtor, oftendit, non materias calcareas ſolum ferri mineras reddere fuſibiles; verum etiam gypſum, et vſuale, et alias eius ſpecies idem efficere. Eſſi vero fuſio, vel citius, etiam gypſo adiu- vatur; teſte tamen Cl. SCHREBERO *), fieri inde conſtat ferrum friabile fragileque. Quod pendere affirmat Cl. Auſtor ab acido vitrioli, coniuncto cum phlogiſto carbonum; vnde oriatur ſulphur mi- nerale, cuius ſit vis ferrum fragile reddendi. Qua- re gypſum non in officinis fuſoriis adhibendum iudicat.

10) De *graptolitho dendrite*, eiusque origine ita p. 153. tractatur a Cl. Auſtore, vt, recensitis diuerſis lapi- dum generibus, vbi inueniatur, variisque eius et figura, et colore, vel igne conſtante, vel mutabili, indicatis; eodem plerumque naſci cenſeat, ex materia ferrea, ſalino quodam principio ſolu- ta: qua in re conſentit cum LINNAEO **). Hanc autem non eſſe vnam, qua naſcuntur den- dritae, rationem et CONDAMINEI ***) oſten- dunt experimenta, quibus patet, infuſas ahati vel vitro ſolutiones argenti, auri cuprique, ſi iis impo- nantur metalla varia, eodem dendritas produxiſſe; et ipſius Cl. Auſtoris experientia comprobat, cum ortum viderit dendritem, viridis coloris, affuſo ad tritam flauamque cupri mineram ſpiritu ſalis am- monia-

*) vid. EIVSDEM *neue Sammlung verschiedener in die Cameralwiſſenſchaften einſchlagender Abhandlungen*; in tractatione de praestantia Suecici ferri, prae Ger- manico.

**) vid. EIVS *system. natur.* Tom. III. p. 173.

***) vid. *Mémoires de l'acad. roy. des ſcienc. de Paris*, Amſtel. 1731. p. 655 ſeq.

moniaci, cum calce viua parato. Sub finem subiungit opinionem Cl. ZIMMERMANNII *), qui eos ortos putat post fatescentiam in aere lapidum: quam sententiam ita in quibusdam assumi posse concedit Cl. Auctor, vt, fatescentia lapidum facta, ferri solutio se in eos facilius insinuet, atque colores dendritorum producat; generatim vero non posse affirmari, id quod praeter alios doceat filicis chalcedonii LINN. dendrita, vbi lapis sit durissimus.

p. 172. II) Expositis variis *de origine succini* sententiis, eam maxime probabilem existimat, qua illud dicitur corpus minerale, et quidem bitumen. Idque maxime ideo, quod olei eius natura sit ea, quae nullis vegetabilibus oleis sit communis. Si enim solum est, non soluitur in spiritu vini, atque, si coniungitur cum spiritu nitri fumante, nascitur resina, moschum redolens: quae quidem attributa in olea vegetabilia non cadunt.

*) vid. HENKELS *kleine mineralogische und chymische Schriften*, in notis ZIMMERMANNI, p. 362.

XIII.

Méthode pour recueillir les grains dans les années pluvieuses, et les empêcher de germer. Par Mr. DUCARNE DE BLANGY, à Paris, 1771, chez P. Fr. Gueffier, avec figures, 8. 43 pagg.

i. e.

Methodus colligendi frumenta in annis pluviosis et eorum germinationem prohibendi, Auctore Cl. DUCARNE DE BLANGY.

Cl. Auctor hic exhibet libellum, dialogice conscriptum, paruum quidem mole, propter usum tamen, quem refert, non contemnendum. Non raro nimiarum pluviarum iniuria maxima frumentorum copia ita perditur, ut nova germina, invitis agricolis, proveniant; ad haec vero auertenda Noster methodum quandam enarrat, cuius ratio haec est.

Frumenta in campo illo, ubi resecta sunt, et p. 10. quidem statim post sectionem supra terram sternuntur hac ratione, ut exacte figuram molae pistrinae (*la moie*) referant, quarum quaeque quinquaginta aut sexaginta manipulos contineat: sic efficitur altitudo sex siue septem pedum. Ad extruendas vero tales molas suadet, ut pro vnaquaque locus ficcus et paullulum elatior seligatur et manipuli ita apponantur, ad centrum omnes spicae ut conspirent. Etenim spicae, dum maiorem culmis molem referunt, centrum elevatius reddunt et pluviae sic commode destillare possunt.

Imposito

p. 31.

Imposito hoc modo vno manipulo super alterum, exsurgit acervus supra dictae altitudinis; probe tamen cauendum esse iubet Cl. Auctor, ne vllum spatium vacuum remaneat et sic pluuiis aditus liber concedatur. Cacumen molae tegitur manipulo transuersim imposito, qui ligamentis ex stramine confectis, propter ventorum iniquitatem, molae affligitur. Haec omnia Auctor, vt eo melius patefcant, sat aptis figuris illustrauit.

XIV.

Moyen sûr et facile pour détruire les taupes dans les prairies, et dans les jardins, à Paris 1770, 8. chez Gueffier, avec figures, pag. 43.

i. e.


Remedium certum, quo facile extirpentur talpae in pratis et hortis.

Inter pessima animalia, quae hortorum et pratorum decus destruunt, omnino referri merentur talpae; siquidem illa amoena loca interdum ita devastentur ab illis, vt maximae exinde ruricolis proveniant noxae. Cl. Auctor, multis iam ante eum minus feliciter tentatis, hoc libello paruulo machinam quandam describit huiuscemodi fere structurae. Tabulam ligneam longitudine quinque, latitudine vero duorum, et quod excurrit, pollicum, perforant septem foramina, quorum primum in medio, quatuor in angulis et duo reliqua haud procul ab illis angularibus dextri lateris; quae quidem orificia angularia dextri lateris, bases duorum bacillorum ligneorum recipiunt, qui dein in forma arcus

cus ad orificia lateris sinistri inflectuntur, excurren-
tibus simul cum his duobus filis, ita, vt vnum eun-
demque arcum forment. Ex orificiis egressa fila,
decem vel duodecim pollices longa, in nodum colli-
guntur, qui per foramen medium ductus, cono quo-
dam, leuiter intruso, firmatur. Huic filo aliud, quin-
que vel sex pollicum, affigitur et vnco cuidam ligneo,
terrae immisso, annectitur.

Porro quatuor vnci lignei, prope angulos ta-
bulae, terrae immissi, apicibus incuruatis tabulam
firmant; leuiter tamen illam attingere debent, et
hoc quidem hanc ob causam, ne tabula, vi elastica
bacilli, qui semper superiora versus nititur, re-
sultet.

Denique duae tabulae vnus eiusdemque magni-
tudinis, in situ verticali positae, impediennes, quo-
minus terra in muscipulam, inprimis intra arcus
intret. His omnibus absolutis, Noster vsum huius
inuenti describit, qui vero ex delineatione, modo
data, vltro patebit. Postremo modum detegendi vias
talpae subterraneas agricolas docet.



IGNATII GODEFRIDI KAIM, Austriaci Styrensis, dissertatio inauguralis chemica, de metallis dubiis. Viennae, literis Schulzianis, 1770. 8. pagg. 59.

Intelligit Cl. Auctor per metalla dubia ea, quae a quibusdam mineralogis ad metalla; ab aliis contra ad alios corporum naturalium ordines referuntur: quae sunt, arsenicum, cobaltum, niccolum, magnesia vitrariorum, spuma lupi et ferri, et plumbago. Operae igitur pretium fore putavit, si de his ageret, atque in eorum naturam curatius inquireret: quod, quam felici cum successu perfecit, ii intelligent, qui et argumenta, ratione firmata, et experimenta, naturae cuiusque corporis conuenientia, diligenter perpenderit. Quare, ut lectores quodam modo assensus nostri veritatem intelligant, en! pauca, pro instituti ratione, afferamus.

p. 8. De arsenico primum caput agit; quod quidem WALLERIVS, atque alii, ad metallum; ad sulphura LINNAEVS; LEHMANNVS vero ad salia retulerunt. Cl. Auctor autem, cum et ad caracterem metalli, quem in terra vitrescibili ponit, et ad arsenici attributa, et ad eius diuersitatem respiciat, his non omnino adsentitur. Arsenicum constare dicit materie, summe volatili, dulci sapore, et odore terribili praedita, quae non acidis solum, sed aqua ipsa soluatur.

Hanc materiem vero ita differre notum est, ut occurrat vel in lamellis splendoris argentei, tumque dicatur arsenicum album; vel reguli forma, vnde

vnde fit regulinum appellandum. Album arsenicum fal esse acidum experimentis comprobatur; quod tamen materiis peregrinis fit commixtum: hinc refutatur Cl. IVSTI, qui arsenicum dixerit mercurium sublimatum corrosivum, atque ostendere an nititur Cl. Auctor, ea sibi esse plane dissimilia. Arsenicum vero regulinum verum sulphuris genus esse exinde patere dicit, quod illud concreuerit ex arsenico et phlogisto; ac sola tantum acidi specie a vulgari sulphure distinguendum existimat.

In capite secundo cobaltum contemplatur Cl. p. 17.

Auctor. Primum Cl. BRANDTII *) industria cobaltum est a wismutho distinctum, cuius merita Noster laudat, atque signa, quibus ab illo designetur, enumerat; Ipse vero in disquirenda eius natura ad tria attendit: 1) ad vitrum coeruleum et atramentum sympatheticum, quod inde producat: quod, cum statim et calcinatione, et via humida, per acida mineralia **), et hepate sulphuris, cum minera cobalti fuso, inde obtineatur, aliisque etiam metallis adhaereat, ad regulinam cobalti substantiam pertinere negat; 2) ad regulum cobalti, illumque cum vulgari ferro, quoad principia convenire ostendit, neque esse, nisi regulum ferri arsenicatum, inde persuasum habet, quod, quem auripigmento, cum ferro coniuncto, parauerat, regulus easdem omnes notas habeat, quae regulus cobalti. Vtriusque enim huius reguli crocus niger est, vterque a magnete non attrahitur, vterque, si cum acido nitri miscetur, colore flavo viridescente tingitur: vt alia taceamus, quae idem comprobent.

K 2

3) De-

*) vid. Aët. Suec. Vol. IV. p. 4.

**) vid. LEHMANNI *cadmiologie*, part. I. p. 81. et in libro, cui titulus: *Probierkunst*, p. 314.

3) Denique explicat Cl. Auctor, cur cobaltum a mineris, et praecipue, cur ab ipso ferro separari possit. Inde nimirum deriuandum, quod eae cobalti species, vbi separetur ferrum, arsenico non sint saturatae; aut arsenicum ex iis sit eductum, quod vel arte fieri possit, cum solutioni reguli cobaltini iniicitur frustulum zinci, quod, arsenico coniunctum, reddit ex cobalto post fusionem malleabile attractorium ferrum *).

p. 24. In capite tertio niccoli natura perquiritur. Etsi vero illud iam Cl. CRONSTAEDT ab aliis metallis, praesertim a cupro, nouem proprietatibus **), diuersum esse monuit; Noster tamen, quae his adderet, reperit. Ideoque miratur, cur LINNAEVS illud speciem cupri fecerit, atque vehementer reprehendit Cl. IVSTI, qui hoc semimetallum in dubium vocauerit. Ipse itaque Cl. Auctor niccolum denuo disquisiuit, atque cum Schneeberga Saxonica acceperit mineram niccoli, quae ibi nomine cobalti tinctorii veniat, puriorem, quam quidem CRONSTAEDTII fuerit, vltiora cum eo instituit experimenta.

Fuit illa minera lapis coerulescens, inquinans, non tantum viridi colore hinc inde efflorescens, sed spati etiam viridis nonnihil inter particulas suas metallicas intertextum habens. Cum ea itaque CRONSTAEDTII experimenta reiterauit, omniaque ei successerunt, praeter, quod commixtione spiritus salis ammoniaci tincturam coeruleam nunquam, sed semper viridem vidit. Ideoque suspicatur Cl. Auctor, fuisse in minera CRONSTAEDTII cupri aliquid adiunctum; quod confirmatum habuit, cum adde-

*) cf. LEHMANNI cadmiologia cit. P. II. p. 31.

**) vid. Anonymi mineralogia, p. 229.

adderet minerae huic limaturae cupri partem, atque tum vidit colorem coeruleum nasci.

Hinc cupri et niccoli differentiam patere putat Cl. Auctor, quam etiam confirmat liquore probatorio, ex coerulei Berolinensis, magistraliter, ut ait, parati, pigmento, ac lixiuio salis alcalini fixi facto. Hic liquor niccolum flauo viridi colore deiciebat; si vero cuprum adiungeretur, sedimenti color ruber conspiceretur. Denique etiam, cum adiungeret arsenico limaturam cupri, et coniiceret, inde forte enasci regulum niccoli: metallum quidem album, subrubrum, propemodum instar niccoli, obtinuit; tentamina tamen reliqua ostenderunt, satis diversum hunc regulum esse a niccoli regulo. Quapropter colligit, esse aut docendum, in quo arctum illud vinculum consistat, quod partes constituentes tam firmiter connectat, aut metallum pro nouo genere suscipiendum.

Quod sequitur caput quartum de magnesia vi. p. 48. trariorum et reliquis agit. Magnesium hanc, quae a LINNAEO dicitur *molybdaenum magnesia*, cum a nemine haecenus fere sit curate examinata, Cl. Auctor chemice disquisiuit. Sumsit nimirum magnesia, in puluerem tritae, partem vnam, fluoris nigri optimi partes duas; eaque mixta, igne, successive aucto, fudit: quibus fuis, obtinuit regulum, ex albo coerulescentem, fragilem, qui diffractus superficiem exhibuit, compositam ex innumeris planis, varie positis, nitidisque, quae, si oblique inspicerentur, coloris subflauo essent; ita tamen, ut inter singula plana spatium interiectum esset coeruleum, asperum, splendore carens: adeoque, ut haec superficies appareret instar crystallorum metallicarum, minerae subcoeruleae immersarum.

p. 50. Praeterea metallum hoc acido nullo solo, nec concentrato, nec diluto, attingebatur; si vero acida diuersa, inaequali proportionem mixta, v. c. acidum nitri et vitrioli, adhiberentur, metallum ab iis solui efferuescentia, quae mox oritur, docebat. Solutiones hae aqua non turbantur: lixiuio probatorio praecipitatur sedimentum viride; lixiuio arsenicali pallidum, subrubrum; quae tamen vtraque paullo sunt diuersa, pro menstrui diuersitate. Negat igitur Cl. Auctor inesse huic magnesiaee ferrum; quin potius affirmat, mereri eam noui semimetalli nomen, donec vel dictae proprietates ab ea separentur, vel aliis metallis easdem tribui posse efficiatur. Coniicit etiam, plures esse huius metalli species, inde tantum incognitas, quod facilius vitrificentur, quam assumant formam regulinam. Monet itaque, vt cogitent chemici de adminiculo, quod vitrificationem impediat, fluxum metallicum iuuet et phlogiston copiose offerat: quo metallum hoc largiter ad vsus oeconomicos obtineatur.

p. 54. Spumam lupi et ferri huic subiungit Cl. Auctor, easque, etsi a plurimis ad ferrum referantur, non ad illud pertinere docet, sed eorum regulum ad magnesiaee regulum proxime accedere.

p. 55. Ultimo plumbago consideratur, quae, propter singularem specificam leuitatem, definitu sit difficilima. Fundi quidem eam dicit Cl. Auctor, sed, ob leuitatem non descendere, quo regulus gignatur. Quamuis enim Noster illud coniungeret cum aequalibus partibus cupri et fluxus nigri; non tamen quidquam obtinuit, praeter cuprum, superficie externa aurea obductum. Nihilominus tamen plumbaginem metallum iudicat, cum metalli natura in grauitate sola non sit ponenda. Quatuor etiam eius species constituit: plumbaginem (*Wasserbley*)
squa-

squamulis exiguis; pseudogalenam (*Eisenthon*), magnis; mineram arsenicalem (*Misspickel*), granularis; et micam auream (*Katzengold*), viridibus nigricantibus praeditas: cuius posterioris squamae postquam calore secesserint, auricolores subsequantur lamellae. Harum specierum cognita et a PORTIO *), LINNAEO **), et IVSTI ***) indicata attributa subiungit.

XVI.

Tal om Peston, och om dess utestängande ifraen et Land, haellet för Kongl. Vetenskaps Aca-
demien, vid Praesidii nedläggande den 6,
Maji 1772, af NILS ROSEN VON RO-
SENSTEIN, Archiater, Riddare af Nord-
stjerne-Orden. Stockholm, tryckt hos Dir.
Lars Salvius, 1772. 8. pggr. 24.

i. e.

Sermo de peste, et de ratione eandem a re-
gione arcendi, habitus coram academia reg.
scient. quum praesidis munere decederet, ab
NICOLAO ROSEN A ROSENSTEIN.

Ansam sine dubio scriptioni huic dedit pericu-
lum, in quo anno 1771, et initio sequentis
Suecia versata est, ne commercio cum Russia a pe-
ste inficeretur. Recepta eiusdem argumenti tum
data a collegio medico et a professore Abaensi, Cl.

K 4

HAART-

*) vid. Miscell. Berol. Tom. IV.

**) vid. EIVS syst. naturae, T. III. p. 121.

***) vid. EIVS chymische Schriften, T. I. p. 382.

HAARTMAN. Accessit dein praesidis Ill. A RO-
SENSTEIN commentatio.

- p. 4. Multa in eadem continentur, quae tam ad historiam pestis, olim in Suecia grassatae, quam eius, quae alias regiones subinde afflixit, pertinent. Et ex hisce continuam funesti huius morbi descriptionem Cl. Auctor concinnauit. Regularum autem substratarum, quibus praemuniatur contra pestem regio, ea natura est, ut ubiuis in usum verti queant.
- p. 5. Dum a. 1710 Holmiae vim suam exferret, perierunt homines 40000, Carolicoronae autem 16000. Plures contra vulgarem opinionem ruri, quam in urbibus ea moriuntur. Dicta Holmenfis pestis cum transfugis ex Liunia in urbem translata fuit, ex qua per nundinas ulterius dispersa.
- p. 6. Signa, ex quibus praeuideri potest, an regno cuidam pestis immineat, incerta pronunciantur. Suspicionem magnam excitat iam irrepsisse, si multi inter easdem aedes subito morbo correpti fuerint: plures inde perierint, et quidem plerique ante finem diei quarti, alii quoque, qui aegros adierint, infecti. Sed haec et in febre petechiali grauiori locum habere possunt. Augetur vero suspicio, si percipitur, pestem propiorem finibus nostris fuisse vel adhuc esse, commercium cum vicinis non impeditum, merces cuiusmodi intra fines translatae, quibus contagium adhaerere solet, vel multos classico-
rum in naue per iter periisse, eandemque a loco infecto venisse. Si simul autem aegrotantes de lancinante sensu, in inguinibus, sub axillis vel auribus percepto, queruntur vel in hisce locis durities quaedam vel intumescencia nascitur: tum morbus pro peste omnino habendus est. Bubones et carbunculi

culi non tanquam signa diagnostica considerari possunt, quum plurimi aegri vita decedant, antequam haec se manifestent.

Recidivam pestis non quidem in eadem epidemia, nec apud senes locum habere; reliquos autem contra eandem non satis tutos Ill. Auctor arbitratur. p. 9.

Exemplum recenset miasmatis, per plures annos latentis, casu autem iterum sese dispergentis. p. 10.

Aere non propagatur pestis, nisi atmosphaera aegri alium alluat; quod tamen non semper fieri, ostendit narratione viri cuiusdam, qui, licet a. 1720. Marsiliae peste laboraret, non tamen Cl. CHICOT-NEAU, qui aliquoties lecto eius infedit, infecit. Successit Cl. ROBERGII, professoris olim Vpsalensis consilium, Vpsaliae a. 1710. ad compescendam pestis propagationem datum, ut in rus sese transferrent, vel aedibus suis sese includerent. p. 11.

Paucis iam complectemur praecepta, a Cl. Auctore subministrata. Quae ad excubias attinent secundum lineas (*cordon*) instituendas, ob praestantissimum earum usum monet, ne expensarum causa ab hisce Princeps abstineat. Dein aedes pro aegris et mercibus per aliquod tempus servandis requirit, determinatque commodissima loca, quibus exstruantur. p. 13.

Probe praeterea explorandae sunt merces in hominibus capite damnatis, canibus in subsidium captis. Tempus, quo secludantur homines (*quarantaine*), posset ad 15 vel 20 dies restringi; nam experientia constitit, venenum non ultra 7 dies delituisse. Initio quoque morbus acidis et sudoriferis facile vinci potest. Quin tantum sibi tribuit medicus quidam Suecus, experientiae haud vulgaris, A BLOCK, Norcopiae sub peste a. 1710 degens, ut nosocomio ibidem exstructo, pro cuiusvis aegri, p. 16.

opem suam inter primas 6 horas explorantis, morte decem imperiales polliceretur, si modo ciues vr-
bis pro quolibet homine perfecte a se sanato quin-
que imperiales soluere haud detrectarent. Probat
quoque Cl. CHENOT consilia, ab iis vsurpan-
da, de quibus metus infectionis est.

p. 17. Quodsi vero iam irrepserit pestis intra regio-
nem vel urbem, semper initium capit intra pagum
vel domum; et sisti tum potest vltior propagatio,
modo tollatur omne commercium, mortui cum
vestibus rel. humentur noctu, domus ipsa sulphure
fumigetur et aere perfletur, et omnia aceto lauen-
tur. Optimum tum est, si in vrbe iam appareat,
in rus sese conferre, et ibidem tamdiu remanere,
vsque dum pestis omnino perierit. Sed id initio
modo locum habet.

p. 20. Iis vero, quorum praesentia in vrbe carere non
possumus, vt magistratibus, diuini verbi ministris,
medicis, pistoribus rel. in iunctum esto restitare in
vrbe. Ne hi vero temere vitam suam morbo ex-
ponant, oportet eos et conclauis, et proprii corpo-
ris munditiei indulgere, curare, vt aer semper
purus sit et in continuo motu, inspergere pauimen-
to et vestibus tantillum aceti, vitare, quantum licet,
commercium cum aegris, et si inire id debent, non
ante ientaculum sumtum, nec sub iactura virium.
Commendat Cl. Auctor eo fine medicis pauxillum
panis, cui butyrum illitum, et ruta imposita, vel pa-
nem bis coctum, aceto vini intinctum. Inter haec
ingerentur rosae conditae, aurantia condita et tan-
tillum macis. Sponte patet, abstinendum cibo po-
tuque in aegri conclauis; nec domi aliquid ingeri
debet, antequam os pauxillo aceti collutum fuerit,
cui fini inprimis acetum, (*vinaigre des quatre vo-
leurs*) inferuit. Nec deglutiri debet saliuia; et si
aeger

aeger conueniendus est, non nimis prope fanus ad eum accedat, nec faciem illi admoueat. Retinendus vero spiritus, si cominus eum inuestigare opus est, et mox postea acetum olfaciendum est. Cauendum est a conuentibus cuiuscunque generis.

De reliquo diaetae praecepta negligi non debent, et praecipue ab excessu cibi potusque cauendum. Omnibus vero lardum, caro suilla, anguillae, caro salita et fumo indurata, vti et spiritus vini vitanda; conuenientissima sunt iuscula ex frumento pinfato (*Grütze*) acidulata. Omnis exercitatio nimia corporis fugienda, omnesque animi commotiones fortiores harumque causae.

XVII.

Noua physico-medica.

Mortuo bono nostro LUDWIG *), Facultas Medica *Lipfisensis* ita est mutata.

D. ANTONIVS GVILIELMVS PLAZ, Ordinis medici Decanus perpetuus, therapiae Professor publicus ordinarius, Academiae Decemuir, collegii maiorum Principum Collega, nationis Saxonicae Senior, Academiae imperialis naturae curiosorum Sodalis.

D. IOANNES CHRISTOPHORVS POHLIVS, Facultatis medicae Senior, pathologiae Professor publicus ordinarius, Academiae Decemuir, Collegii beatae Mariae Virginis Senior, et collegii maioris Principum collega, Physicus prouincialis, et Academiae imperialis naturae curiosorum Sodalis.

D. ERNE-

*) vid. paullo infra.

D. ERNESTVS GOTTLOB BOSE, anatomiae et chirurgiae Professor publicus ordinarius, Facultatis Medicae Assessor, et apud Lipsicos Poliater.

D. CAROLVS CHRISTIANVS KRAVSE, anatomiae et chirurgiae Professor publicus extraordinarius, Facultatis Medicae Assessor, collegii minoris Principum Collega.

D. IOANNES CAROLVS GEHLER, physiologiae Professor publicus ordinarius, collegii maiorum Principum Collega, apud Lipsienses medicus obstetricius et societatis oeconomicae Lipsiensis Sodalis.

D. CHRISTIANVS FRIDERICVS KADELBACH, Facultatis Medicae Assessor, et Societatis oeconomicae Lipsiensis Sodalis.

D. IOANNES GOTTLOB HAASE, Facultatis Medicae Assessor.

Academia Regia chirurgorum *Parifina* quaestionem, de influxu rerum nonnaturalium in operationes chirurgicas *) nondum iuste solutam, ad annum 1775 cum duplici praemio, monetae scilicet aureae quingentarum librarum Gallicarum distulit. Reliquae leges, quas obseruare oportet eos, quibus hanc in rem inquirere placebit, aliquoties non multum ante **) a nobis sunt traditae.

Praemium aemulationis *ibidem*, quod constat ducentis libris Gallicis Cl. BAIU deportauit. Quinque minora praemia Cll. AUBRAI, RAYMONDOU, DIDELOT, PIETSCH et MESTIVIER acceperunt. Quatuor vero monetae aureae, singula centum librarum Gallicarum, a Cl. HOUSTET destinatae quatuor studiosis, CAZAMAIOU

*) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 150.

**) vid. ib. Vol. XV. p. 355.

MAIOU nempe, GROFFIER, DEFFOUX, et BOBOT: item quatuor argenteae monetae, vt *l'accessit* ab EODEM fundatore, LASSAUZÉE, CHOVIN, MAURENE et GAINARD, dignis, qui coronarentur, sunt tributae.

Porro relatum legimus, *Eandem* thesin de aethiopum cura cum viris eruditis communicasse, eandemque ipsam elaboratam exspectare anno 1778. Eo autem est respiciendum iis, qui hanc in rem inquirere constituent, vt declarent, *primo*, quo optimo modo aethiopes in nauibus quibus transuehantur, ad iustam eorum integritatem et sanitatem ponendi sint: *secundo*, quae optima sit cura et diaetae ordo ad sanitatem eorum in nauibus conseruandam; *tertio*, quae diligentia in eo obseruanda sit, vt nonnisi periti et exercitati chirurgi in iisdem nauibus adhibeantur.

Academia scientiarum, elegantiorum literarum et artium *Rothomagensis* ad annum 1775 praemium ei tribuet, qui quaestionem hanc optime soluturus elaboraturusue sit: *Quaenam est optima methodus, acus magneticas fabricandi, easque suspendendi, ita, vt certissimus, eas in vero meridie magnetico positas esse, vt denique variationum earum diurnarum regularium reddamus rationem?* (*Quelle est la meilleure maniere de fabriquer les aiguilles aimantées, de les surprendre, de s'assurer, qu'elles sont dans le vrai meridiem magnetique, enfin de rendre raison de leurs variations diurnes régulières?*)

Omnes vel etiam focii Academiae extranei hoc praemium ambiant. Elaborationes Gallica vel Latina lingua, vel quacunque Auctor velit, exaratae communicentur. Reliqua vide supra *).

Quae-

*) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 716.

Quaestionum Regiae Academiae scientiarum artiumque bonarum *Mantuanæ*, anno 1774 soluendarum, eas ex classe mathematica atque physica, quippe quae ad finem nostrum magis spectare videantur, hic commemorare iuvat. Ac prima quidem ita sese habet: *conduceretne aggeres aquarum Mantuanarum emendare et quomodo? vel novos iis substituere et quamnam forma, ut salubritate aeris inde, libertati interiori navigationis et securitati urbis prospiceretur? cet.* (Seroit-il à propos de rétablir et comment la digue des eaux de Mantoue, ou d'en éléver une nouvelle et sous quelle forme, en conservant la salubrité de l'air, la liberté intérieure de la navigation, la sûreté de la ville, cet.)

Porro, *quinam sunt morbi et urbi, et viciniae campestri Mantuanæ solemniores, quatenus eorum causa et optima prophylaxis?* (Quelles sont les maladies les plus communes dans la ville et dans la campagne de Mantoue; quelles en sont les causes et quelles seroient les moyens de s'en préserver?)

Praemium erit duplex. Praeterea hic legibus huius academiae enarrandis non immorabimur, cum facile ex superioribus possint repeti *).

Regia scientiarum societas *Monspeliensis*, cuius originem, constitutionem et historiam dedimus alio loco **), tres potissimum proposuit theses, a nobis indicandas. Quarum prima est: *determinentur varii modi vel gradus spirituositatis aquae vitae vel spirituum vini per modum simplicem, et qui commercio respondeat.* (Déterminer les différens titres ou degrés de spirituosité des eaux de vie, ou esprits de vin par un moyen simple et applicable au commerce.)

Altera

*) vid. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 154.

**) vid. ib. Vol. XV. p. 196.

Altera est haec: *quinam praecipui characteres terrarum in genere, et quae media, quibus vitia eorum possint emendari, quae producendis cerealibus parum sunt aptae.* (Quels sont caractères principaux des terres en général, et les moyens de remédier aux défauts de celles, qui sont peu propres à la production des grains?)

Tertia ita se habet: *Quinam meteororum influxus in vegetationem, et quaenam consecretaria practica, quae ad haec spectant, profluunt, ex observationibus meteorologicis variis hactenus institutis?* (Quelle est l'influence des météores sur la végétation, et quelle conséquence pratique peut on tirer relativement à cet objet, des différentes observations météorologiques faites jusqu'ici?)

Praemium duarum priorum quaestionum, singulae sexcentarum librarum Gallicarum est, tertiae praemium constat centum aureis. Commentaria sub conditionibus consuetis ante 1 octobris diem 1774 tradenda sunt Cl. DE RATTE, qui societati perpetuo ab epistolis est.

Collegium medicorum *Lugdunense Gallicum* praemium monetae aureae septuaginta duarum librarum, et argenteae ducentarum viginti et octo librarum mense augusto 1774 his destinatum est quaestionibus, ex voto collegii elaborandis: *Quaenam variae sunt species herpetis; quaenam earum variae origines; quinam modi earum distinguendarum; quinam morbi interni, ex quibus haec vitia herpetica profluunt; quibusnam symptomatis eae possunt recognosci; quomodo haec diuersa initia in vario suo statu possunt caueri?* (Quelles sont les différentes especes de dartres; quels en sont les différens principes; quels sont les moyens de les distinguer; quels sont les maladies internes, que les vices dartreux produisent; à quels symp-
tômes

tômes peut-on les reconnoître; comment peut on combattre ces différens principes dans leurs différens états?)

Commentaria, idiomate gallico vel latino exarata ante 1 aprilis diem 1774 Cl. RAST filio, medicinae doctori in vniuersitate Monspeliensi tradenda sunt ita, vti mos est.

Societati scientiarum *Harlemensi* focii iuncti sunt medici, Experientissimi GEORG. BRUGMANNUS, P. BODDART et E. WAGLER.

Societati philosophiae actiuae *Roterodamensi* medicos iunctos legimus, nimirum ISAACVM BOUTEWYNSSEN, HERMANNVM BEZOET, et IAN. WYNGAARD. A consiliis vero societati sunt DAVIDES DE GORTER et ANDREAS BONN.

Eandem porro legimus constituisse, praemium quotannis vel duobus alternis annis eidem tribuere, qui optimum ex iudicio societatis inuentum ex quacunque parte philosophiae actiuae communicaturus sit. Quodsi Auctor sumtibus, qui experimentis, ad rem probandam necessariis, impendendi sint, non par esset, eorundem Societatem se habituram esse rationem eosdemque reddituram spondet.

Commentaria Cl. BLIKKER, directori et secretario primario tradenda sunt. Quaestiones iam propositas, cum non spectent finem nostrum, mitimus.

Praeterea et accepimus, Cl. GUALT. VAN DOEVEREN *Eidem* duo calculos dedisse, vnum insignis magnitudinis in vesica vrinaria, alterum paulo minorem in vrethra iuuenis, nephritide defuncti, repertos, adiuncta delineatione structurae renum, vrethe-

vreterum, vesicae vrinariae et vrethrae, quae traditae tractationi *super noua methodo vescam incidendi*, obseruationibus variis illustratae, respondeat.

Magno cum dolore b. CHRISTIANI GOTTLIEB LUDWIG, Ordinis medici Lipsiensis Decani mortem, quae die 7 maii 1773. anno aetatis sexagesimo quarto est subsequuta, his ipsis in commentariis, quorum IPSE auctor suaforque fuit, multisque profecto molestiis continuationem curauit, indicamus.

Gottingae, die 9 maii 1773. Experientissimus GEORGIUS MATTHIAE medicinae doctor, eiusdemque professor ordinarius, anno aetatis sexagesimo quinto apoplecticus mortuus est.

Ibidem d. 28 maii 1773. Cel. GEORG. GOTTL. RICHTERVS magnae Britanniae Regi a consiliis, archiater et medicinae prof. primarius, ordinisque medicorum senior, anno aetatis octuagesimo quarto senio confectus obiit.

Upsaliae NICOLAUS ROSEEN DE ROSENSTEIN, Eques stellae borealis et archiater, Regius Suecicus, cuius memoriam varia eius scripta conseruabunt diuque tuebuntur, die 16 iulii 1773. duodenogesimo aetatis, sept. anno ex hac vita discessit.

Ill. Eques MORAND, Protochirurgus in nosodochio Regio Parisiensi, omniumque academiarum Franco Gallicarum Socius d. 26 iulii anno aet. septuagesimo septimo obiit.

Diarium nouum Halae prodeundum, historiae naturali per tria regna dicatum, sub inscriptione: *Naturae indagator*, indictum legimus. Quaelibet eius pars vel elaborationibus, vel translationibus et relationibus ex optimis quibusque Anglicis Gallicisque diariis, quatenus historiam naturalem spectent, conficitur.

Quarum vnus quidem finis; triplici tamen facie diuerfus erit. Alii enim historiam naturalem, singularum Germaniae prouinciarum, sunt consideraturi, vt inde historiam naturalem totius Germaniae perficiant: alii peculiarem partem historiae naturalis, iam notabile animal, iam corpus fossile, iam regni vegetabilis historiam declaraturi sunt: alii denique nouas obseruationes, huius vel illius partis historiae naturalis, vel nondum detectae, vel haecenus non satis declaratae, adiicient.

Vbi Auctores id simul videbunt, vt classes, in tribus naturae regnis adhuc probatae, in maiorem et iustiore ordinem redactae seruentur. Nouae obseruationes, quibus historia naturalis conspicitur, quaeque exteris gratae acceptaeque habentur, bonis translationibus cuilibet parti, tanquam appendix, addentur.

Ex viris, historiae naturalis peritis, societas conflata est, quae, auctore et direttore Cl. WALCH, hoc diarium reddat. Quodlibet volumen quatuor constabit partibus, quarum singula intra duodecim septimanas, octo et duodecim plagularum prodibit.

Nauis Anglica *Endeauour* Cll. BANKS et SOLANDER annis 1764 et 1765 cet. iter maritimum ex mandato Regis ad detegendas prouincias absoluisse, eorumque inuenta noua sumtibus Regiis litteris mandata fuisse constat.

Iam vero Io. Frid. Ebert, bibliopolam Roterodamensem, et Buchenröder, et Ritter, bibliopolas Hamburgenses idem in linguam Germanicam et Gallicam transmutandum curaturos esse legimus: quorum singula, pecunia praenumerata, sensim eduntur cum figuris aeneis.

Iidem

Iidem translationem, ex mandato Regis suscepti, itineris ad Indiam Orientalem ab EIVES EXGS, cum figuris aeneis promittunt.

Christianhafniae in Dania scholam, veterinariae medicinae sacram, conditam esse, cui praesit Excellentissimus ABILGAARD, qui praelectiones publicas habeat, et ipsos auditores in praxi exerceat, accepimus.

XVIII.

Supplementum indicis scriptorum physico-medicatorum, quae anno 1766. prodierunt.

Hannöverisches Magazin, worinnen kleine Abhandlungen, einzele Gedanken u. s. w. zur Verbesserung des Nahrungsstandes gesammelt sind. Dritter Jahrgang von 1765. Hannover. 4.

Neues Bremisches Magazin zur Ausbreitung der Wissenschaften, Künste und Tugend, mehrentheils aus den Engl. Monatschriften, 1 B. 1 St. Bremen. 8.

Etrennes d'agriculture tres utiles aux laboureurs et à tous ceux, qui cultivent, ou qui afferment leurs terres. à Amiens. 12.

Histoire de l'agriculture ancienne, extraîte de l'histoire naturelle de PLINE Liu. XVIII. avec des éclaircissements et des rémarques. à Paris.

An impartial view of English agriculture, from permitting the exportation of corn in 1663. to the present time. London. 8.

Traité de la mesure des bois. à Paris. 8.

Unterricht eines Papiermachers an seine Söhne, diese Kunst betreffend; nebst einem Anhang, in welchem die neuen Papierproben des Hrn. D. SCHAEFFERS zu Regensburg kunstmäßig beurtheilet werden. Leipz. 8.

Deutliche Vorstellung der edlen Probierkunst, nebst einem Berichte vom Salpeter-Sieden. Nürnberg. 8.

L'art de faire le maroquin, contenant sept feuilles d'impression avec figures à Paris.

Mélanges intéressans et curieux, ou abrégé d'histoire naturelle, morale, civile et politique de l'Asie, l'Afrique et des terres polaires. Tonn. 6. 10. à Paris. 12.

The young lady's introduction to natural history; containing an account of the atmosphere, light and gravity, of the terraqueous globe of the origin of springs and fountains, earthquakes and volcanos; of fossils, mines and minerals; of vegetables, animals, beast, birds, fishes, insects etc. As also an introduction to the knowledge of the heavens; explaining the motion, magnitude and distances of the planets and satellites; with some account of the fixed stars By the editor of the young lady's geography. London. 12.

Recueil de divers traités sur l'histoire naturelle de la terre et des fosses. à Paris. 4.

Physicalische Beschreibung einer Hyäna. Nürnberg. 8. mai.

Kort begrip van de historie der insecten, uit het Fransch vertaald, met koopere platen, eerste stukje. Te Amsterdam. 8.

Het volmaakt burger-tuin-boek. Naa een langduurige ondervinding op vaste gronden te zaamengesteld, door een voornaem liefhebber. Te Delft. 8.

Démonstrations élémentaires de botanique, contenant, un abrégé des principes de l'histoire de cette science, et les élémens de la physique des végétaux; suivie d'une instruction sur la formation d'un herbier; la dessication, la macération, l'infusion des plantes, à Lyon. 8. 2 Voll. a.f.

Geneez - heel en natuurkundige verlustigingen, getrokken uit verscheide werken, over deeze wetenschappen in Europa uitgekomen of nog uitko-

uitkomende. Door een genootſchap. Eerſte Deel. No. 1 en 2. te Amſterdam. 8.

Medicus veri amator ad Apollineae artis alumnos, Moscouiae et Pariſiis, 8. (*auct. LE CLERC fertur.*)

De aarz of geneezheer in aangenaame ſpectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige, wyze leerende, wat men moet doen, om gezond lang en gelukkig te leeven. Tweede Deels tweede, en derde Deels derde ſtuk. Te Amſterdam. 8.

A diſſertation of the inflammatory, gangrenous, and putrid ſore throat; alſo on the putrid fever; together with their method of cure. London. 8.

Inoculation made eaſy; containing a full diſcovery of the method, praſtiſed in Eſſex, whith recipes to make the preparatory powders, repellent pills, and caoling decoction. *ibid.* 8.

De nieuwe Nederduitſche apotheek; geevende een duidelyk en klaar onderwys wegens de beſte dagelyks gebruikte artzenykundige bereidingen, in de apotheken vereiſcht, en volgens de gronden van BOERHAAVE, GEOFFROY en andere beroemde mannen zoo nauwkeurig beſchreeven, als tot nog toe in onze taal niet geſchied is. Tweede druk van miſtellingen gezuivert, en met verſcheide nieuwe voorſchriften, verbeteringen en Nederduitſche bladwyzer vermeerderd. Te Leiden. 8. (*Auctorem VAN EEMS dicunt.*)

Précis de la méthode d'adminiſtrer les pilules toniques dans les hydropſies. à Paris 12.

Eſſays on the praſtice of midwifery. London. 8.

Der Engliſche und bewärte Roßarzt, welcher von den Eigenſchaften, Urfachen und Curen aller
L 3 Krank-

- Krankheiten der Pferde Unterricht giebt. Aus dem Englischen. Leipzig. 8.*
- Beschreibung von der entdeckten Ursache der Viehseuche; nebst einem Vorschlage, wie diesem großen Uebel vorzubeugen. 8. f. l.*
- Kurze Beschreibung von der entdeckten Viehseuche, ihrer schädlichen Wirkung und Todesbeförderung; nebst beygefügtten Vorschlage, wie diesem Uebel vorzubeugen. Rostock. 8.*
- A commentary on the dysentery, or bloody flux. translated from the latin of MARK AKENSIDE by JOHN RYAN. London. 8.
- ANT. GERM. ALBERTIZ Prodrömus recensio-
nis criticae historiae medicae, cum animaduer-
sionibus anatomico practicis. Viennae Austriae. 8.
- G. L. ALEFELD diss. med. de fluore albo, ex ne-
glectu feminarum Belgicarum praecipue pro-
pullulante. Giesae. 4.
- Elements of midwifery. Containing the most mo-
dern and successful method of practice in every
differend kind of labour. With a short history
of the art of midwifry, and an answer to a ca-
suiistical letter on the conduct of Adam and Eve,
at the birth of their first child. By IO. ASTRUC,
translated with additions and explanatory notes
by S. RYLEY. London. 8.
- IO. DAV. BARTHELEMVS diss. de patellae usu, eius-
que laesionibus et curationibus. Lugd. Bat. 4.
- J. PAUL. BÄVMERS *Unterricht, wie man einem
Menschen, wie auch Thieren, so von einem tollen
Hunde gebissen worden, auf eine vernünftige und
leichte Art helfen soll. Erfurt. 4.*
- Manuel du naturaliste pour Paris et ses environs,
contenant une description des animaux, vé-
gétaux et minéraux, qui s'y trouvent, telle
qu'elle est nécessaire, pour les faire reconnoi-
tre;

tre; avec les particularités intéressantes de leur histoire, principalement leurs usages dans les arts et la médecine, précédé d'un mémoire sur l'air, la terre et les eaux du pays; sur la constitution, les mœurs et les maladies de ses habitants; sur l'agriculture cet. terminé par un essai, sur l'histoire naturelle des autres contrées du Royaume; recueilli et mis dans un ordre commode par ACHILLE, GVILL. LE BEGVE DE PRESLE. à Paris. 8.

PET. ION. BERGIVS *Abhandlung von den kalten Bädern überhaupt, und von dem Baden in Loka insonderheit; aus dem Schwedischen übersezt, von I. G. GEORGI, zum Druck befördert, und mit Anmerkungen, auch einer Vorrede vom Nutzen des Badens überhaupt, und insonderheit der kalten Bäder versehen, von I. I. RHADES. Stettin. 8.*

Pharmacopoea medica auct. IO. BERKENHOVT. London.

IOH. VLR BILGUERS *Abhandlung von dem seltenen Gebrauche, oder der beynahe gänzlichen Vermeidung des Ablöfens der menschlichen Glieder. Zwote Auflage. Leipzig. 8.*

ABEL EPPO VAN BOLHVIS *specimen medicum de hydropo. Groning. 4.*

The contemplation of nature, translated from the french of C. BONNET. In two volum. London. 12.

Nouvelles recherches sur la France, ou recueil des mémoires et des lettres sur quelques villes et provinces du royaume; Ouvrage qui peut servir de suite, à l'état de la France, de Mr. DE BOULAINVILLIERS et à la description de PIGANOT, à Paris. 12. 2 Voll.

BOURROU quæstio medica: an satius sit cathet-
rem in media suae curvaturae parte foraminulo
vtrinque pertundi, quam versus apicem? Paris. 4.

Mémoire sur le traitement des fistules à l'anús, par
la ligature; ou nouvelle methode de les guérir
sans opération par Mr. **BOUSQUET**. Ou l'on
a joint le rapport de Mr. **ACREL**, chirurgien,
donné à l'academie des sciences de Stockholm,
sur ce mémoire, avec la reponse de l'auteur. 8.

*(quae tractatio non idiomate Franco gallico solum,
sed et in Suecico scripta est, contra quam haec, quae
sequitur, prodiit :*

Paomineller vid Herr **BOUSQUETS** Roön om
Fistular in ano, Besynnerligen vid det, som han
deruti berättat, rörande Kongl. Vetenskaps
Academien och twänné dess Ledamoter.
Stockholm. 8.

Dissertation sur l'abus du chinchinae par Mr. **BOUS-**
QUET. ib. 8. *(et haec dissertatio in Suecicam
linguam translata fuit, contra quam sequens in-*
surrexit :

Anmärkningar vid en af Herr **BOUSQUET**
utgifven Afhandling om China barkens mis-
bruk. ib. 8.

Le parfait boucher, ou instruction concernant la
connoissance des boeufs et des vaches, leur âge,
maladies et leur symptômes, avec les remèdes,
les plus expérimentés propres à les guérir. On
y a joint deux petits traités, pour les moutons
et porcs, ainsi que plusieurs remèdes, pour les
chêvaux aussi expérimentés, et qui n'ont point
encore paru, le tout le plus abrégé, qu'il a été
possible. Par Mr. **BOUTROLLE** à Rouen et
à Paris. 12.

JAC. HERON. BRANTS vollständiges Kräuter-
und Hausarzneibuch. Nürnberg. 4.

WILH. ANT. BRUNNERS *Einleitung zur nöthigen Wissenschaft eines Zahnarztes. Wien und Leipzig, gr. 8. m. K.*

H. W. BÜCKINGS *unentbehrliches der Wundheilkunst. Wolfenbüttel. 4.*

An account of the preparation and management, necessary to inoculation. By Mr. IAM. BURGER. The second edition, which large additions and improvements. London. 8.

HIPPOCRATES contractus, in quo magni HIPPOCRATIS, medicorum principis, opera omnia in brevem epitomen summa diligentia redacta habentur, studio et opera TH. BURNET. M. D. editio nova, diligenter correcta. Argentorati. 8.

IO. FRID. CARTHEUSER *Tabulae formularum medicarum editio tertia. Francof. ad Viadr. 8.*

EIVSD. *Elementa chemiae dogmatico experimentalis editio tertia. ibid. 8.*

CEZAN *quaest. med. an in parte mortua sectio post fiderationem? Parisiis 4.*

Histoire naturelle des fraisières, contenant les vues d'économie réunies à la botanique; et suite de remarques particulières sur plusieurs points, qui par Mr. DU CHESNE ont rapport à l'histoire naturelle générale. à Paris. 12.

IO. CLARKSEN *diff. de mulierum menstrua consuetudine. Lugd. Bat. 4.*

Examen chymique de l'eau minerale de l'Abbaye Desfontenelles en Poitou près la Roche sur-Yon, par Mr. CORDON D. en M. (prostat in diario medicinae, journal de médecine ad annum. 1766.)

LVD. CORNARO *Vorstellung von dem Nutzen eines nüchternen und mäßigen Lebens, aufs neue herausgegeben von D. T. G. SCHWENKEN. Frankf. und Leipzig. 8.*

- HEN. IO. NEP. CRANZII *Laudatio funebris in mortem D. D. GASSER Vindobon. fol.*
- FRANS LVD. CRANZIVS *practische Abhandlung von der Zubereitung der Zugutmachung der Kupfererze. Frankf. am M. 8.*
- SAM IVST. DEDEKIND *diff. de tussi in genere et epidemia illa, quae hoc anno saeuuit. Rinteli. 4.*
- IOH. DEIGENDESCH *nützliches und aufrichtiges Pferd-oder Roßartzeneybüchlein, mit einen Anhänge von Rindvieharzneyen. Neue verbesserte Ausgabe. Tübingen. 12.*
- IOH. ANDR. DEISCH *Abhandlung, daß weder die Wendung, noch Englische Zange in allen Geburtsfällen vor Mutter und Kind sicher gebraucht, und dadurch die scharfen Instrumente gänzlich vermieden werden können. Frankf. 8. m. K.*
- AVG. FR. DELIVS *Beobachtungen und Untersuchungen, welche das Geschäfte der Erzeugung und die Geburtshülfe betreffen. Nürnberg. 8. m. K.*
- DIEDER. VAN DVYN *Diff. de vitiata lochiorum quantitate. Lugd. Bat. 4.*
- SYLV. DOUGLASS *diff. de stimulis. ibid. 4.*
- CLAVD. PETR. ELLII *inuestigationes luis bovillae, iussu ac sumtu S. M. R. Daniae institutae. Hafniae et Berolin 4.*
- ALB. HENR. ENGELBERT VAN BAVCHEM *diff. de oeconomia fetus animalis. Lugd. Bat. 4.*
- M. ENZENSPRENGER *diff. de marte. Ingolstadii. 4.*
- D'ESTON *quaestio medica: an vulneribus ex catapultis globulos plumbeos relinquere aliquando praestat? Parisiis. 4.*
- Mémoires sur le saffran par Mr. DES ESSARTS à Orleans et à Paris. 8.
- Traité des maladies vénériennes par Mr. FABRE. à Paris. 2 Voll. 12.

IO. FRIDR. FASELII diff. de spina bifida resp.
Chph. Dau. Heumann. Ien. 4.

EIVSD. Progr. de effectibus noxiis, quos producit
in corpore humano abusus fructuum horaeorum.
ibid. 4.

LVDW. FEUILLEE *Beschreibung zur Arznei dien-*
licher Pflanzen, welche in Peru und Chily vor-
züglich im Gebrauche sind. Nürnberg. 4. 2. Thei-
le. m. K.

Observations on the gout and rheumatism — with
a short account of some medicines and ways of
curing diseases, used by the native Indians. To
which are added a few remarkable cases of other
diseases by HENRY FLOWER. London. 8.

Guide du Maréchal, ouvrage contenant une con-
noissance exacte du cheval, et la manière de
distinguer et de guérir ses maladies; ensemble
un traité de la ferrure, qui lui est convenable
par Mr. LA FOSSE, à Paris. 4. a. f.

RAIM. DE LA FOURCADE quaestio anatomico
chirurgica de optima et tutissima celeberrimi
Rothomagensis Professoris methodo, qua in viris
calculosis celebratur sectio lateralis. Resp. Io.
Car. Grossar à Bourdeaux. 8. a. f.

VON FRANKENAU *Flora Francica oder voll-*
ständiges Kräuterlexicon. Sechste Auflage. Zül-
lichau. 8.

Lettre de Mr. FROASSARD, D. en M. à Chau-
mont en Boffigny à Mr. ROYER, ancien chi-
rurgien, Aide - maior des armées du Roi, sur
l'effèt des lavemens antivénériennes. à Paris. 12.

I. I. GARDANE quaestio medica: an *Sageu* phthi-
sicis? Parisiis. 4.

I. I. GARDANE qu. med. an, rescisso testiculo, funiculum spermaticum ligare malum? Paris. 4.

C. A. GENTERBRUCKS *gesammelter Unterricht von Schaafen und Schäfereyen, zum Behuf der dabey vorkommenden andern Geschöpfen. Erster Theil. f. l. 8.*

D. GEMORY diss. de indole aëris Hungarici. Vindob. 8.

Essai sur le gout; traduit de l'anglois, par Mr. ALEX. GERARD; avec trois dissertations sur le même sujet par Mrs. VOLTAIRE, D'ALEMBERT et DE MONTESQVIEU. à Paris. 12.

GUERRET quæst. med. vtrum in pectoris paracentesi satius sit in parte laterali et antica sectionem instituere, quam ad partem posticam? Parisiis. 4.

FRANC. GVERIN diss. de vegetabilibus Alsatiæ. Argent. 4.

Histoire de la découverte faite en France des matières semblables à celles, dont la porcelaine de la Chine est composée; lue à l'assemblée publique de l'académie royale des sciences le mercredi. 13 Nov. 1765. par Mr. GUETTARD de la même académie. à Paris. 4.

GUILBERT qu. m. an bubones, febribus malignis supervenientes, immaturi causticis aperiendi? ib. 4.

DU HAMEL DU MONCEAU *Erklärung der Kunstwörter aus der Botanic, und von dem Landbau, Französisch und deutsch. Nürnberg. gr. 8.*

CH. RVD. HANNES de puero epileptico foliis aurantiorum recentibus sanato. Vefaliae. 8.

P. I. HARTMANN diss. de medendi methodo in prouocandis hæmorrhoidibus sæpius peruersa. Resp. C. C. Göhde. Francof. ad V. 4.

- IO. MART. HEMERLE diff. inaug. de secessione
terrae a communi humorum massa. Argentor. 4.
- IOH. HILLS *Geschichte der Fossilien und ihrer Tu-
genden in der Arzneykunst und den Künsten, aus
dem Engl. übersetzt von C. I. G. WESTFELD.
erster Theil. Gotha. 8.*
- I. CHPH. HIRSCHENS *gesammelte Nachrichten
der Oeconomie - Gesellschaft in Franken, auf das
Jahr 1765. Anspach. 4.*
- IO. PAUL. HOFMANN diff. de forcipe SMEL-
LII in praxi obstetricia antepnenda vecti Roon-
huyfiano. Groning. 4.
- IOH. GOTTF. IUGELS *natürliche Berg - Schmelz
und Figirkunst in 3 Theilen verfasst. Leipzig. gr. 8.*
- LUD. GOTTF. KLEIN selectus rationalis medi-
caminum. Francof. 8.
- AUG. WILH. KOPP de spina ventosa, morbo
chirurgico medico. Rintelii. 4.
- IO. CATOYSONERE GEFFRYS de morbo va-
rioloso. Lugd. B. 4.
- LANGLOIS qu. m. vtrum in ascite paracentesi
tardare malum? Parisiis. 4.
- MART. FROBEN. LEDERMULLER amusement
microscopique tant pour l'esprit, que pour les
yeux. à Nürnbg. 4. mai. a. f.
- E. G. LIDBECK Tal om planteringar. Stock-
holm. 8.
- F. B. VAN LINDREN Speculum veneris, oder
*Venuspiegel, worinnen sich ein jeder ansehen, und
die aus einer unreinen Liebe entstehenden abscheu-
lichen Zufälle warnehmen kann. Neue Auflage.
Strasb. 8.*
- CAR. LINNAEI diff. de effectu et cura vitiorum
diaeteticorum generali. Resp. Io. Gabr. Berg-
mann. Upsaliae. 4.

CAR. LINNAEI diff. de usu muscorum, breuiter delineato. Resp. Andr. Henr. Belip. ibid. 4.

Observations upon the growth and culture of vines and olives: the production of silk, the preservation of fruits. Written, at the request of the earl of Shaftesbury, to whom it is inscribed. By Mr. JOHN LOCKE. Now first printed from the original manuscript, in the possession of the present earl of Shaftesbury. London. 8.

ANT. CAR. LORRY de melancholia et morbis melancholicis. Tomm. II. Parisiis et Lipsiae. 8.

E. LUDGERS diff. de hysteride. Lugd. Bat. 4.

DAY. MACBRIDE, *Chirurgi, durch Erfahrungen erläuterte Versuche über folgende Gegenstände.*

1. Von der Gährung der zur Nahrung dienenden Mischungen. 2. Von der Natur und den Eigenschaften der fixirten Luft. 3. Von den gegeneinander gehaltenen Kräften und Art zu wirken, der verschiedenen Gattungen der Fäulung widerstehenden Sachen. 4. Von dem Scharbock, nebst einem Vorschlage, neue Wege zu versuchen, denselben auf der See entweder zu verhüten oder zu heilen. 5. Von der auflösenden Kraft des Kalchs. Aus dem Engl. übersetzt von CONR. RAHN M. D. Zürich. 8. m. 2. K. t.

IO. M. MATHIS diff. de dysenteria. Viennae. 8.

FRID. LVDOV. MAY diff. de amplitudine generis februm bibliotarum. Gottingae. 4.

Recherches sur la population des généralités d'Auvergne, de Lyon, de Rouen, et de quelques provinces et villes du royaume; avec de réflexions sur la valeur du bled, tant en France, qu'en Angleterre depuis 1664. jusqu'en 1764. par Mr. MESSANCE, récéveur des tailles de l'Élection de St. Etienne. à Paris. 8.

CASP. NEUMANN'S grondelyke en met proeven bewezende medicinaale en natuurkundige chymie, om zyn groote nuttigheit uit het hoogduitsch vertaald, en hier en daar met ophelderende aantekeningen vermeerderd, door een voornaem liefhebber der Scheikunde. Eersten Deels eerste Stuk. Te Leeuwarden. 8.

ERN. ANT. NICOLAI diff. de praestantia methodi antiphlogisticae febres continuas curandi. Resp. Ch. Theoph. Mayer. Ien. 4.

EIVSD. diff. de purpura. Resp. Chr. Theoph. Hufeland. ibid. 4.

ADAM. NIETZKY de humoribus intestinorum tenuium, physiologice consideratis, generatim. Halae. 4.

EIVSD. de humoribus intestinorum tenuium, pathologice consideratis. ibid. 4.

GEORGE CHRIST. OEDER *Einleitung in die Kräutererkenntniß. 2 Theil. Copenhagen. gr. 8. m. K.*

A. B. PELEE DE VALANCOURT quaest. med. an rabiei opium? Parisiis. 4.

EIVSD. qu. m. an inter apostemata pauca ferro sunt aperienda? ibid. 4.

IO. LE PLECKIN specimen de acetificatione. Argentor. 4.

PLINII secundi Histor. Natur. lib. XXXVIII. accedit chrestomathia, indicibus aliquot copiosis exposita, curante IO. PETR. MILLERO. V. Tom. Berolini. 8.

E. DE LA POTERIE DE CONTANCES quaestio medica: an in curando hypopyo incisioni corneae praestet embroche? Paris. 4.

PERC. POTTS *Abhandlung von den Brüchen des menschlichen Körpers, für deutsche Wundärzte in unsere Sprache übersetzt. Göttingen und Gotha. 8. Nützlich-*

Nützliche Beyträge zur Oeconomie und dem Landwirthschaftlichen Leben von dem Freyherrn von G. L. I. R. Frankf. und Leipzig. 8.

I. H. RAHNS *Abhandlung von der Natur, Eigenschaft, Wirkung und dem Gebrauche des Nydelbades. Zürich. 8.*

CORN. RAHNS *Anleitung zur richtigen Erkenntniß und vernünftigen Heilung der Ruhr. Zürich. 8.*

CHR. TOB. EPHR. REINHARDS *Ausmessung des menschlichen Körpers und der Theile desselben zum Gebrauche der Aerzte, Mahler und Bildhauer. Glogau. 8. m. K.*

EIVSD. *Bibelkrankheiten, welche im alten Testamente vorkommen. 1 - 2ter Theil. Ebend. 8.*

DAN. DE LA ROCHE *descriptiones plantarum aliquot nouarum. Lugd. Bat. 4. c. f.*

CHR. RICKMANN *Osteologische Abhandlungen. Jena. 4.*

M. ROSA *Saggio di osservazioni sopra alcune malattie particolari. In Venezia. 8.*

M. SAXTORPH *Erfahrungen, die vollständige Geburt betreffend, so auf dem Königl. freyen Geburtshause in Kopenhagen angestellet sind; zugleich mit der theoretischen Lehre derselben. Aus dem Dänischen. Copenhagen. 8.*

IOH. GOTTLOB SCHAEFERS *Geschichte des grauen Staars und der neuen Operation, solchen durch Herausnehmung der Crystallinse zu heilen. Regensp. 4. m. K.*

AUTOR. SCHLAPPRIZI *diff. de vitiata lochiorum qualitate. Lugd. Bat. 4.*

M. SENDIVOGII *nouum lumen chemicum, aus dem Brunnen der Natur, durch Hand angelegte Erfahrung bewiesen. Nürnberg. 8.*

C. SEPP. Nederlandsche Insecten. Vierde stuk
agde Verhandeling, en zesde stuk vierde
Verhandeling. s. l.

W. SERVAAAS diff. in fundamenta et certitudinem
medicinae inquirens. Lugd. Bat. 4.

Verzaameling van tegennatuurlyke gevallen en
waarneemingen in de vroedkunde door WILL.
SMELLIE, volbrengende zyn voorneemen, om
het eerste deel, handelnde over dit onderwerp,
optehelderen; na het tiende deel in het Hol-
landsch gebracht door MATTHYS VAN DER
HAAGEN. Te Amsterdam. 4.

G. STARK diff. sistens septem historias et dissec-
tiones dysentericorum. Lugd. Bat. 4. c. f.

LVC. VAN STEVENINCK diff. de hysterica pas-
sione. ib. 4.

A narrative of the surprizing effects of the meadow
saffran in the cure of the dropsy. Translated
from the latin of Dr. ANT. STOERCK. To
which are added observations, and an account
of the hydrocephalus, by the translator.
London. 8.

Mémoire sur la mortalité de moutons en Boulon-
nois par Mr. DE SVRAD. à Paris. 12.

Practical observations on the culture of lucerne
turnips, barnet, timothig-grass and forol mea-
dow grass, communicated by letters to Dr.
TEMPLEMAN, secretary to the society of arts
etc. London. 8.

DAN. TILAS *Entwurf einer Schwedischen Mineral-
historie, aus dem Schwedischen übersetzt, von IOH.
BECKMANN. Stockholm und Leipzig. 8.*

HENR. GOTTL. NEPOM. TROSCHELS *er-
forschliche Nachrichten von dem Biliner Sauer-
brunnen, nach der neuesten Auffuchung des waren,
reinen Quellwassers. Leipzig. 8.*

Tom. XIX. P. I.

M

HENR.

HENR. GOTTL. NEP. TKOSCHELS *nothwendige Nachricht von dem warhaften Bömischen Bitterwasser, Seydschützers Ursprungs. Leipzig. 8.*

GASP. VIEUSSEUX *diff. de erectione. Lugd. Bat. 4.*

ABR. WALKART *diff. de consensu. ib. 4.*

A. WESTPHAL *diff. de nephrotomia. Resp. Zach. Falck. Gryphiswaldae. 4.*

EIVSD. *diff. aegroti, arthritide laborantis, historiam exhibens. Resp. H. C. Masio. ibid. 4.*

EIVSD. *diff. de febre biliosa, perversa methodo tractata, ac in febrem quartanam, tandemque in hydropem ascitem degenerata. Resp. P. G. Arnold. ibid. 4.*

Some histories of wound of the head etc. with observations. To which are added a few remarks on the convulsive cough of the year 1764. in Cornwall by JOHN WILLIAMS. London. 8.

CHR. LVD. WILlich *illustrationes quaedam botanicae. Gottingae. 8.*

Gazophylacium medico-physicum, of Schat-Kaamer der geneez en natuurkundige zaaken, behelzende de meeste kunstwoorden, die in de geneezkunde gebruikelyk zyn. Verhandelingen van veele in en uitwendige ziekten, beneffens derzelver geneezmiddelen: alle de mineraalen, metaalen en aarden: vreemde en inlandsche dieren, kruiden, bloemen, zaaden, sappen, olien, harssen etc. En alle zeldzaame spezereyen in de medecynen gebruikelyk. En ten laatsen veele fraaye tot de werktuigkunde behoorende handgreepen: alles in een welgepaste orde naar't latynsche alphabet't zaamgesteld, en in de hoogduitsche taale beschreeven door JOHANN JACOB WOYT. Naar den veertienden druk op nieuws vertaald, en met verscheide artykels vermeerderd. Tweede nederduitsche druk. Te Amsterdam. 4.

XVIII.

Supplementum indicis scriptorum physico-medicatorum, quae anno 1767. prodierunt.

Neues Bremisches Magazin zur Ausbreitung der Wissenschaften, Künsten und Tugend, mehrentheils aus den Engl. Monatschriften. 2.3tes Stück. Bremen. 8.

Abhandlungen und Beobachtungen, durch die öconomische Gesellschaft zu Bern gesammelt. 7ter Jahrgang. Bern. 8.

Natuurkundige verhandeligen, of verzameling van stukken de natuurkunde, geneezkunde en natuurlyke historie betreffende: getrokken uit de geachte werken von Engelsche, Fransche en Hoogduitsche schryvers, en toteene nutte opleiding in gemelde weetenschappen, ten dienst van onze vaaderlanders vertaald. Te Amsterdam. 8. No. I. II.

Hibernia curiosa. A letter from a gentleman in Dublin, to his friend at Dover in Kent: giving a general view of the manners, customs, dispositions etc. of the inhabitants of Ireland. With occasional observations on the state of trade and agriculture in that Kingdom etc. London. 8.

Natuurlyke historie, of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het zamenstel van den Heer LINNAEUS. Met naauwkeurige afbeeldingen. Eersten deels elfde stuk. Vervolg der Insekten. Te Amsterd. 8.

Kort begrip van de historie der insekten; uit het Fransch vertaald, met koopere platen, tweede stuk. Te Amsterdam. 8.

Mémoires sur quelques fossiles d'Artois, pour servir à l'histoire naturelle de cette province, par un membre de la société littéraire d'Arras. 12.

- An essay on the bite of a mad dog. London. 8.
- Traité sur la connoissance et la culture des iacintes.
à Avignon et à Paris. 12.
- Traité des tulipes, qui contient généralement ce
qui concerne l'éducation de cette fleur. ibid. 12.
- Traité des rénoncoules, qui contient tout ce qui
concerne l'éducation de cette fleur. ibid. 12.
- Nuove rauolta d'autori che trattano del moto dell'
aque in Parma. 4. voll. 4. c. f.
- An account of the Somersham water in the coun-
try of Huntingdom. 8. f. 1.
- Neue Sammlung von einigen alten und sehr rar ge-
wordenen philosophischen, und alchymischen Schrif-
ten, 1ter Band. Wien. 8.*
- Idée générale des vertus médicinales de l'eau pure
et du sel commun. à Francfort. 8.
- Gazette salutaire composée de tout ce que contien-
nent pour l'humanité les livres nouveaux, les
journeaux et autres écrits publics, concer-
nant la médecine, la chirurgie, la botanique, la
chymie cet. à Bouillon. 4.
- Landtmanna-vânnen, som af Hushaolls- och Läka-
reböcken sommanletat de vigasta Hushaolls-
grop, Anvisning til et nått Landtapothek, som
sâkra, lätta och bepröfvade Huscurer. Upsala. 8.
- Pharmacopoea Palatina, siue dispensatorium medi-
co pharmaceuticum, in lucem emissum ex con-
silio medico Electorali Palatino. Manhemii. 4.
- Observations of specific medicines and various di-
seases, incident to the human body; especially
those that proceed from some disorder of the
uterus, or the diseases peculiar to women. By a
physician in the country. London. 8.
- Observations sur les effets d'un remède contre les
maladies cancreuses. à Amsterdam. 8.

Differ-

Dissertations, qui ont remporté les prix, adiugés par l'académie royale des sciences et belles lettres de Prusse, en 1766, sur la nutrition et sur la vie d'Archimede. à Berlin. 4. c. f.

Tal om nödvändigheten och foermaonen af de chirurgiska Handalagens foerkortande i utoefningen, haollit foer Kongl. Vetensk. Akademien vid Praesidii nedläggande den 15 Julii 1767. af OLOF ACREL. M. D. cet. Stockholm. 8.

The art of midwifery, reduced to principles: in which are explained the most safe and established methods of practice in each kind of delivery; with a summary history of the art, translated from the French original, written by the late Dr. ASTRUCO which is added an appendix by the translator. London. 8.

H. A. BACHIE NE diss. de secretione lactis in mammis muliebribus. Ultrajecti ad Rh. 4.

An essay concerning the cause of the endemial colic of Devonshire, which was read in the theatre college of Physicians in London, on the 29 day of June 1767. by GEORGE BAKER. London. 8.

C. BAYER diss. de vano et superfluo remediorum in restauranda sanitate usu. Argentor. 4.

S. S. BEDDEI diss. de verme, taenia dicto. Vienne. 8.

EIVSD. qu. med. an sola pars bilis colorata in intestinis deponatur? ibid. 4.

H. A. BELANGER quaestio med. an aliae a Sequanicis aquae Parisiensibus ad potum desiderandae? Paris. 4.

Medical essays and observations by CHARLES BISSET. Lond. 8.

PH. AD. BOEHMER diss. de malignitate variolarum naturalium, tempestivo vesicatoriorum usu avertenda. Resp. C. C. Meuschen. Halae. 4.

Algemeen en bereedeneert woordenboek der natuurlyke historie: behelzende de historie der dieren, planten en mineraalen, en die der hemelschen lighaamen, der verhevelingen en andere voornaame verschynselen der natuur: benevens de historie en beschryving der enkele drogerijen, welke de drie ryken opleveren; hun gebruik in de geneezkonst, in het gemeen leven, landbouw, konsten en handwerken. Uit het Fransch van den Heere VALMONT DE BOMARE door CHARLES PAPILLON. I Deel. Te Dordrecht. 4.

L. H. BOURDELIN quaest. med. an in lecto undique clauso dormire noxium? Parisiis. 4.

ANDR. EL. BUECHNER diss. de inflammatione, eiusque in tela cellulosa frequentissima sede. Resp. C. Fr. Richter. Halae. 4.

EIVSD. diss. de damnis, ex praemature suppressis haemorrhagiis vulnerum oriundis. Resp. I. I. Wolff. ibid. 4.

EIVSD. diss. de abortu, ob chronicam et torminosam diarrhoeam non semper metuendo, occasione singularis casus. Resp. A. N. Gerlach. ibid. 4.

EIVSD. diss. de nonnullis ad rabiem caninam et hydrophobiam pertinentibus. Resp. C. G. Haffner. ibid. 4.

EIVSD. diss. de prophylactica purpurae albae per balnea curatione. Resp. I. A. Glaeser. ibid. 4.

EIVSD. diss. de auditus difficultate circa febrium acutarum decrementum occurrente. Resp. I. E. Fischer. ibid. 4.

F. THIERY DE BUSSY quaest. med. an anginae spuriae, periodice recurrenti, catharsis? Parisiis. 4.

COLOMBIER quaest. med. an melancholicis peregrinatio? ib. 4.

COLOMBIER qu. m. an prius lentescat chylus, quam in omnes corporis humores abeat? Paris. 4.

I. A. COUTAVOZ qu. m. num arteriae, vti sensibiles, sic irritabiles? ibid. 4.

EIVSD. quaest. med. an Parisinis salubrius vere, quam autumnino rusticari? ibid. 4.

Historie van Groenland, behelzende eene naauwkeurige beschryving van's lands-ligging, gesteldheit en natuurlyke zeldzaamheden, den aart, zeeden en gewoonten der inwooneren aan de westzyde by de strate Davis; 's lands aloude en nieuwe geschiedenissen; en in't byzonder de verrichtingen der missionarissen van de Broeders - kerk, door welken twee gemeenten van bekeerde Heidenen aldaar gesticht zyn: alles in eigen persoon onderzocht en opgesteld door DAV. CRANZ. Te Harlem. 8. Voll. 3.

DECOMBE *Beschreibung von den Pflirsichbäumen und deren Cultur. Frankf. am Mayn. 8.*

Histoire exacte et description complete des os du corps humain par Mr. DEIDIER. à Paris. 12. voll. 2.

D. I. DELABRICHE quaest. med. an illud apprime ad sanitatem utile, ne quid nimis? ibid. 4.

EIVSD. quaest. m. an concocta mouere ac purgare oportet, non vero cruda? ibid. 4.

I. C. DESESSARTZ quaest. med. an ab omni re cibaria vasa aenea prorsus ableganda? ibid. 4.

Lettre sur la mortalité des chiens dans l'année 1763, par Mr. DESMARS, médecin pensionnaire de la ville de Boulogne. ibid. 12.

I. P. E. DUMANGIN quaest. med. an post longas defatigationes subito instituta vita deses periculosa? ibid. 4.

EIVSD. qu. m. an pro varia aetate variat temperamentum? ibid. 4.

I. B. L. P. DUMONT theses anatomico chirurgicae de fracturis. Resp. I. Babel. ibid. 4.

B. DUPUY quæst. med. an, sicut ad morum integritatem, ita ad sanitatem conseruandam, consuetudinum abusus noxius? ibid. 4.

EIVSD. qu. m. an præstet medicum diversas exercere medendi methodos? ibid. 4.

S. A. VON EMDEN diss. de hydrope. Ultrai. ad Rhen. 4.

L. I. G. FISCHERS *kurzer und deutlicher Unterricht, wie man bey einer grassirenden, contagieusen Ruhr seine Gesundheit erhalten solle. Frankf. und Leipz. 8.*

Essai sur les pouls par rapport aux affections des principaux organes par Mr. FOUQUET, à Paris. 8.

I. P. FREIER diss. de partu difficili propter funiculum umbilicalem, fetus collum stringentem. Halae. 4.

PETR. GABRIELS *Kunsterfarner Blumen-Küchen- und Baumgärtner. Neue vermehrte Auflage. Tübingen. 8.*

Ananas; or treatise on the pine-apple: in which the whole culture, management and perfecting this most excellent fruit, is laid down in a clear and explicit manner. To which is added the true method of raising the finest melons with the greatest success; shewing the whole process of their management, from sowing the seeds to ripening the fruit. Illustrated with a curious copper plate, in which is exhibited, at a view, a slave etc. Peculiarly adapted for raising the pine apple plant. By JOHN GILES. London. 8.

A. I. B. M. GUENET quæst. med. an sui sint capiti, pectori et abdomini et artubus sensus peculiares, et reliquorum corporis humani sensuum reuera principes? Parisiis. 4.

B. GUERARD diss. de causis repentinae mortis ex morbo iliaco non semper gangraenae, sed potius suffocationi pulmonicae adscribendis. Duisburgi. 4.

- ALB. VON HALLERS *Beschreibung verschiedener Salzwerke in der Schweiz. Bern. 8.*
- EIVSD. *Elementt. physiol. corporis humani. Tom. III. IV. editio nova. Lausannae. 4.*
- EIVSD. *primae lineae physiologiae in usum praelectionum academicarum. Edimburgi. 8.*
- Practical directions, shewing a method of preserving the perinaeum in birth, and delivering the placenta without violence, illustrated by case. By JOHN HARVIE. London. 8.*
- IO. GEORG. HASENESTS *des medicinischen Richters oder actorum physico-medico forensium collegii medici Onoldini 2ter Theil. Neue Auflage. Anspach. 4.*
- I. CHR. HIRSCHERS *Fränkisches Bienenbuch. ibid. 8. m. K.*
- The practice of inoculation justified. A Sermon preached at ingatestone. Essex, 12 Oct. 1766. in defense of inoculation. To which is added an appendix on the present state of inoculation; with observations cet. By ROBERT HOULTON, the second edition. Lond. 8.*
- F. W. JERICHO *diff. sistens modum sectionis oculi, in cataracta instituendae, variasque circa ophthalmotomiam cautelas; cui accedit observatio practica de tumore oculi insolito. Ultrajecti ad Rhenum. 4.*
- F. C. IUNCKER *diff. explicans exanthematum diuerforum complicationem et vicissitudinem. Resp. T. A. Krüger. Halae Magd. 4.*
- CHRIST. FRIED. KALTSCHMIED *Pr. exhibens casus quosdam aegrorum hydropicorum. Ien. 4.*
- EIVSD. *Pr. de steatmate, fame curato. ibid. 4.*
- EIVSD. *diff. de secretionibus. Resp. A. A. Hamburger, ibid. 4.*

- CHRIST. FRIED. KALTSCHMIED diff. de primipara, dolores post partum passa, ex intempestiva abdominis passione. Resp. *J. G. Hartmann*. ibid. 4.
- A. C. KESLER diff. de inflammatione sanguinea five vera, pathologice considerata. Halae. 4.
- IO. HIER. KNIPHOF index universalis in omnes XII. centurias botanicae in originali f. herbarii vivi opera et studio IO. GOTTFR. TRAMPE. Halae. fol.
- F. A. LEMOINE quæst. med. an recens nato recens lac maternum? Parisiis. 4.
- EIVSD. quæst. med. an fetus sanguine materno et amnii liquore nutriatur? ibid. 4.
- CAR. LINNAEI diff. inaug. sistens fundamenta agrostographiae. Resp. *H. Gahn*. Upsaliae. 4. c. f.
- EIVSD. diff. inaug. mundum invisibilem breviter delineans. Resp. *I. C. Roos*. ib. 4.
- EIVSD. diff. inaug. de hæmoptysi. Resp. *I. M. Graeberg*. ibid. 4.
- EIVSD. diff. inaug. de venis resorbentibus. Resp. *C. P. Thunberg*. ib. 4.
- EIVSD. diff. inaug. sistens fundamenta entomologiae. Resp. *A. I. Bladh*. ibid. 4.
- EIVSD. diff. inaug. de menthae usu. Resp. *C. G. Laurin*. ibid. 4.
- Eloge de Mr. BERTRANDI associé étranger de l'académie royale de chirurgie, chirurgien de sa majesté le Roi de Sardaigne, professeur d'anatomie et de chirurgie en l'université de Turin par LOUIS. à Paris. 8.
- La réduction économique, ou amélioration des terres par économie par M. à Paris. 12.
- An historical account of a new method of treating the scurvy at sea; containing ten cases, which shew that this destructive disease, may be easily and effectually cured, without the aid of

of fresh vegetable diet. By DAV. MACBRIDE.
London. 8.

I. B. A. MALGROT quaest. med. an opium hyster-
icis. Paris. 4.

P. MARSIGLI Fungi Carrariensis historia. Paduae. 4.

Maandelyksche tuinoeffeningen, aantoonende,
wat werk noodzaakelyk te doen is in jeder maand
van het jaar, zoo in de moes-vrugt en bloem-
tuin, als in de stook en broei-kassen en de kwec-
kery enc. door PHIL. MILLER, naar den veer-
tienden druk. Waarby gevoegt is eene lyst van
alle medicinaale planten met den tyd, waneer zy
moeten vergaaderd worden; als meede eene
korte inleiding tot de kennis der kruidkunde,
met koopere platen. In het Nederduitsch ver-
taald, en met eenige aanmerkingen verrykt door
IOB. BASTER te Haarlem. 8.

An essay on the nature and cure of the king's evil,
deduced from observation and practice. The
third edition; with a great variety of cases and
their remedies, now first published for the good
of mankind, particularly the common people.
By JOHN MORLEY. London. 8.

I. P. NONNE diss. inaug. de sanguinis tam fluidi,
quam in scybalorum formam coacti, per aluum
excretionem. Resp. I. T. Schütze. Erfordiae. 4.

EIVSD. diss. inaug. de mesenterio. Resp. I. H.
Hertel. ibid. 4.

A. NVNN diss. inaug. de principiis naturalibus cor-
ticis Peruviani, ejusque in corpus humanum
actione. Resp. G. C. Roeger. ibid. 4.

Beschouwing van de werken der natuur, ten opzig-
te van de viervoetige dieren, vogels, vischen,
tweeslachtige en kruipende dieren, insecten,
plantgewassen en bergstoffen. Ter betooginge
van Gods magt, wysheid en goedheid. Of
vervolg

- vervolg op de verbeterde tweede uitgaave van
I. RAY. Gods wysheid geoopenbaart in de
 werken der scheppinge cet. te Amsterd. 4.
- Nauwkeuige verhandeling over de bastaard Gall-
 infekten, van de cochenille en van't Paols schar-
 laaken zaad. Uit het Fransch vertaald van den
 Heere REAUMUR. Te Amsterdam 8.**
- EIVSD.** *Anweisung, wie man zu jeder Jahreszeit
 allerley zame Geflügel ausbrüten und aufziehen
 soll. 1 Theil. Aus dem Französischen von IOH.
 CHR. THENE. Augsp. 8. m. K.*
- R. F. C. RUMPEL** Pr. de cantharidibus earumque
 tam interno, quam externo in medicina usu.
 Erfordiae. 4.
- An essay on inoculation for the small-pox. Wherein
 the nature of the disease is explained, the various
 methods of preparation that have been practised
 in America are critically examined, and that,
 which author has found from his own experien-
 ce, to be most successful, is clearly laid down.
 With an appendix, containing a chymical exa-
 mination of Mr. SUTTON'S medicines. By
 TH. RYSTON. London. 8.**
- I. E. SCHENK VAN REEKOW** diss. de pleuri-
 tide. Groningae. 4.
- An account of inoculation for the small-pox.
 Wherein the constitution, age and habit of bo-
 dy, most favourable to inoculation, are particu-
 larly pointed out cet. by DAV. SCHVLZ. Lon-
 don. 8.**
- I. F. SIEGWART** quaestiones medicae Parifinae
 Tubingae. 4. c. f. voll. 2.
- E. SPRY** diss. de variolis et morbillis, iisque ino-
 culandis. Lugd. B. 4.
- R. STARKE** theses medicae de phthisi pulmo-
 nali. ibid. 4.

Medical advice to the consumptive and asthmatic people of England; wherein the present method of treating disorders of the lungs is shewn to be futile and fundamentally wrong, and a new and easy method of cure proposed. by PHIL. STERN. Lond. 8.

Mémoire sur la manière d'élever les vers à soie, et sur la culture des muriers blancs; lû à la société royale d'agriculture de Lyon. par Mr. T. à Amsterdam, et à Paris. 12.

Ouvrage de Mr. le chevalier TAYLOR sur les maladies des yeux. à Paris. 4.

I. N. TEXTORS *Vernunft- und erfahrungsmässiger Bericht, wie die giftig ansteckende Viehseuche erkannt und kurirt werden könne.* Carlsruhe. 8.

In novam methodum variolas inferendi commentarium, auct. T. TOMLINSON. Lond. 4.

Traité des maladies vénériennes par Mr. TURNER. à Paris. voll. 2.

I. B. URBAS diff. de sanitate tuenda. Viennae. 8.

Nouveau mémoire sur l'agriculture, sur les distinctions qu'on peut accorder aux riches laboureurs; avec des moyens d'augmenter l'aisance et la population dans les campagnes: Pièce qui a obtenu un *accessit* au prix de l'academie de Caën en 1766. par Mr. V. à Paris et à Dijon. 12.

T. LE VACHER DE LA FEUTRIE quæst. med. an apoplexiæ sanguineæ simultanea, per incisam temporalem arteriam venamque jugularem adversam, sanguinis missio? Parisiis. 4.

EIVSD. qu. m. an paulo post partum celebrata saphenæ sectio puerperæ non lactantis certa et tuta prophylaxis? ibid. 4.

P. M. VEILLARD quæst. med. an tuendæ sanitati magis conducatur longa et ampla vestis, quam brevis et angusta? ibid. 4.

Weeder-

Weederlegging van het kort berigt op de beschry-
ving van eene doodelyke waatervrees door den
Heere IO. W. MEYNICHUS, Stad - Med.
Doktor te Gouda, in de boekzaal van de maand
Augustus 1767. geplaatst; gevolgd van eene
broederlyke raadgeving aan den schryver van
de onlangs uitgekoomene apologie etc. door R.
VEIRAC. Te Gouda. 8.

Tentamen sophisticon, a chemical essay designed,
to shew the possibility of applying the powers
of chemistry to an examination of several pro-
ductions liable to be sophisticated or disguised.
Interpersed with observations on the approved
qualities of *ward's* drops and pill, Dr. JAMES's
powder for fevers, counterfeit *magnesia*
alba, and some other medicinal substances.
Where to is annexed the specimen, or plan of
a synopsis, including the chemical structure etc.
of some pharmaceutical preparations, and an
easy method of trying them for medicinal pur-
poses. By EDWARD WALLIS. London. 8.

A. WESTPHAL diss. de medelis quibusdam, quae
parantur apoplexiae, suspectis, partim et
noxiiis, partim laudandis. Resp. C. H. Klatt.
Gryphiswaldae. 4.

EIVSD. Pr. de apoplexia atrabilaria. ibid. 4.

Contenta in hac parte.

I.	Journal de médecine, chirurgie, pharmacie etc. par M. ROUX Vol. XXIX et XXX.	p. I
II.	HALLERI bibliotheca botanica Tom. I et II.	34
III.	Socken apothek och nagre Hus-Curer	42
IV.	Tal om de på Djur anstældte Röns och Försöks opatitelighet vid. tillämpuin- gen på människans kropp af MURRAY	44
V.	Forsteri novae species insectorum. Centur. I.	50
VI.	Histoire de l'Académie de Berlin ann. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768 et 1769	51
VII.	HERWIGII selectus medicamentorum rationalis etc.	69
VIII.	VAN SWIETEN commentaria in BOER- HAAVII aphorismos. Tom. V.	72
IX.	QVARIN methodus medendarum fe- brium	96
X.	Adversaria medico practica. Volum. II.	103
XI.	Geledning til Djur-Riker af RETZIVS	134
XII.	CARTHEUSERS <i>mineralogische Abhand- lungen</i>	135

- | | | |
|--------|---|-----|
| XIII. | Méthode pour recueillir les grains etc.
par DE BLANGY | 143 |
| XIV. | Moyen sûr et facile pour détruire les
taupes etc. | 144 |
| XV. | KAIM diff. inaug. de metallis dubiis | 146 |
| XVI. | Tal om peston och om dessute stängan-
ifraen et Land af VON ROSENSTEIN | 151 |
| XVII. | Nova physico - medica | 155 |
| XVIII. | Supplementum indicis scriptorum phy-
fico - medicorum, quae anno 1766.
prodierunt | 163 |
| XIX. | Supplementum indicis scriptorum phy-
fico medicorum, quae anno 1767. pro-
dierunt | 179 |
-

